Ч. 13. [517. 2(02)].

На правах рукопису.

Проф. Є. ІВАНЕНКО.

Диференціяльне числення



Видавниче т-во „СІЯЧ"
при Українському Педагогічному Інституті ім. М. Драгоманова
Прага 1925 р.

[517(02)]
На правах рукопису.

Проф. Є. Іваненко.

Диференціяльне числення

Конспект лекцій, читаних в Українському Педаг. Інституті ім. М. Драгоманова

Видавниче т-во „сіяч" при Укр. Педаг. Інституті ім. М. Драгоманова.
Прага 1925.

Літографовано 100 примірників.

§1. В попередньому курсі ми докладно розглядали похідні й диференціали функцій від одного незалежного, а тому далі на них зупинатися не будемо.

Зараз повторимо й простудіюємо більш широко диференціювання визначених функцій від кількох незалежних і диференціювання невизначених функцій, а також зупинимося над складними функціями. Будемо розглядати випадок визначеної функції від 3^x незалежних. В дальшому переконаємося, що цей випадок можна поширити й на функції від кількох більшого числа незалежних.

Отже припустімо, що маємо функцію від 3^x незалежних x, y і z і означимо її через u:

$$u = f(x, y, z)$$

Коли всі змінні x, y і z незалежні між собою, то ми можемо до однієї з них, напр., x додати приростання Δx, лишаючи в той час y і z незмінними. Тоді ціла функція u матиме приростання:

$$f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)$$

Будемо шукати межу відношення приростання цілої функції до приростання відповідного незалежного, а саме:

$$\frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x},$$

коли це приростання незалежного Δx прямує до нуля (при умові що y і z є незмінні).

Коли ця межа існує, себто є обмеженою, цілком визначеною величиною, то її називають <u>окремою похідною від функції u через x</u> і (як ми вже в пропедевтичному курсі зазначили) має символом:

$$u'_x = f'_x(x,y,z) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y, z) - f(x,y,z)}{\Delta x}.$$

Аналогічно можемо визначити й окремі похідні від тієї ж функції u через y і через z, а саме:

$$u'_y = f'_y(x,y,z) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y+\Delta y, z) - f(x,y,z)}{\Delta y}$$

$$u'_z = f'_z(x,y,z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(x,y,z+\Delta z) - f(x,y,3)}{\Delta z}.$$

[і т.д. коли б незалежників було більш ніж три]

На практиці при відшуканні якої окремої похідної користуються правилами, що доведено для функцій від одного незалежника, бо згідно умови цього диференціювання всі інші змінні, крім одної, що має приріщення, лишаються на час диференціювання сталими (незмінними)

<u>Приклад.</u> Дано функцію:

$$u = x^3y^2 - 3x^2z - y\lg z$$

Тоді окремі похідні:

1) через x: $3x^2y^2 - 6xz$ 2) через y: $2x^3y - \lg z$ і

3) через z: $-\left(3x^2 + \frac{y}{z}\right)$

§2. Припустімо, що всі окремі похідні даної $f(x,y,z)$ – існують і є такими в границях, що ми розглядаємо для вартостей x, y і z. Розберемось тепер у випадку, коли всі незалежні змінні разом мають відповідні приріщення.

Означимо в цьому році приріст цієї функції через Δu, тоді маємо:

$$\Delta u = f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x,y,z)$$

Щоб перейти до попередніх виразів, додамо до правої частини многочлен рівний нулеві, а саме:

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y, z) - f(x+\Delta x, y+\Delta y, z) + f(x+\Delta x, y, z) - f(x+\Delta x, y, z)$$

Тоді матимемо:

$$\Delta u = \left[f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x+\Delta x, y+\Delta y, z)\right] +$$

$$+\left[f(x+\Delta x, y+\Delta y, z) - f(x+\Delta x, y, z)\right] + \left[f(x+\Delta x, y, z) - f(x,y,z)\right] \quad (A)$$

З попередніх викладень маємо:

$$f'_x(x,y,z) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y, z) - f(x,y,z)}{\Delta x}$$

звідки можемо написати:

$$\frac{f(x+\Delta x, y, z) - f(x,y,z)}{\Delta x} = f'_x(x,y,z) + \alpha$$

де α є безмежно мала величина, що разом з Δx прямує до нуля. Тому:

$$f(x+\Delta x, y, z) - f(x,y,z) = f'_x(x,y,z)\Delta x + \alpha \Delta x \quad (a)$$

Аналогічно:

$$f(x, y+\Delta y, z) - f(x,y,z) = f'_y(x,y,z)\Delta y + \beta \Delta y \quad (б)$$

і $$f(x, y, z+\Delta z) - f(x,y,z) = f'_z(x,y,z)\Delta z + \gamma \Delta z \quad (в)$$

де β і γ теж є безмежно малі величини, що прямують відповідно разом з Δy і Δz до нуля.

Зокрема на <u>**тотожність**</u> функції зміна x на $x+\Delta x$ і y на $y+\Delta y$ збільшить приріст відповідних цілих функцій теж на безмежно малі величини, а тому:

1) застосувавши в рівності (б) вартість x через

$x + \Delta x$, матимемо:

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y, z) - f(x+\Delta x, y, z) = f'_y(x+\Delta x, y, z)\Delta y + \beta_1 \Delta y \quad (\delta_1)$$

де β_1 може бути й більш β, але лишається безмежно малою величиною тієї ж малості, що й β.

2) заступаючи в рівності (в) вартості x через $x+\Delta x$ і y через $y+\Delta y$, матимемо:

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x+\Delta x, y+\Delta y, z) = f'_z(x+\Delta x, y+\Delta y, z)\Delta z + \gamma_1 \Delta z \quad (в_1)$$

де γ_1 також може бути й більш γ_1 але лишається безмежно малою величиною тієї ж малості, що й γ.

Вставляючи останні вартості (а), (δ_1) і ($в_1$) в рівність (А), маємо:

$$\Delta u = f'_x(x,y,z)\Delta x + f'_y(x+\Delta x, y, z)\Delta y + f'_z(x+\Delta x, y+\Delta y, z)\Delta z + \alpha\Delta x + \beta_1 \Delta y + \gamma_1 \Delta z. \quad (В)$$

Розглянемо окремі вартості:

$$f'_y(x+\Delta x, y, z)\Delta y \quad \text{і} \quad f'_z(x+\Delta x, y+\Delta y, z)\Delta z$$

Ми умовились, що окремі похідні: $f'_y(x,y,z)$ і $f'_z(x,y,z)$ є малі в границях вартостей x, y, z, що ми їх розглядаємо, тому кожне безмежно мале приростання незалежних цих функцій тягне безмежно мале приростання самої функції, а саме:

$$f'_y(x+\Delta x, y, z) = f'_y(x, y, z) + \varepsilon$$

$$f'_z(x+\Delta x, y+\Delta z, z) = f'_z(x, y, z) + \eta$$

де ε і η є безмежно малі величини відповідні приростам f'_y і f'_z про заступлення в них x через $x+\Delta x$ і y через $y+\Delta y$. Тоді:

$$f'_y(x+\Delta x, y, z)\Delta y = f'_y(x, y, z)\Delta y + \varepsilon\Delta y$$

$$f'_z(x+\Delta x, y+\Delta y, z)\Delta z = f'_z(x,y,z)\Delta z + \eta\Delta z$$

Вставляючи ці вартості в рівність (B) одержимо:

$$\Delta U = f'_x(x,y,z)\Delta x - f'_y(x,y,z)\Delta y + f'_z(x,y,z)\Delta z + \alpha\Delta x + (\beta_1+\varepsilon)\Delta y + (\gamma_1+\eta)\Delta z \quad (C)$$

Умовимося, як було й для функцій від одного незалежного, застосувати безмежно малі прирощення незалежних Δx, Δy і Δz через їх похідні (диференціяли) й означати їх через dx, dy і dz.

Назвемо многочлен:

$$f'_x(x,y,z)dx + f'_y(x,y,z)dy + f'_z(x,y,z)dz$$

цілими похідними (диференціялом) функції $f(x,y,z)$ (або u) і означимо його через символ:

$$df(x,y,z) = du$$

Тоді:

$$df(x,y,z) = du = f'_x(x,y,z)dx + f'_y(x,y,z)dy + f'_z(x,y,z)dz$$

або:

$$du = d_x u + d_y u + d_z u$$

Порівнюючи цей вираз з рівністю (C), маємо:

$$\Delta u = du + \alpha\Delta x + (\beta_1+\varepsilon)\Delta y + (\gamma_1+\eta)\Delta z$$

Коли Δx, Δy і Δz згадно dx, dy і dz є одної малости між собою, то міг же малости буде й похід du, бо числики f'_x, f'_y і f'_z - є сталі величини (і вважаємо їх перівними з нулем). Вартости же $\alpha\Delta x$, $(\beta_1+\varepsilon)\Delta y$ і $(\gamma_1+\eta)\Delta z$ - мають малість значно більшу, бо є здобутками безмежно малих величин попередньої ділянки тому ними можна нехтувати й твердити, що:

Ціле прирощення функції $f(x,y,z)$ буде еквівалентним (рівнозначним) з її цілими похідними

(диференціалом):

$$\Delta u = du$$

Цей довід дуже легко поширити на функцію кількох довільно незалежних. Таким чином ми доведемо, що <u>цілий похід функції від кількох незалежних є сумою окремих походів цієї функції через кожного окремого незалежного.</u>

§3. На підставі цього доводу кожний окремий похід можна вважати, як окремий випадок цілого, а саме:

Припустімо, що для даної зміни незалежних x, незалежних y і z лишаються незмінними (тимчасово сталими), тоді їх походи мають бути рівні з нулем, себто $dy = 0$ і $dz = 0$. А звідси:

$$du = f'_x(x,y,z)\,dx + f'_y(x,y,z)\,dy + f'_z(x,y,z)\,dz$$

стає рівним:

$$du = f'_x(x,y,z)\,dx \quad \cancel{+0+0}$$

Даний в даному разі похід du символом $d_x u$, маємо:

$$d_x u = f'_x(x,y,z)\,dx$$

Аналогічно:

$$d_y u = f'_y(x,y,z)\,dy$$

$$d_z u = f'_z(x,y,z)\,dz$$

З останніх рівностей маємо:

$$f'_x(x,y,z) = \frac{d_x u}{dx}$$

$$f'_y(x,y,z) = \frac{d_y u}{dy}$$

$$f'_z(x,y,z) = \frac{d_z u}{dz}$$

Ми бачимо, що аналогічно до похідних функцій від одного незалежного, <u>окремі похідні від функцій кількох незалежних є відношеннями відповідного окремого походу до походу самого незалежного.</u>

Як знаємо з пропедевтичного курсу для таких відношень Якобі дає символи:

$$f'_x(x,y,z) = \frac{d_x u}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x}\ ;\ f'_y(x,y,z) = \frac{d_y u}{dx} = \frac{\partial u}{\partial y}\ \text{ і т.д.}$$

Тому:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz + \dots$$

§4. <u>Окремі похідні вищих порядків функцій кількох незалежних.</u>

Як ми говорили в пропедевтичному курсі, на випадок, коли окремі похідні даної $f(x,y,z\dots)$ себто $f'_x, f'_y, f'_z \dots$ є також такими функціями незалежних $x,y,z\dots$ то ми можемо й від цих функцій вимагати нові окремі похідні, що мають назву других похідних. Так напр.,

$$\frac{\partial f'_x}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

є другою окремою похідною взятою двічі через x.

Або:

$$\frac{\partial f'_x}{\partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \cdot \partial z}$$

є другою окремою похідною взятою перше через x, а потім через z.

Наприклад:

$$\frac{\partial f_2'}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x}$$

є другою похідною f взятою перше через z, а потім через x.

Коли б і другі окремі похідні були такими функціями незалежних $x, y, z \ldots$ то в той же спосіб ми взяли б треті окремі похідні і т.д. Напр.

$$\frac{\partial^n u}{\partial x^p \cdot \partial y^q \cdot \partial z^r} \quad (\text{де } n = p+q+r)$$

§5. Коли дана функція f від кількох незалежних $(x, y, z \ldots)$ і її відповідні похідні є такими для певних вартостей яких будь незалежних x, y, то в границях цих вартостей ті вартості окремих похідних не залежать від порядку диференціювання через ці незалежних, себто:

$$\frac{\partial^n u}{\partial x^k \partial y^m} = \frac{\partial^n u}{\partial y^m \partial x^k} \quad (\text{де } m+k=n)$$

Для доводу цієї теореми досить показати, що при тих же умовах другі окремі похідні підлягають цьому закону, а саме доведемо, що

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

В даному разі, коли ми цікавимося окремими похідними лише незалежних x і y, то решту незалежних можемо вважати за сталі величини й тому розглядати цінну $f(x, y, z \ldots)$ як якусь-небудь функцію незалежних x і y, а тому можемо описати:

$$f(x,y,z\ldots) = \varphi(x,y)$$

Дамо числу x яке-будь безмежно мале, але довільне приростання h. Тоді приростання самої функції буде:

$$\varphi(x+h,y) - \varphi(x,y) = a$$

Але вартість a при даних незмінних вартостях x і $x+h$ буде все таки змінною в залежності від змін вартости y, а тому вартість a можна означити як де-яку функцію y, а саме:

$$\varphi(x+h,y) - \varphi(x,y) = f(y)$$

Як само дамо де-яке довільне безмежно мале приростання незалежному y у функції $f(y)$, тоді матимемо приростання самої функції.

$$f(y+g) - f(y) = A$$

Вставляючи в цю рівність вартости $f(y)$ одержимо вартість величини A, а саме:

$$A = \varphi(x+h,y+g) - \varphi(x,y+g) - \varphi(x+h,y) + \varphi(x,y) \ldots (I)$$

Перетворимо вартість A у два способи й порівнявши одержані вислови.

1 спосіб. Перепишемо рівність (I) так:

$$A = [\varphi(x+h,y+g) - \varphi(x+h,y)] - [\varphi(x,y+g) - \varphi(x,y)]$$

Для спрощення зауважимо, що $[\varphi(x,y+g) - \varphi(x,y)]$ є також записом де-якої функції від x і y, а тому тимчасово означимо її через $\psi(x,y)$, тоді $\varphi(x+h,y+g) - \varphi(x+h,y)$ відрізнятиметься від $\psi(x,y)$ заміною в ній незалежного x через $x+h$, тому можна написати, що:

$$[\varphi(x+h,y+g) - \varphi(x+h,y)] = \psi(x+h,y)$$

Отже:

$$A = \Psi(x+h, y) - \Psi(x, y)$$

За теоремою Лагранжа о середній вартості незалежника (а саме за виром: $F(x+h) - F(x) = hF'(x+\theta h)$ де $0<\theta<1$) матимемо:

$$A = h\Psi'_x(x+\theta h, y) \quad \text{де } 0<\theta<1$$

Але $\Psi(x,y) = \varphi(x, y+y) - \varphi(x,y)$, що дає:

$$\Psi'_x(x,y) = \varphi'_x(x, y+y) - \varphi'_x(x,y)$$

А тому:

$$A = h\Psi'_x(x+\theta h, y) = h[\varphi'_x(x+\theta h, y+g) - \varphi'_x(x+\theta h, y)]$$

В правій частині при незмінній вартості $x+\theta h$, маємо приріст функції $\varphi'_x(x+\theta h, y)$, коли даємо незалежникові y приріст g, а тому знова можемо скористатися теоремою Лагранжа, а саме:

$$A = h[g\varphi''_{yx}(x+\theta h, y+\vartheta g)] \text{ де } 0<\vartheta<1$$

або:

$$A = hg\varphi''_{yx}(x+\theta h, y+\vartheta g) \quad \cdots \quad (M)$$

Від перестановки членів многочлена з їх знаками, вислід многочлену не змінюється, а тому рівність (I) можна написати ще й так:

$$A = [\varphi(x+h, y+g) - \varphi(x, y+g)] - [\varphi(x+h, y) - \varphi(x,y)]$$

Так самo, як і раніш, ми можемо означити:

$$[\varphi(x+h, y) - \varphi(x,y)] = \chi(x,y)$$

тоді:

$$[\varphi(x+h, y+g) - \varphi(x, y+g)] = \chi(x, y+g)$$

Отже:

$$A = \chi(x, y+g) - \chi(x,y)$$

або на підставі теореми Лагранжа:

$$A = g\chi'_y(x, y+\vartheta_1 g) \quad \text{де } 0<\vartheta_1<1$$

Вставляючи вартість:

$$\chi'_y = \varphi'_y(x+h, y) - \varphi'_y(x, y)$$

матимемо:

$$A = g\left[\varphi'_y(x+h, y+\vartheta_1 g) - \varphi'_y(x, y+\vartheta_1 g)\right]$$

На підставі попередніх міркувань ми й до виразу в квадрах можемо приложувати теорему Лагранжа, а тому:

$$A = g\left[h\,\varphi''_{xy}(x+\theta_1 h,\ y+\vartheta_1 g)\right] \quad \text{де } 0<\theta_1<1$$

Отже:

$$A = hg\,\varphi''_{xy}(x+\theta_1 h,\ y+\vartheta_1 g) \cdots (N)$$

Рівності (M) і (N) дають нам:

$$hg\,\varphi''_{yx}(x+\theta h,\ y+\vartheta g) = hg\,\varphi''_{xy}(x+\theta_1 h,\ y+\vartheta_1 g)$$

Зважаючи на тяглість функцій φ''_{yx} і φ''_{xy} (згадану умову) при простуванню до нуля вартостей h і g і самої вартости: $\varphi''_{yx}(x+\theta h, y+\vartheta g)$, та $\varphi''_{xy}(x+\theta_1 h, y+\vartheta_1 g)$ будуть простувати до своїх лише, а саме до:

$$\varphi''_{yx}(x, y) \quad \text{і} \quad \varphi''_{xy}(x, y)$$

тому матимемо рівність:

$$\varphi''_{yx}(x, y) = \varphi''_{xy}(x, y)$$

Ми довели цю теорему на випадок 2^x похідних. Але зважаючи на те, що треті похідні є відповідно другими для третіх і т.д. то цей довід легко поширити для загального твердження, щодо похідних всіх порядків, бо <u>кожну перестановку кількох байдесно диференціювань можна звести до цепу ступневих перестановок по два диференціювання кожний раз.</u>

Нехай хай вказаний символ порядку диференціювання буде:

$$\mathcal{K} = \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial x} < \frac{\partial}{\partial z} < \frac{\partial u}{\partial y}$$

то кажемо, що вартість цього виразу не змінюється якщо порядок цих диференціювань буде такий:

$$\frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial x} < \frac{\partial u}{\partial z}$$

На підставі доведеної теореми ми можемо змінити порядок останніх диференціювань і матимемо:

$$\mathcal{K} = \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial x} < \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial u}{\partial z}$$

замінивши похідну $\frac{\partial u}{\partial z}$ через v, матимемо:

$$\mathcal{K} = \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial x} < \frac{\partial v}{\partial y}$$

Знов зміною порядок останніх двох диференціювань, маємо:

$$\mathcal{K} = \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial v}{\partial x}$$

або вставляючи вартість v, маємо:

$$\mathcal{K} = \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial y} < \frac{\partial}{\partial x} < \frac{\partial u}{\partial z}$$

що й треба було довести.

§6. Зупинимося тепер трохи докладніш ніж в пропедевтичному курсі над похідними вищих порядків для кількох незалежних.

Припустім, що маємо якусь функцію u від двох незалежних x і y, себто $u = f(x,y)$. Візьмімо її повний диференціал:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

і продиференціюємо ще раз. Цей новий диференціал будемо звати другим похідним функції $f(x,y)$. Так само

можемо взяти 3-й, 4-й і т. д. похідні функції $f(x,y)$. Ми вважатимемо дх за нову змінну функцію від x і y і означимо її символом через $\varphi(x,y)$. Тоді повний похід цієї функції буде:

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy \dots\dots (I)$$

Але $\varphi = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$, а тому:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} dx\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial y} dy\right)$$

dx і dy є безмежно-малі приростання незалежних і тому в першій спосіб не залежатимуть від тих вартостей, що будуть набувати ссилі незалежних. Отже, при повному диференціюванні через x, або через y і великими dx і dy відограють ролю сталих величин. Вони не злітноватимуться й тоді, коли цим незалежним придати які-будь приростання h або g. Тому при диференціюванні членів dx і dy можна винести за знак диференціювання. Таким чином маємо:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = dx \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) + dy \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

а звідси:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dy$$

Аналогічно: $$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dx + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy$$

Вставляючи знайдені вартості $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ і $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$ у вір (I) маємо:

$$d\varphi = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dy\right) dx + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dx + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy\right) dy$$

або:

$$d\varphi = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dx\,dy + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2$$

Але $\varphi(x,y) = du$, а тому:

$$d^2u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dx\,dy + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2$$

Так само вважаючи d^2u за таку функцію тих же незалежних змінних x і y, та означуючи її через $\psi(x,y)$, матимемо:

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy \quad (II)$$

Але:

$$\psi(x,y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2$$

а тому:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} dx^2 + 2\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} dx\,dy + \frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x} dy^2$$

де на підставі попередніх міркувань dx і dy (а також і їх степені) є сталими величинами.

Аналогічно:

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} dx^2 + 2\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} dx\,dy + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} dy^2$$

Таким чином вставляючи ці вартості в (II) матимемо:

$$d\psi = d^3u = \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} dx^3 + 2\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + \frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x} dy^2 dx +$$

$$+ \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 2\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} dx\,dy^2 + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} dy^3$$

або:

$$d^3u = \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} dx^3 + 3\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} dx\,dy^2 + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} dy^3$$

У розгорнених виразах перших трьох похідних від функції u ми помічаємо зовнішню схожість з розгорненим перетом Ньютона. Різниця лише в тому, що символи $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}$ означають не степені, а порядок диференціювання. Тому взявши умовно

символ u за сомножник і винести його за дужки, маємо:

$$du = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)u$$

$$d^2u = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^2 \cdot u$$

$$d^3u = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^3 u$$

Доведемо, що цей символ можемо поширити на цілий похід від функції двох незалежних змінних якого бажаємо порядку. Для цього за методом індукції, припустімо, що згаданий символ є придатний для n-го цілого походу функції $f(x,y)$, а саме:

$$d^n u = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^n u \quad \cdots (A)$$

і покажемо, що в цьому разі він буде придатним і для наступного порядку $(n+1)$-го походу:

При розкритті символа (A) через шерег Ньютона ми будемо мати такий загальний член:

$$f_{m+1} = C_n^m \frac{\partial^{n-m}}{\partial x^{n-m}}dx^{n-m} \cdot \frac{\partial^m}{\partial y^m}dy^m \cdot u$$

або переходячи до попередніх означень:

$$f_{m+1} = C_n^m \frac{\partial^n u}{\partial x^{n-m}\partial y^m}dx^{n-m}dy^m$$

Даючи значнику m вартости від 0 до n, ми одержимо всі члени многочлену, що є виразом цілого походу функції u порядку n. Тому можемо написати, що:

$$dp(x,y) = d^n u = \sum_{m=0}^{m=n} C_n^m \frac{d^n u}{\partial x^{n-m}\partial y^m}dx^{n-m}dy^n \quad (B)$$

Ми знаємо, що:

$$d^{n+1}u = d\,dp(x,y)$$

Тому: $$d^{n+1}u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y}dy \quad \ldots\ldots (B)$$

але:
$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\sum_{m=0}^{m=n} C_n^m \frac{d^n u}{\partial x^{n-m}\partial y^m} dx^{n-m} dy^m\right]$$

і $$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left[\sum_{m=0}^{m=n} C_n^m \frac{d^n u}{\partial x^{n-m}\partial y^m} dx^{n-m} dy^m\right]$$

Ми вважаємо величини dx і dy за сталі, а тому:
$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{d^n u}{\partial x^{n-m}\partial y^m}\right]$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{d^n u}{\partial x^{n-m}\partial y^m}\right]$$

а звідси:
$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial^{n+1} u}{\partial x^{n-m+1}\partial y^m}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial^{n+1} u}{\partial x^{n-m}\partial y^{m+1}}$$

Вставляючи тепер знайдені вартості $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ і $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$ у взір (B) маємо:
$$d^{n+1}u = dx\sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial^{n+1} u}{\partial x^{n-m+1}\partial y^m} + dy\sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial^{n+1} u}{\partial x^{n-m}\partial y^{m+1}}$$

або:
$$d^{n+1}u = \sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \left(\frac{\partial^{n+1} u}{\partial x^{n-m+1}\partial y^m} dx + \frac{\partial^{n+1} u}{\partial x^{n-m}\partial y^{m+1}} dy\right)$$

або:
$$d^{n+1}u = \sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial^n}{\partial x^{n-m}\partial y^m}\left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right) u$$

Індекс в дужках входить в кожний член незалежно від вартості m і або не залежить від m, тому його можемо винести за знак $\sum$ і маємо:
$$d^{n+1}u = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)\sum_{m=0}^{m=n} C_n^m dx^{n-m} dy^m \frac{\partial^n}{\partial x^{n-m}\partial y^m} u$$

На підставі взорів (A) і (B) можемо $\sum$ зачинити

через $\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial y}dy\right)^n.u$, а тому одержимо:

$$d^{n+1}u=\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial y}dy\right)\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial y}dy\right)^n.u$$

а звідси:

$$d^{n+1}u=\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial y}dy\right)^{n+1}.u$$

що й треба було довести.

Рас ми переконались в правильності цього символу для $3^{го}$ цілого походу від функцій $2^х$ незалежних, то, на підставі доведеного, цей символ можна поширити й для $4^{го}$ походу, далі для пятого і т.д.

§7. Нехай функція u буде від кількох незалежних, напр.

$$u=f(x,y,z\ldots)$$

то $1^й$ похід буде:

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz+\cdots$$

Тоді, беручи способом що вказали перед цим, другий похід, матимемо:

$$d^2u=d\varphi=\frac{\partial\varphi}{\partial x}dx+\frac{\partial\varphi}{\partial y}dy+\frac{\partial\varphi}{\partial z}dz+\cdots=$$

$$=\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}dx+\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}dy+\frac{\partial^2u}{\partial x\partial z}dz+\cdots\right)dx+\left(\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}dx+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}dy+\frac{\partial^2u}{\partial y\partial z}dz+\cdots\right)dy+$$

$$+\frac{\partial^2u}{\partial x\partial z}dx+\frac{\partial^2u}{\partial y\partial z}dy+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}dz+\cdots\Big)dz+\cdots$$

А звідси, зносячи дужки, маємо:

$$d^2u=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}dx^2+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}dy^2+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}dz^2+\cdots\cdots+$$

$$+2\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}dx\,dy+2\frac{\partial^2u}{\partial x\partial z}dx\,dz+2\frac{\partial^2u}{\partial y\partial z}dy\,dz+\cdots\cdots$$

Це, як і попереднє, можна виобразити символом:

$$d^2u=\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial y}dy+\frac{\partial}{\partial z}dz+\cdots\right)^2.u$$

Аналогічним шляхом дійдемо, що:

$$d^3u = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy + \frac{\partial}{\partial z}dz + \dots\right)^3 . u$$

і наперед:

$$d^n u = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy + \frac{\partial}{\partial z}dz + \dots\right)^n . u .$$

§8. Вірність $d^n u$ є правильний в разі коли всі змінні $x, y, z \dots$ є цілком незалежні, або в крайньому випадкові уявляють лінійні залежности.

Справді, коли б x, y, z були б у свою чергу функціями яких-небудь нових змінних, напр. $\kappa, p, q \dots$, то dx, dy, dz не можна було б вважати за сталі величини, як це ми робили при виводі взору (бо коли $x = \varphi(\kappa, p, q \dots)$, $y = \Psi(\kappa, p, q)$ і $z = \chi(\kappa, p, q)$, то, напр. $dx = \varphi'_\kappa(\kappa, p, q)\,d\kappa + \varphi'_p(\kappa, p, q)\,dp + \varphi'_q(\kappa, p, q)\,dq$ - себто зміна є функцією κ, p, q). Наколиб φ, Ψ і χ були б лінійні функції κ, p і q, то φ', Ψ' і χ' були б сталі величини, а $d\kappa$, dp і dq будуть сталі величини, як похідні незалежних, а тому dx, dy і dz ... можна вважати сталими величинами, тобто вірність $d^n u$ можна буде потримати й на цей випадок.

Невизначені функції.

§9. В пропедевтичному курсі ми розглядали відшукання першої похідної невизначеної функції, даної рівнянням:

$$f(x, y) = 0$$

Для цього диференціюємо за правилом складних функцій, маємо:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0$$

а звідси:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

або:

$$y' = -\frac{f'_x}{f'_y}$$

Очевидно, що вартість y' можлива при умові що $f'_y(x,y) \neq 0$.

Розглянемо тепер випадок системи рівнянь, що зв'язують кілька невідомих функцій. Напр.,

$$f(x, y, z, u, v, t) = 0$$
$$\varphi(x, y, z, u, v, t) = 0$$
$$\psi(x, y, z, u, v, t) = 0$$

де x, y і z - є незалежними, а u, v і t є певні функції цих незалежних. Могі диференціюючи за правилом складних функцій, матимемо:

1) через x:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial x} = 0\\
&\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial x} = 0\\
&\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial x} = 0
\end{aligned}\right\} \quad (A)$$

Ми маємо систему рівнянь, щодо змінних:

$$\frac{\partial u}{\partial x},\ \frac{\partial v}{\partial x},\ \frac{\partial t}{\partial x}$$

Розв'язавши її знайдемо окремі похідні через x всіх невідомих функцій.

Таксамо, диференціюючи, через y і через z, знайдемо:

$$\frac{\partial u}{\partial y},\ \frac{\partial v}{\partial y},\ \frac{\partial t}{\partial y}\ ;\quad \frac{\partial u}{\partial z},\ \frac{\partial v}{\partial z},\ \frac{\partial t}{\partial z}$$

Приклад:

$$x^2 - 2y^2 + 3z^2 - 5u = 0$$
$$3x - y^2 - z + 2u^2 = 0$$

де x і y вважаємо за незалежні. Тоді:

$$2x + 6z\frac{\partial z}{\partial x} - 5\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \;; \quad 3 + \frac{\partial z}{\partial x} + 4u\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Звідки:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{8xy + 15}{5 - 24uz} \;; \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{18z + 2x}{5 - 24uz}$$

Далі:

$$4y + 6z\frac{\partial z}{\partial y} - 5\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \;; \quad -2y - \frac{\partial z}{\partial y} + 4u\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

а звідки:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y(8u + 5)}{24uz - 5} \;; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{4y(1 + 3z)}{24uz - 5}$$

Загалом, коли дається система $n-1$ рівняння з n змінними, напр.,

$$\begin{aligned} f_1(x, y, u, v \ldots\ldots w) &= a_1 \\ f_2(x, y, u, v \ldots\ldots w) &= a_2 \\ &\vdots \\ f_{n-1}(x, y, u, v \ldots\ldots w) &= a_{n-1} \end{aligned}$$

то беручи довільно за незалежне, напр., x, а решту за функції x ми після диференцювання, маємо:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \cdots \frac{\partial f_1}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial x} = 0 \\ &\frac{\partial f_2}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \cdots \frac{\partial f_2}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x} = 0 \\ &\vdots \\ &\frac{\partial f_{n-1}}{\partial x} + \frac{\partial f_{n-1}}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial f_{n-1}}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} \cdots \frac{\partial f_{n-1}}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x} = 0 \end{aligned}\right\} \quad (B)$$

А звідки:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial u} \cdots \frac{\partial f_1}{\partial w} \\ \vdots & \\ \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x} & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial u} \cdots \frac{\partial f_{n-1}}{\partial w} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial u} \cdots \frac{\partial f_1}{\partial w} \\ \vdots & \\ \frac{\partial f_{n-1}}{\partial y} & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial u} \cdots \frac{\partial f_{n-1}}{\partial w} \end{vmatrix}}$$

Загалом же коли рівнянь k, а змінних $n = k+p$, то ми маємо тоді похідні через p незалежних, виражені через k невідомих функцій. Це ми розглядали на попередньому прикладі.

Щоб знайти ще другі похідні, ми щойно рівняння (13) ще раз продиференціювати. Напр., дано рівняння:

$$x^2 - 2y^2 + 3z^2 = 0$$

Очевидно тут лише одну із змінних можна вважати функцією решти. За таку змінну візьмемо z, тоді 1-ше диференціювання:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

маємо: $2x + 6z\frac{\partial z}{\partial x} = 0$, або $x + 3z\frac{\partial z}{\partial x} = 0$

$$-4y + 6z\frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad \text{або} \quad -2y + 3z\frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

2-ге диференціювання:

$$1 + 3\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 3z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \quad ; \quad 3\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial z}{\partial x} + 3z\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

$$-2 + 3\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 3z\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \quad ; \quad 3\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y} + 3z\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

Звідси з першого диференціювання маємо:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{3z} \quad ; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{3z}$$

Тому: $1 + 3\left(-\frac{x}{3z}\right)^2 + 3z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$ або $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{3z^2 + x^2}{9z^3}$

$$3\left(-\frac{x}{3z}\right)\frac{2y}{3z} + 3z\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \quad \text{або} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{2xy}{9z^3}$$

і $-2\cdot 3\left(\frac{4y^2}{9z^2}\right) + 3z\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ або $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2 - 4y}{9z^3}$

§10. Одновимірні функції.

Функція $f(x,y,z\dots)$ зветься одновимірного, коли від положення її незалежних на яке будь довільне число, вимність самої функції помножиться на певну ступінь цього довільного числа.

Себто, коли $f(x,y,z\dots)$ є одновимірною функцією, то

$$f(xt, yt, zt\dots) = t^m f(x,y,z\dots)$$

Число m має назву виміру одновимірної функції

Приклад. $f(x) = x^3 + \frac{y^4}{z} + z^3 \sin\frac{x}{y}$

Заступаючи вартість незалежних через xt, yt і zt маємо:

$$x^3t^3 + \frac{y^4t^4}{zt} + z^3t^3 \sin\frac{xt}{yt} = t^3\left(x^3 + \frac{y^4}{z} + z^3 \sin\frac{x}{y}\right)$$

Отже $f(x)$ - є одновимірною, третього виміру (або ступіня).

Коли ця умова має бути виконана при кожному t, то очевидно виконається й при $t = \frac{1}{x}$. Тому множуть всі незалежні $f(x,y,z\dots)$ на $\frac{1}{x}$, матимемо:

$$f\left(1, \frac{y}{x}, \frac{z}{x}\cdots\right) = \left(\frac{1}{x}\right)^m f(x,y,z\dots)$$

А звідси:

$$f(x,y,z\dots) = x^m f\left(1, \frac{y}{x}, \frac{z}{x}\cdots\right) = x^m \varphi\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\cdots\right)$$

Отже, **кожна одновимірна функція є рівна зі здобутком степені, рівній з виміром функції, одною з незалежних її на функцію від відношення решти незалежних до даної**

Коли функція є нульового виміру (напр. $f(x,y) = \operatorname{tg}\frac{x}{y}$) то $m = 0$, а тому попередня рівність має вигляд:

$$f(x,y,z\dots) = \varphi\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\cdots\right)$$

Себто:

Одновимірна функція нульового виміру є функцією від відношення незалежних.

Теорема Ейлера

Коли $f(x, y, z \ldots)$ однорідна функція якого-будь m-го виміру від кількох незалежних, то сума здобутків окремих похідних цієї функції на самих незалежних, через які ці похідні взято, є рівна із самою функцією, помноженою на показателя виміру.

Инакше кажуть: коли в цілому поході одновимірної функції походи незалежних заступити через самі незалежні, то одержимо саму функцію помножену на показателя виміру.

Напр., хай дана одновимірна функція буде:

$$f(x, y, z \ldots) = u$$

Моді цілий її похід буде:

$$\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz + \ldots$$

Заступаючи походи незалежних через самі незалежні, матимемо:

$$\frac{\partial u}{\partial x} x + \frac{\partial u}{\partial y} y + \frac{\partial u}{\partial z} z + \ldots$$

Теорема Ейлера доводить, що:

$$\frac{\partial u}{\partial x} x + \frac{\partial u}{\partial y} y + \frac{\partial u}{\partial z} z = m.u$$

де m є показатель виміру функції $u = f(x, y, z \ldots)$

З визначення самої одновимірної функції, маємо:

$$f(xt, yt, zt \ldots) = t^m f(x, y, z \ldots)$$

Означимо тимчасом здобутки: xt, yt, zt ... через ξ, η, ζ

Моді:

$$f(\xi, \eta, \zeta \ldots) = t^m f(x, y, z \ldots) \quad \ldots (\alpha)$$

Розглянемо момент, коли вартости незалежних x, y, z... не змінюються й будемо тільки змінювати вартість t. Тоді: $\xi = xt$, $\eta = yt$, $\zeta = zt$... будуть функціями t, а $f(\xi, \eta, \zeta...)$ складною функцією від t, вартості же x, y, z, а разом і $f(x, y, z...)$ будуть певними сталими. Отже продиференціюємо рівність (a) через t, то при указаних умовах матимемо:

$$\frac{\partial f}{\partial \xi}\cdot\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \eta}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \zeta}\cdot\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \cdots = mt^{m-1} f(x, y, z...)$$

Але $\xi = xt$, то $\frac{\partial \xi}{\partial t} = x$; маємо: $\frac{\partial \eta}{\partial t} = y$; $\frac{\partial \zeta}{\partial t} = z$ і т.д.
Отже маємо:

$$\frac{\partial f}{\partial \xi}x + \frac{\partial f}{\partial \eta}y + \frac{\partial f}{\partial \zeta}z + \cdots = mt^{m-1} f(x, y, z...)$$

Ми маємо вартість t цілком довільного, а тому беручи $t = 1$, одержимо:

$$\partial\xi = \underset{t=1}{\partial(xt)} = \partial x;\quad \partial\eta = \underset{t=1}{\partial(yt)} = \partial y \quad \text{і т.д.}$$

Маємо тепер:

$$\frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y + \frac{\partial f}{\partial z}z = m f(x, y, z...).$$

Що й треба було довести.

<u>Приклад.</u> $u = x^2y + 3xy^2 - 2x^2 - \frac{y^4}{2}$

Це є однорідна функція 3-го виміру. Беремо окремі похідні:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy + 3y^2 - 2zx;\quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 + 6xy - \frac{4y^3}{2};\quad \frac{\partial u}{\partial z} = -x^2 + \frac{y^4}{2^2}$$

Тому: $\frac{\partial u}{\partial x}x + \frac{\partial u}{\partial y}y + \frac{\partial u}{\partial z}z = \underline{2x^2y} + \underline{3xy^2} - \underline{2x^2z} + \underline{x^2y} +$

$$+ \underline{6xy^2} - \underline{\frac{4y^3}{2}} - \underline{x^2z} + \underline{\frac{y^4}{2}} = 3x^2y + 9xy^2 - 3x^2z - \frac{3y^4}{2} =$$

$$= 3\left(x^2y + 3xy^2 - x^2z - \frac{y^4}{2}\right)$$

§ 11. Ряд Тейлора.

В елементарному курсі ми вивели вже ряд Тейлора, а саме:

$$f(z) = f(a) + \frac{z-a}{1!} f'(a) + \frac{(z-a)^2}{2!} f''(a) + \dots \frac{(z-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a)$$

Цей вірш є можливим при довільних a і z. Коли існують вартості $f(a)$ і її перших $(n-1)$ похідних. Очевидно, що число n є в даному разі довільне, а тому від його вартості (себто від числа взятих похідних) буде залежати та або інша вартість суми, що є в правій частині рівності. Це нас переконує, що права частина не є точною вартістю $f(z)$, а лише певним її наближенням, а тому виникає потреба в обчисленні похибки, що ми робимо, коли прирівнюємо ліву частину до правої. Це й поставимо ми собі як задачу

Означимо нашу похибку через $R = (z-a)^p \cdot Q$, де Q є величина поки-що нам невідома, а p довільне число від 1 до n. Тоді:

$$f(z) = f(a) + \frac{z-a}{1!} f'(a) + \frac{(z-a)^2}{2!} f''(a) + \dots \frac{(z-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + (z-a)^p Q \quad (A)$$

є правдивою рівністю. Звідси:

$$f(z) - \left[f(a) + \frac{z-a}{1!} f'(a) + \frac{(z-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(z-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + (z-a)^p Q \right] = 0$$

В цій різниці a цілком довільне й тому замінивши його через x, припустивши що x також змінюється в інтервалі від a до z. Тоді, означивши ліву частину рівності через $\varphi(x)$, матимемо:

$$\varphi(x) = f(z) - \left[f(x) + \frac{z-x}{1!} f'(x) + \frac{(z-x)^2}{2!} f''(x) + \dots + \frac{(z-x)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + (z-x)^p Q \right]$$

Ця функція обертається в нуля 1) при $x=z$ і 2) при $x=a$ (на підставі попереднього взору). Тому за теоре-

мою Ролля можна твердити, що між вартостями z і a існує якесь вартість ξ незалежника, при якій перша похідна $\varphi'(x)$ обертається в нуля. Беручи цю похідну маємо: (z=const)

$$\varphi'(x) = -\left[f'(x) - f'(x) + \frac{z-x}{1!}f''(x) - \frac{z-x}{1!}f''(x) + \frac{(z-x)^2}{2!}f'''(x) - \frac{z-x}{1!}\frac{(z-x)^2}{2!}f'''(x) + \right.$$

$$\left. + \frac{(z-x)^3}{3!}f^{IV}(x) - \dots\dots - \frac{n-1}{n-1}\frac{(z-x)^{n-2}}{(n-2)!}f^{(n-1)}(x) + \frac{(z-x)^{n-1}}{(n-1)!}f^{n}(x) - p(z-x)^{p-1}Q\right]$$

$$\varphi'(x) = -\left[\frac{(z-x)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(x) - p(z-x)^{p-1}Q\right] = p(z-x)^{p-1}Q - \frac{(z-x)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(x)$$

Отже ця похідна за теорією Ролля мусить для якоїсь вартости $a < \xi < z$ обертатися в нуля, а саме:

$$p(z-\xi)^{p-1}Q - \frac{(z-\xi)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(\xi) = 0$$

звідси:

$$Q = \frac{(z-\xi)^{n-p}}{p(n-1)!}f^{(n)}(\xi)$$

Вартість ξ лежить в інтервалі a...z, а тому різниця $\xi - a < z - a$. Отже: $0 < \frac{\xi-a}{z-a} = \theta < 1$ (себто $0<\theta<1$)

Звідси: $\xi - a = \theta(z-a)$ і $\xi = a + \theta(z-a)$

Різниця же $z - \xi = z - a - \theta(z-a) = (z-a)(1-\theta)$. Вставляючи ці вартости в Q, матимемо:

$$Q = \frac{(z-a)^{n-p}(1-\theta)^{n-p}}{p\cdot(n-1)!}f^{(n)}[a+\theta(z-a)]$$

Тимчасом тепер Тейлора матиме вигляд: [вставляємо вартість (A)].

$$f(z) = f(a) + \frac{z-a}{1!}f'(a) + \frac{(z-a)^2}{2!}f''(a) + \dots + \frac{(z-a)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a) + R$$

$$\text{де } R = \frac{(z-a)^n(1-\theta)^{n-p}}{p(n-1)!}f^{(n)}[a+\theta(z-a)] \quad \cdots (B)$$

де $0<\theta<1$. Ця похибка R носить назву остаточного члена Шльомильха (від імені німецького вченого, що його довів). Такого же значіння, як це робили в

попередньому курсі, а саме через: $a=x$; $z-a=h$; звідси $z=a+h=x+h$, одержимо для ряду Тейлора такий вигляд:

$$f(x+h)=f(x)+\frac{h}{1!}f'(x)+\frac{h^2}{2!}f''(x)+\frac{h^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x)+R$$

де $R=\frac{h^n(1-\theta)^{n-p}}{p(n-1)!}f^{(n)}(x+\theta h)$, де $0<\theta<1$, а p довільне.

Зважаючи на довільність вартости p, Лагранж вважав її рівній n, себто $p=n$ і тоді останній член Лагранжа мав вигляд:

$$R=\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x+\theta h)$$

де $x+\theta h$ - є середня вартість x в інтервалі $x\ldots x+h$.

Максимо Коші вважав $p=1$ й останній член Коші має вигляд:

$$R=\frac{h^n(1-\theta)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(x+\theta h)$$

Коли тепер довільну величину a прирівнаємо до нуля, себто в ряді (B) положимо $a=0$, то матимемо відомий ряд Маклорена, а саме:

$$f(z)=f(0)+\frac{z}{1!}f'(0)+\frac{z^2}{2!}f''(0)+\cdots+\frac{z^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(0)+R$$

де R:

$$(\text{Шльомільха})-R=\frac{z^n(1-\theta)^{n-p}}{p(n-1)!}f^{(n)}(\theta z)$$

$$(\text{Лагранжа})-R=\frac{z^n}{n!}f^{(n)}(\theta z)$$

$$(\text{Коші})-R=\frac{z^n(1-\theta)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(\theta z)$$

Ряди Маклорена мають велике практичне значення для розкладання окремих функцій в ряди.

§ 19. Розкладання в ряди $f(x)=\sin x$. Ряди збіжні

треба переконатися, чи існують всі n-1 похідні цієї функції. Ми вже знаємо, що $(\sin x)^n = \sin(\frac{n\pi}{2}+x)$. Тому $(\sin x)' = \sin(\frac{\pi}{2}+x) = \cos x$; $(\sin x)'' = \sin(\pi+x) = -\sin x$; $(\sin x)''' = \sin(\frac{3\pi}{2}+x) = -\cos x$; $(\sin x)^{IV} = \sin(2\pi+x) = \sin x$ і т.д. Отже: $f(0)=0$; $f'(0)=1$; $f''(0)=0$; $f'''(0)=-1$; $f^{IV}(0)=0$; $f^{V}(0)=1$ і т.д. Ми бачимо, що паристі похідні є рівні з нулем а не паристі: $1, 5, 9\ldots$ рівні $+1$, а $3, 7, 11\ldots$ рівні -1. Це вірно і непарисного можна висловити так: $f^{(n)}(0) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}$ (бо число непарисне $n = 2k+1$, звідки $k = \frac{n-1}{2}$) Звідси, вставляючи знайдені вартості в ряд Маклорена, маємо:

$$\sin x = 0 + \frac{x}{1!} + 0 - \frac{x^3}{3!} + 0 + \frac{x^5}{5!} + 0 - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$

або: $$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots \frac{x^{4k+1}}{(4k+1)!} + \frac{x^{4k+3}}{(4k+3)!} + \ldots$$

Щоб знайти похибку користуємося з остаточного члена Лягранжа, й маємо:

$$R_1 = \frac{x^n}{n!} f^n(\theta x) = \frac{x^n}{n!} \sin(\frac{n\pi}{2} + \theta x)$$

$\sin(\frac{n\pi}{2}+\theta x)$ не більше від 1, тому є величиною обмеженою. Доведемо що $\frac{x^n}{n!}$ прямує до нуля, коли $n \to \infty$. Хай число a і $a+1$ є вартості, що містяться в своїм інтервалі x, себто:

$$a < x < a+1 < n$$

Вираз $\frac{x^n}{n!}$, напишемо так:

$$\frac{x^n}{n!} = \frac{x}{1} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{3} \cdot \frac{x}{4} \cdots \frac{x}{n}$$

Зупинимо ряд на вартості знаменателя a, тоді матимемо:

$$\frac{x^n}{n!} = J \cdot z$$

де $J = \frac{x}{1} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{3} \cdots \frac{x}{a}$ = обмеженому числу, позначимо

від вартости n. Але:

$$r = \frac{x}{a+1} \cdot \frac{x}{a+2} \cdot \frac{x}{a+3} \cdots \frac{x}{n}$$

Коли в цій рівності замінити всі знаменники через $a+1$, то права частина збільшиться й ми одержимо

$$r < \left(\frac{x}{a+1}\right)^{n-a}$$

Але з умови $x < a+1$, тому дріб $\frac{x}{a+1} < 1$ й $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x}{a+1}\right)^{n-a} = 0$

Очевидно, що й здобуток:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n\to\infty} r = 0$$

Це нам дає право твердити, що й останній член R прямує до нуля зі збільшенням n до безмежности, а тому розгорнення в ряд через $\sin x$ можливе при кожній вартости x. Таким чином маємо:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

§13. Розгорнення в ряд через $\cos x$.

Коли $f(x) = \cos x$, то, як відомо, $f'(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\sin x$; $f''(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{2}+x\right) = -\cos x$; $f'''(x) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right) = \sin x$; $f^{IV}(x) = \cos(2\pi+x) = \cos x$; $f^{V}(x) = -\sin x$ і т. д. Загалом $f^{(n)}(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{2}+x\right)$. Всі похідні при кожному x - існують, отже, беручи $x = 0$, матимемо: $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = -1$, $f'''(0) = 0$; $f^{IV}(0) = 1$; $f^{V}(0) = 0$ і т. д. Отже коли n є непарне, то $f^{(n)}(0) = 0$, коли n парне, то $f^{(n)}(0) = (-1)^{\frac{n}{2}}$; $\left[n = 2k,\ k = \frac{n}{2}\right]$. Тому:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots R$$

де R за Лагранжем буде:

$$R = \frac{x^n}{n!}\cos\left(\frac{n\pi}{2} + \theta x\right)$$

$\cos$ не може мати вартости більшої 1, а ми до-

вели, що $\frac{x^n}{n!}$ для кожної вартості x прямує до нуля при зростанні n до ∞, а тому:

$$\lim_{n\to\infty} R = 0$$

Тому ряд розкладення $\cos x$ в ряд можливе при кожній вартості x. Отже:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

§14. Розкладення в ряд e^x.

$f(x) = e^x$, $f'(x) = e^x$ і т. д. $f^{(n)}(x) = e^x$. Отже всі n перших функцій існує. Вважаючи $x = 0$, матимемо:

$$f(0) = 1,\ f'(0) = 1,\ f''(0) = 1 \text{ і т. д.}$$

Тому за взором Маклорена, маємо:

$$f(x) = e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots R$$

де R за Лагранжем буде:

$$R = \frac{x^n}{n!} e^{\theta x}$$

θ є дріб менший від одиниці і здобуток $\theta x < x$, а тому якеб не було R вартість $e^{\theta x}$ є обмеженого, бо $e^{\theta x} < e^x$. Щодо $\frac{x^n}{n!}$ вище було доведено, що для кожної вартості x $\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$, а тому $\lim_{n\to\infty} R = 0$. Розкладення можливе при кожному x, а тому:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Взявши $x = 1$, одержимо ряд, яким користуються для обчислення самого e, а саме:

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots$$

Розкладемо ще в ряд ступінів x функції a^x Дай $a = e^y$ знайдемо y. Логаритмуємо й маємо

$\lg a = y$, тому $a = e^{y \lg a}$, а звідси $a^x = e^{x \lg a}$. Отже:

$$f(x) = a^x = e^{x \lg a}$$
$$f'(x) = \lg a\, e^{x \lg a}$$
$$f''(x) = \lg^2 a\, e^{x \lg a}$$
$$f'''(x) = \lg^3 a\, e^{x \lg a}$$
$$\vdots\ \vdots\ \vdots\ \vdots\ \vdots$$
$$f^{(n)}(x) = \lg^n a\, e^{x \lg a}$$

Тому:

$$f(0) = 1;\ f'(0) = \lg a;\ f''(0) = \lg^2 a;\ f'''(0) = \lg^3 a \text{ і т.д.}$$

А тому ряд Маклорена має вигляд:

$$a^x = 1 + \frac{x \lg a}{1!} + \frac{(x \lg a)^2}{2!} + \frac{(x \lg a)^3}{3!} + \dots R$$

де $R = \frac{(x \lg a)^n}{n!} e^{\theta x \lg a}$

або беручи $x \lg a = y$, маємо:

$$R = \frac{y^n}{n!} e^{\theta y}$$

А ми перед цим довели, що при всякому y $\lim\limits_{n \dots \infty} R = 0$

Отже розкладення в ряд степенів x функції a^x можливе при кожному x

Коли візьмемо ряд:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \qquad (a)$$

і замінимо в ньому x на $-x$, то матимемо:

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} \qquad (б)$$

Взявши півсуму й півріжницю цих рядів (а) і (б) матимемо:

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2m}}{2m!}$$

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

Вартість $\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ має назву гіперболічного синуса,[1]

$$\operatorname{Sin}_{\text{гіп.}} x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$$

а вартість $\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ має назву гіперболічного косинуса

$$\operatorname{Cos}_{\text{гіп}} x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$$

§15. Розгорнення в ряд логарифмічної функції.

Функцію $\lg x$ розгорнути не можна, бо при $x=0$ ця функція має розрив тяглості ($\lg 0 = \infty$)
Розглянемо $f(x) = \lg(1+x)$. Маємо:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x};\ f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2};\ f'''(x) = \frac{1\cdot 2}{(1+x)^3};\ f^{(IV)}(x) = -\frac{1\cdot 2\cdot 3}{(1+x)^4}$$

і загалом: $$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

Тому:

$$f(0) = \lg 1 = 0;\ f'(0) = 1;\ f''(0) = -1;\ f'''(0) = 2!\ \text{і}\ f^n(0) = (-1)^{n-1}\cdot(n-1)!$$

Тому ряд Маклорена матиме вигляд:

$$\lg(x+1) = \frac{x}{1} - \frac{x^2\cdot 1!}{2!} + \frac{x^3\cdot 2!}{3!} - \frac{x^4 3!}{4!} + \dots$$

або:

$$\lg(x-1) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots (-1)^{n-2}\frac{x^{n-1}}{n-1} \qquad (2)$$

де R за взором Коші:

$$R = (-1)^{n-1}\frac{x^n(1-\theta)^{n-1}}{(1+\theta x)^n}$$

або (тут $\frac{(n-1)!}{(n-1)!}$ скорочується):

$$R = (-1)^{n-1}\frac{x}{1+\theta x}\cdot\left(\frac{x-x\theta}{1+x\theta}\right)^{n-1}$$

де $0<\theta<1$.

[1] бо по-грецькому ὑπερβολεύειν – ν – бовв.

Розглянемо випадки:

1) $|x| > 1$

В цьому разі ряд (2) є розбіжний, бо ознака Даламбера:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} : (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} -\frac{n}{n+1} x = \lim_{n\to\infty} -\left(1-\frac{1}{n+1}\right) x = -x$$

Отже при $|x|>1$ ряд є розбіжний, а при $|x|<1$ ознака Даламбера виконується і ряд має бути збіжним.

2) $|x| = 1$, себто при $x = \pm 1$

Коли $x = 1$, то ряд обертається в

$$\lg 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

це ряд гіпотетичний, а тому (як ми розглядали у вступі в аналізу) є збіжний.

Коли $x = -1$, то ряд обертається в

$$\lg 0 = -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \dots$$

або

$$\lg 0 = -\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots\right)$$

Це ряд гармонійний, що розбігається

3) Коли $|x| < 1$

Тоді розглядаючи $R = (-1)^{n-1} \frac{x}{1+\theta x} \cdot \left(\frac{x-x\theta}{1+x\theta}\right)^{n-1}$, маємо:

а) при $x > 0$

Дріб $\frac{x}{1+\theta x}$ завжди менше одиниці, бо $x<1$, $1+\theta x > 1$, а дріб $\frac{1-x\theta}{1+x\theta}$ - також менше одиниці, бо здобуток $x\theta$ при $x<1$ і $\theta<1$, буде:

$$x\theta < x$$

Тому: $0 < x - x_0 < 1$, а $1 + x_0 > 1$.

Ми знаємо, що коли дріб менший одиниці піднести у досить велику ступінь, то вислід ступінування може бути як завгодно малим, себто

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{x - x_0}{1 + x_0} \right)^{n-1} = 0$$

тому й $$\lim_{n \to \infty} R = 0$$

б) при $x < 0$ (але більшому -1)

Заступаючи x через $-y$, ми матимемо:

$$0 < y < 1$$

Тому: $$R = (-1)^{n-1} \frac{-y}{1 - \theta y} \cdot \left(\frac{-y + y\theta}{1 - y\theta} \right)^{n-1}$$

а) дріб $\frac{y}{1 - \theta y}$ є <u>також обмеженим</u>, бо при $y < 1$ і $\theta < 1$ здобуток $y\theta < 1$, а тому знаменатель завжди $\neq 0$ а чисельник цього дробу не більший одиниці

б) дріб $\frac{y - y\theta}{1 - y\theta} < 1$, бо $y < 1$, а відніймуючи з обох частин по $y\theta$ (що є менше y) матимемо:

$$y - y\theta < 1 - y\theta$$

Отже $$\frac{y - y\theta}{1 - y\theta} < 1$$

Тому $\lim_{n \to \infty} \left(\frac{y - y\theta}{1 - y\theta} \right)^{n-1} = 0$. А звідси

$$\lim_{n \to \infty} R = 0$$

Це доводить, що для всіх вартостей x, абсолютною величиною не менших від одиниці розвинення в степеневий ряд збігається:

$$\lg(1+x)$$

можливе, а саме:

$$\lg(1+x) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \cdots (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{n-1}$$

$|x|<1$

Цей ряд має свої недуготи, а саме:

1) дає можливість рогорнати логарифми не більше 2.

а 2) досить повільно збігається особливо при вартостях, що наближаються до 1.

Тому цей ряд перетворюють в другий такий шляхом:

Візьмімо даний ряд:

$$\lg(1+x) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots$$

і замінимо в ньому вартість x на $-x$:

$$\lg(1-x) = -\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \ldots$$

Тепер віднімемо другий ряд від першого і матимемо:

$$\lg(1+x) - \lg(1-x) = 2\left(\frac{x}{1} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \ldots\ldots\right)$$

Означимо суму $1+x$ через y, а різницю x через z, тоді матимемо:

$$\lg\frac{y}{z} = 2\left[\frac{y-z}{y+z} + \frac{1}{3}\left(\frac{y-z}{y+z}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{y-z}{y+z}\right)^5 + \ldots\right]$$

Знаючи $\lg z$, ми за допомогою даного взору обчислимо $\lg y$. Очевидно, що ряд буде збігатися тим скорше, чим більша різниця між знаменником і чисельником (себто між величинами: $y+z$ і $y-z$)

Приклади.

1). $\lg\frac{y}{z} = \lg\frac{2}{1}$

$$\lg 2 - \lg 1 = 2\left[\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3^2} + \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^5} + \cdots\right] = 0{,}6931471\ldots$$

2). $\ln \frac{y}{x} = \ln \frac{3}{2}$

$\ln 3 - \ln 2 = 2\left[\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5^3} + \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{5^5} + \frac{1}{7}\cdot\frac{1}{5^7} + \cdots\right] = 0,0986122\ldots$

Очевидно, що логарифми складних чисел, напр. $6 = 3\cdot 2$; $8 = 2^3$; $36 = 3^2\cdot 2^2$ і т.д. знайдуться шляхом складання й множення основних логарифмів, напр. $\ln 24 = \ln 3 + 3\ln 2$.

Ми вже знаємо, що для того щоб перейти від природніх логарифмів до десяткових, т.т. відповідні природні логарифми ~~ми можемо~~ помножити на модуля:

$$M = 0,43429448\ldots$$

Напр. $\ln_e 2 = 0,6931471\ldots$ Множивши на M, маємо: $\lg 2 = 0,30102685\ldots$, або $\lg 2 = 0,30103$.

§16 Розгорнення в ряди степенів х функції $f(x) = (1+x)^m$, де m є якесь реальне число.

Всі похідні функції існують, а саме:

$$f'(x) = m(1+x)^{m-1}; \quad f''(x) = m(m-1)(1+x)^{m-2}$$

$$f'''(x) = m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3} \quad \text{і т.д.}$$

$$f^{(n)}(x) = m(m-1)(m-2)\ldots(m-n+1)(1+x)^{m-n}$$

Звідси маємо такі Маклоренові функції

$f(0) = 1$; $f'(0) = m$; $f''(0) = m(m-1)$ і т.д. $f^{(n-1)}(0) = m(m-1)\ldots(m-n+2)$

Тому:

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 +$$

$$+ \cdots + \frac{m(m-1)\ldots(m-n+2)}{(n-1)!}x^{n-1} + R \qquad (A)$$

де R_n, взятий за видом Коші, буде:

$$R_n = \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)(1-\theta)^{n-1}x^n}{(n-1)!}(1+\theta x)^{m-n}$$

Ми, знаючи що при m цілому й додатньому цей ряд урвиться сам собою, бо починаючи з певного місця всі наступні обертаються в нуля.

При цьому вартостях m цей ряд є безмежним

Отже, ми розглянемо цей ряд як для m дробового, або від'ємного.

1ий випадок. $|x|>1$

Тоді ряд є розбіжний, бо взявши основу Даламбера, ми бачимо, що:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{m(m-1)\dots(m-n)}{(n+1)!}x^{n+1} : \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n\right] =$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{m-n}{n+1}x\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\frac{m}{n}-1}{1+\frac{1}{n}}\right)x = -x$$

Отже при $|x|>1$ ряд є розбіжний.

У 2ому випадку $x=\pm 1$ ми приходимо до конкретних ступенів 2^m: 0, а тому ми розглядати їх не будемо. Перейдемо до наступних випадків, а саме:

3ій випадок. $|x|<1$

Розглянемо членку останнього члену:

$$R_n = \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{(n-1)!}x^n(1-\theta)^{n-1}(1+\theta x)^{m-n}$$

При простуванні $n\dots\infty$

Напишемо цей член так:

$$R_n = \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^{n-1}\cdot(1+\theta x)^{m-1}\cdot\left(\frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{(n-1)!}x^n\right)$$

1) Дріб $\frac{1-\theta}{1+\theta x}$ а) при $x>0$ - є менший від одиниці.

б) при $x<0$ (але, коли $|x|<1$), маємо $\frac{1-\theta}{1+\theta x} = \frac{1-\theta}{1-\theta|x|}$, але $0<\theta<1$, то здобуток двох дробів менших від одиниці

$$\theta|x| < \theta$$

а тому $1-\theta|x| > 1-\theta$ і дріб $\frac{1-\theta}{1+\theta x}$ при $x<0$ буде також правильний.

В цьому разі завжди можна взяти n остільки великим, що цей дріб може бути менш малого наперед заданого числа, себто:

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^{n-1} = 0$$

2) Число $(1+\theta x)^{m-1}$ є обмежена величина, бо коли $0<\theta<1$; $|x|<1$, то двочлен $1+\theta x$ - є обмежений (ні нуль, ні безмежність, а ступінь m є також обмежений.

3) Член

$$a_n = \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{(n-1)!} x^n$$

Цей член можна розкладати, як n-й член ряду:

$$\frac{m(m-1)}{1} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{2!} x^3 + \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{3!} x^4 + \dots\dots +$$

$$+ \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{(n-1)!} x^n$$

Коли ряд цей буде збіжний, то останній його член a_n буде прямувати до нуля при $n \to \infty$

Вживаємо ознаку Даламбера:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \to \infty} \left[\frac{m(m-1)\dots(m-n+1)(m-n)}{n!} x^{n+1} : \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{(n-1)!} x^n\right] =$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{m-n}{n} x = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{m}{n} - 1\right) x = -x$$

Отже коли $|x|<1$, то ряд збіжний, а тому

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{(n-1)!} x^n = 0$$

тобто маємо:

$$\lim_{n\to\infty} R_n = 0$$

Тобто ряд (A) збігається при $|x|<1$ і його сума дорівнює $(1+x)^m$.

Висновки.

1) Беручи $x = -y$, одержимо:

$$(1-y)^m = 1 - my + \frac{m(m+1)}{2!}y^2 - \frac{m(m+1)(m-2)}{3!}y^3 + \dots$$

$$\dots + (-1)^{n-1}\frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{(n-1)!}y^{n-1} \qquad (B)$$

2) Беручи $m = -k$, одержимо: 1) зі взору (A)

$$\frac{1}{(1+x)^k} = 1 - kx + \frac{k(k+1)}{2!}x^2 - \frac{k(k+1)(k+2)}{3!}x^3 + \dots \qquad (C)$$

2 зі взору (B)

$$\frac{1}{(1-x)^k} = 1 + kx + \frac{k(k+1)}{2!}x^2 + \frac{k(k+1)(k+2)}{3!}x^3 + \dots \qquad (D)$$

3) Беручи $k = 1$ одержимо

а) зі взору (C):

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

б) зі взору (D)

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

4) Беручи $x = \frac{y}{a}$ де $y < a$ зі взорів (C) і (D) маємо:

$$\frac{1}{a+x} = \frac{1}{a} - \frac{x}{a^2} + \frac{x^2}{a^3} - \dots$$

$$\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a} + \frac{x}{a^2} + \frac{x^2}{a^3} + \dots$$

Вправи.

1° Розкласти в степені: $f(x) = \operatorname{arcsin} x$ і $f(x) = \operatorname{arctg} x$ і обчислити межі збіжності степенів; також, беручи в 1-му степені $x = \frac{1}{2}$, а в 2-му $x = 1$, обчислити π.

Відповіді.

$$\operatorname{arcsin} x = x + \frac{1}{2.3}x^3 + \frac{1.3}{2.4.5}x^5 + \dots$$

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{4} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

Збіжні при $|x| < 1$.

$$\operatorname{arcsin}\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2.3.2^3} + \frac{1.3}{2.4.5.2^5} + \dots$$

§17 Взори Ейлера для тригонометричних функцій

Ми вивели:

$$e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} + \dots \frac{y^n}{n!} \quad (a)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (б)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} \quad (в)$$

У взорі (а) берем $y = ix$, тоді:

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

або:

$$e^{ix} = \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!}\right] + i\left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right] \quad (г)$$

або, користуючися взорами (б) і (в), маємо:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (д)$$

Далі беручи у взорі (г) $x = -x$, одержимо:

$$e^{-ix} = \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right] - i\left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots\right]$$

а звідси: $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$ . . . . . (же)

Отже можна написати:

$$a \pm ib = \rho(\cos x \pm i \sin x) = \rho e^{\pm i\varphi}$$

А з другого боку додавши и віднімаючи рівності (d) і (же) одержимо взори Ейлера:

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \; ; \qquad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

що висловлюють тригонометричні функції через показникові.

§18. Розкриття невизначеностей за допомогою розкриття функцій в степеневі ряди невизначників.

Крім способів розкриття невизначеностей указаних нами в попередньому курсі, зупинимося тут ще на одному способі[1] за допомогою розкриття функцій в степеневі ряди незалежних змінних.

Припустімо, що маємо дріб функцій, що при вартостях незалежного $x = a$ дають невизначеність $\frac{0}{0}$. Припустімо також, що за допомогою теореми Маклорена ми можемо подати чисника і знаменника розкрутим в ряди з степенів x.

Коли тепер ми чисника і знаменника виразимо за найпростіші функції x, то, або в чисника, або в знаменника, або в обох разом ми одержимо член, що не містить x, тому беручи межу вартости дробу при $x = a$, ми матимемо або 0 (коли в чисника є вільний член),

[1] обчислення правдивих вартостей невизначеностей

або 0 (коли вільний член є в знаменнику), або обмежене число (в останньому випадкові), що й буде правдивою вартістю невизначеності.

Приклад 1 $u = \frac{x^2}{2\sin^2\frac{x}{2}}$ при $x = 0$

Отже $u = \frac{x^2}{1-\cos x}$, але $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$, тому

$u = \frac{x^2}{1 - 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} - \dots}$ скорочуючи на x^2, маємо:

$u = \frac{1}{\frac{1}{2!} - \frac{x^2}{4!} + \frac{x^4}{6!} - \dots}$, а звідси: $\lim\limits_{x \to 0} u = \frac{1}{\frac{1}{2!}} = 2$

Приклад 2. $u = \sec x - \operatorname{tg} x$; при $x = \frac{\pi}{2}$

Це є невизначеність типу $\infty - \infty$, тому перетворюємо: $u = \frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \frac{1 - \cos(\frac{\pi}{2} - x)}{\sin(\frac{\pi}{2} - x)} = \frac{1 - \cos y}{\sin y}$

(де $y = \frac{\pi}{2} - x$). Треба знайти $\lim u = \frac{1 - \cos y}{\sin y}$ при $y = 0$

$u = \frac{1 - 1 + \frac{y^2}{2!} - \frac{y^4}{4!} + \dots}{\frac{y}{1} - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} + \dots}$ після скорочення на y, матимемо:

$$\lim_{y \to 0} u = \frac{\frac{y}{2!} - \frac{y^3}{4!} + \dots}{1 - \frac{y^2}{3!} + \dots} = \frac{0}{1} = 0$$

§19. Ряд Тейлора для функцій кількох незалежних.

Для функцій одного незалежного ми мали:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \dots + \frac{h^{n-1}f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{h^n f^{(n)}(x+\theta h)}{n!}$$

(останній член беремо за Лагранжем)

Ми знаємо, що:

$$f'(x)h = df(x) = du$$
$$f''(x)h^2 = d^2f(x) = d^2u$$
$$\dots\dots\dots\dots$$
$$\dots\dots\dots\dots$$

$$f^{(n-1)}(x)\,h^{n-1} = d^{n-1}f(x) = d^{n-1}u$$

$$\text{і}\quad f^{(n)}(x+\theta h)(h\theta)^n = d^n f(x+\theta h) = d^n u_0$$

Тоді:

$$f(x+h) - f(x) = du + \frac{d^2u}{2!} + \frac{d^3u}{3!} + \dots \frac{d^{n-1}u}{(n-1)!} + \frac{d^n u_0}{n!} \quad (A)$$

Доведемо тепер, що цей вигляд лиш й через від кількох незалежних. Справді, хай $u = f(x, y, z \dots)$, ..а' приростами незалежних будуть $h, k, l \dots$, себто наша різниця функцій (див. (A) ліву частину) буде:

$$f(x+h, y+k, z+l, \dots) - f(x, y, z \dots)$$

Візьмімо довільну величину t і помножимо на неї всі наші прирощення й означимо через $\xi = x + ht$; $\eta = y + kt$; $\zeta = z + lt \dots$. Маємо тепер:

$$f(x+ht, y+kt, z+lt \dots) = f(\xi, \eta, \zeta \dots)$$

Нову функцію $f(\xi,\eta,\zeta)$ можна розглядати, як певну функцію t, себто:

$$f(\xi, \eta, \zeta) = \varphi(t)$$

при чому при $t=0$, ми одержуємо $f(x, y, z)$, себто:

$$\varphi(0) = f(x, y, z \dots)$$

а при $t=1$ одержуємо:

$$\varphi(1) = f(x+h, y+k, z+l, \dots)$$

За Маклореном ми можемо написати:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)t}{1!} + \frac{\varphi''(0)t^2}{2!} + \dots \frac{\varphi^{(n)}(\theta t)t^n}{n!} \quad (\bar{1})$$

Отже треба нам знайти всі п похідні $\varphi(t) = f(\xi, \eta, \zeta \dots)$.

Коли візьмемо який p-й похід функції, то ми матимемо:

$$d^p\varphi(t) = d^p f(\xi, \eta, \zeta \dots) = \left(\frac{\partial}{\partial\xi}d\xi + \frac{\partial}{\partial\eta}d\eta + \frac{\partial}{\partial\zeta}d\zeta \dots\right)^p f(\xi, \eta, \zeta \dots)$$

але $\xi = x + ht$, тому $d\xi = h\,dt$ і аналогічно $d\eta = \kappa\,dt$; $d\zeta = l\,dt$ і т.д. Тому:

$$d^p\varphi(t) = d^p f(\xi, \eta, \zeta \ldots) = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} h\,dt + \frac{\partial}{\partial \eta}\kappa\,dt + \frac{\partial}{\partial \zeta} l\,dt \ldots\right)^p f(\xi, \eta, \zeta \ldots)$$

або:

$$d^p\varphi(t) = d^p f(\xi, \eta, \zeta \ldots) = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} h + \frac{\partial}{\partial \eta}\kappa + \frac{\partial}{\partial \zeta} l + \ldots\right)^p \cdot (dt)^p f(\xi, \eta, \zeta \ldots)$$

А звідси, поділивши обидві частини на $(dt)^p$, маємо:

$$\varphi^{(p)}(t) = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} h + \frac{\partial}{\partial \eta}\kappa + \frac{\partial}{\partial \zeta} l + \ldots\right)^p \cdot f(\xi, \eta, \zeta \ldots)$$

При $t = 0$, матимемо:

$$\varphi^{(p)}(0) = \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y}\kappa + \frac{\partial}{\partial z} l + \ldots\right)^p \cdot f(x, y, z \ldots)$$

(бо $\xi = x + ht$, а при $t = 0$ $\xi = x$, аналогічно $\eta = y$; $\zeta = z \ldots$)

Даючи p вартості $1, 2 \ldots n$, ми одержимо всі вартості: $\varphi'(0)$, $\varphi''(0) \ldots \varphi^{(n)}(0)$ і вставляючи їх у рівність (I), матимемо:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y}\kappa + \frac{\partial}{\partial z} l \ldots\right) t f}{1!} + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y}\kappa + \frac{\partial}{\partial z} l \ldots\right)^2 t^2 f^2}{2!} +$$

$$+ \ldots\ldots + \frac{\left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y}\kappa + \frac{\partial}{\partial z} l \ldots\right)^{n-1} \cdot t^{n-1} \cdot f^{n-1}}{(n-1)!} + R_n \qquad (\text{II})$$

Нам треба знайти вартість розгорнення рівності:

$$f(x + h, y + \kappa, z + l \ldots) - f(x, y, z \ldots)$$

Але:

$$f(x + h, y + \kappa, z + l \ldots) - f(x, y, z \ldots) = \varphi(1) - \varphi(0)$$

а тому вставляючи в рівність (II) $t = 1$, і переносячи $\varphi(0)$ в ліву частину, одержимо:

$$f(x + h, y + \kappa, z + l \ldots) - f(x, y, z \ldots) = \varphi(1) - \varphi(0) =$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y}\kappa + \frac{\partial}{\partial z} l \ldots\right) f + \frac{1}{2!}\left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y}\kappa + \frac{\partial}{\partial z} l \ldots\right)^2 f + \frac{1}{3!}\left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y}\kappa + \frac{\partial}{\partial z} l \ldots\right)^3 f \ldots + R_n$$

Але приростання $h = dx$, $k = dy$; $l = dz$, тому вирази:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy + \frac{\partial}{\partial z}dz + \dots\right)^p f = d^p f(x, y, z \dots) = d^p u$$

де $p = 1, 2, 3 \dots n$. Отже:

$$f(x+h, y+k, z+l \dots) - f(x, y, z \dots) = du + \frac{d^2u}{2!} + \frac{d^3u}{3!} + \dots R_n$$

де $R_n = \frac{d^n u_0}{n!} = \frac{1}{n!}\left[\left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy + \frac{\partial}{\partial z}dz + \dots\right)^n f(x, y, z \dots)\right]_{\substack{x = x+\theta h \\ y = y+\theta k \\ z = z+\theta l}}$

при $0 < \theta < 1$.

Себто маємо вже ознайомлений, нам вже для функцій з одним незалежним.

§20 Максимум і мінімум невизначеної функції

Коли в попередньому курсі ми розглядали максимум і мінімум функції, то ми зупинялися на випадку лише визначеної функції від одної незалежної змінної. Тепер розглянемо ще випадок максимума й мінімума від функції невизначеної

Хай маємо цілого функцію буде:

$$u = f(x, y) = 0 \quad \dots \quad (a)$$

де y є якась алгебрична функція x. Вважаємо в цьому разі, як і раніш $f'_x(x, y)$ для цілого інтервала вартостей x і y перівного з нулем, ми знайдемо першу похідну y' так як це робили в попередньому курсі, а саме:

$$y' = -\frac{f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)} \quad \dots \quad (b)$$

Функція y' є цілого в деяких границях (бо

f'_x і f'_y - можуть мати відмінні від нуля значення (y є неявна функція x), а тому беручи на увагу, що y' при максимумі й мінімумі функції дорівнює нулю, вона має обертатися в нуль.

Раз $f'_y(x,y) \neq 0$, то має бути в цьому разі $f'_x(x,y)=0$ Таким чином для визначення координат x і y, при яких може бути або максимум, або мінімум, ми маємо систему рівнянь.

$$\left.\begin{aligned} f(x,y) &= 0 \\ f'_x(x,y) &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (b)$$

Припустимо, що розв'язавши цю систему, ми одержимо:

$$x = \alpha \; ; \quad y = \beta$$

Тоді, як нам відомо, щоб довідатися, чи при $x=\alpha$, і $y=\beta$ є максимум або мінімум, ми маємо знайти знак другої похідної y''. Тому складаємо цю похідну.

Ми знаємо, що:

$$f'(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y'$$

Звідси:

$$f''(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (y')^2 + \frac{\partial f}{\partial y} y'' = 0$$

або: $$f''(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (y')^2 + \frac{\partial f}{\partial y} y'' = 0$$

Але при даних величинах $x=\alpha$; $y=\beta$ перша похідна $y'=0$, тому:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial f}{\partial y} y'' = 0$$

Отже: $$y'' = -\left(\frac{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = -\frac{f''_{xx}(x,y)}{f'_y(x,y)} \right)_{\substack{x=\alpha \\ y=\beta}}$$

Коли в цьому разі 1) вартість $y'' < 0$, то (як ми знаємо) буде максимум

2) $y'' > 0$ мінімум

3) $y'' = 0$, то питання не вирішене й вимагає дослідження наступних похідних.

Приклад $f(x,y) = x^3 + y^3 - 8xy = 0$

Маємо: $f'_x = 3x^2 - 8y$; $f'_y = 3y^2 - 8x$

Системка:

$$x^3 + y^3 - 8xy = 0$$
$$3x^2 - 8y = 0$$

дає розв'язки: $\alpha_1 = 0$, $\beta_1 = 0$; $\alpha_2 = \frac{8\sqrt[3]{2}}{3}$, $\beta_2 = \frac{8\sqrt[3]{4}}{3}$ і т.д.

Обмежимося розглядом лише реального розв'язку α_2 і β_2 не рівного з нулем (бо α_1 і β_1 негодиться, бо при них $f'_y(x,y) = 0$).

$f''_{xx}(x,y) = 6x$, тому:

$$y''_{(x=\alpha_2)} = -\left(\frac{6x}{3y^2 - 8x}\right)_{\substack{x=\alpha_2 \\ y=\beta_2}} = -\left(\frac{2\sqrt[3]{2}}{8\sqrt[3]{4} - \frac{8\sqrt[3]{2}}{3}}\right) = -\frac{3}{32}$$

Отже вартости α_2 і β_2 - є максимум

§21 Максимум і мінімум визначених функцій від двох незалежних.

Припустім, що маємо:

$$u = f(x,y)$$

від двох незалежних x і y.

З попередніх визначень максимуму й мінімуму функції від одного незалежного, очевидно що під максимумом функції u, ми будемо розуміти ту вартість цієї функції при вартостях $x = \alpha$ і $y = \beta$, коли існує таке рівність:

$$f(\alpha + h, \beta + k) < f(\alpha, \beta)$$

при всіх можливих додатніх і від'ємних h і k близьких до нуля.

Максимум умового мінімума тієї ж функції буде:

$$f(\alpha+h, \beta+k) > f(\alpha, \beta)$$

також при всіх можливих додатніх і від'ємних h і k досить близьких до 0.

Загальна різниця:

$$f(\alpha+h, \beta+k) - f(\alpha, \beta)$$

лишить при всіх можливих додатніх і від'ємних величинах h і k (близьких до 0), затримувати знак „мінус" при максимумі, а „плюс" при мінімумі.

Коли ж зі зміною знаку h або k і знак різниці змінюється, то ні максимуму, ні мінімуму не існує.

Доведемо теорему: <u>Конечною умовою того, щоб при даних величинах $x=\alpha$, $y=\beta$ дана функція від двох незалежних $f(x,y)$ мала або максимум, або мінімум є рівність з нуля при цих величинах x і y її окремих перших похідних, себто $f'_x(\alpha,\beta)=0$ і $f'_y(\alpha,\beta)=0$</u>

Ми вже казали, що для максимума, або мінімума лишить приростання функції

$$f(\alpha+h, \beta+k) - f(\alpha,\beta) \lesseqgtr 0$$

зберігати сталий знак для всіх можливих h і k близьких до нуля. Отже це приростання має зберігати той же знак коли δ і $k=0$, себто:

$$f(\alpha+h,\beta)-f(\alpha,\beta)\lessgtr 0$$

Але за теоремою Лагранжа:

$$f(\alpha+h,\beta)-f(\alpha,\beta)=h f'_x(\xi,\beta)$$

де ξ якесь середнє значення між α і $\alpha+h$. Функція $f'_x(\alpha,\beta)$, а разом і $f'_x(\xi,\beta)$ - стала ~ , а тому, коли $f'_x(\alpha,\beta)\neq 0$, то $f'_x(\xi,\beta)$ <u>мусить зберігати свій знак для всіх досить малих значень h.</u>

Отже в цих умовах здобуток:

$$h f'_x(\xi,\beta)$$

що має другий сомножник сталого знаку, <u>змінює-</u>ться свій знак разом зі зміною знаку h, а тому й приріст функції змінює свій знак.

Значить тоді, коли $f'_x(\alpha,\beta)\neq 0$, то немає ні max-imum'a, ні minimum'a

Значить, для існування maximum'a, або minimum'a конечно мусить $f'_x(\alpha,\beta)=0$. Аналогічно, беручи $h=0$ доведемо конечність умови:

$$f'_y(\alpha,\beta)=0$$

Ці умови дають нам для визначення величин $x=\alpha$ і $y=\beta$, тому систему рівнянь:

$$\left.\begin{aligned} f'_x(x,y)&=0\\ f'_y(x,y)&=0\end{aligned}\right\}\quad\dots(a)$$

Розв'язуючи її ми й одержимо потрібні $x=\alpha$; $y=\beta$. Зважаючи на те, що при нескінченно малих x і y величини похідних dx і dy - цілком довільні, то умову існування maximum'a й minimum'a можемо написати ще й так:

$$\underset{x=\alpha;\ y=\beta}{du} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\,dx + \frac{\partial u}{\partial y}\,dy\right)_{\substack{x=\alpha\\ y=\beta}} = 0$$

де цей двочлен при довільних dx і dy буде рівний нулеві тоді, коли $\frac{\partial u}{\partial x}=0$ і $\frac{\partial u}{\partial y}=0$. Таким чином:

Потрібно і достатньо, щоб при даних вартостях $x=\alpha$, $y=\beta$ функція $f(x,y)$ мала максимум або мінімум є рівність з нулеві цілого порядку (диференціала)

Тепер розслідуємо, коли ця функція буде мати максимум, а коли мінімум.

Доведемо теорему:

Коли $f(x,y)$ при даних вартостях $x=\alpha$; $y=\beta$ має перший цілий порядок рівний з нулеві то вона матиме:

1) максимум, коли при тих же вартостях $x=\alpha$, $y=\beta$, різниця:

$$f''_{xx}(\alpha,\beta)\cdot f''_{yy}(\alpha,\beta) - \left(f''_{xy}(\alpha,\beta)\right)^2 > 0 \quad (1)$$

і $f''_{xx}(\alpha,\beta) < 0$ (2)

2) мінімум, коли при тих же умовах і при тому же сенсу вартости розглянутої різниці (1):

$$f''_{xx}(\alpha,\beta) > 0$$

Коли ж задана різниця:

$$f''_{xx}(\alpha,\beta)\cdot f''_{yy}(\alpha,\beta) - \left(f''_{xy}(\alpha,\beta)\right)^2 < 0$$

то не існує ні мінімум, ні максимум;

і нарешті, коли ця різниця є рівна з нулеві, то справа лишається не зясованою й вимагає дальших досліджень.

Для спрощення введемо, вживані при цьому, позначення:

$$f''_{xx}(\alpha,\beta)=\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_{\substack{x=\alpha\\y=\beta}}=A;\quad f''_{xy}(\alpha,\beta)=\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)_{\substack{x=\alpha\\y=\beta}}=B;\quad f''_{yy}(\alpha,\beta)=\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)_{\substack{x=\alpha\\y=\beta}}=C$$

тоді наша умова має вигляд:

$$AC-B^2$$

і коли $AC-B^2>0$, то існує або max, коли $A<0$, або min, коли $A>0$. А коли $AC-B^2<0$, то немає ні max, ні min, і, нарешті, коли $AC-B^2=0$, то справа є нерозв'язаною.

Хай розв'язками рівнань (a) будуть $x=\alpha;\ y=\beta$

Тоді візьмім досить близькі до α і β вартості x і y:

$$x=\alpha+h\ ;\quad y=\beta+k$$

де h і k наближуються до нуля. За взором Тейлора маємо:

$$f(\alpha+h,\beta+k)=f(\alpha,\beta)+\frac{1}{1!}\left(\frac{\partial}{\partial x}h+\frac{\partial}{\partial y}k\right)f(\alpha,\beta)+$$

$$+\frac{1}{2!}\left(\frac{\partial}{\partial x}h+\frac{\partial}{\partial y}k\right)^2 f(\alpha,\beta)+\cdots R_n$$

Для нашого дослідження досить зупинитись ще перед на другому члені й ми маємо:

$$f(\alpha+h,\beta+k)-f(\alpha,\beta)=\left(\frac{\partial f(\alpha,\beta)}{\partial x}h+\frac{\partial f(\alpha,\beta)}{\partial y}k\right)+$$

$$+\frac{1}{2!}\left(\frac{\partial}{\partial x}h+\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(\alpha+\theta h,\beta+\theta k)\quad \text{де } 0<\theta<1$$

Ми знаємо, що умовою існування max'а й min'а є $\frac{\partial f(\alpha,\beta)}{\partial x}=f'_x(\alpha,\beta)=0$ і $\frac{\partial f(\alpha,\beta)}{\partial y}=f'_y(\alpha,\beta)=0$

а тому нам вгір у цьому випадку матиме вигляд:

$$f(a+h, b+k) - f(a,b) = \frac{1}{2!}\left(\frac{\partial}{\partial x}h + \frac{\partial}{\partial y}k\right)^2 f(a+\theta h, b+\theta k)$$

З аналогією з означеннями $f''_{xx}(a,b) = A$ і т. д. Означимо:

$$f''_{xx}(a+\theta h, b+\theta k) = \frac{\partial^2 f(a+\theta h, b+\theta k)}{\partial x^2} = A_\theta$$

$$f''_{xy}(a+\theta h, b+\theta k) = \frac{\partial^2 f(a+\theta h, b+\theta k)}{\partial x \partial y} = B_\theta$$

і $$f''_{yy}(a+\theta h, b+\theta k) = \frac{\partial^2 f(a+\theta h, b+\theta k)}{\partial y^2} = C_\theta$$

і матимемо:

$$\Delta = f(a+h, b+k) - f(a,b) = \frac{1}{2}\left[A_\theta h^2 + 2B_\theta hk + C_\theta k^2\right]$$

Очевидно нам приросту функції залежатиме знаку правої частини, яку й будемо досліджувати.

Припустимо, що $A_\theta \neq 0$, тоді:

$$\Delta = \frac{1}{2A_\theta}\left[A_\theta^2 h^2 + 2A_\theta B_\theta hk + A_\theta C_\theta k^2\right] =$$

$$= \frac{1}{2A_\theta}\left[A_\theta^2 h^2 + 2A_\theta B_\theta hk + B_\theta k^2 - B_\theta^2 k^2 + A_\theta C_\theta k^2\right] =$$

$$= \frac{1}{2A_\theta}\left[(A_\theta h + B_\theta k)^2 + (A_\theta C_\theta - B_\theta^2)k^2\right]$$

Отже знак Δ незалежно від величин h і k (бо вони в квадратах) залежатиме від знаків 1) A_θ 2) $(A_\theta C_\theta - B_\theta^2)$

I Нехай $A_\theta C_\theta - B_\theta^2 > 0$

тобто многочлен в квадратових дужках завжди додатній і знак приросту функції залежатиме лише від знаку A_θ, себто коли $A_\theta < 0$ максимум, $A_\theta > 0$ мінімум.

Коли $A_0 C_0 - B_0^2 < 0$, то, щоб переконатися, що вираз:

$$\left[(A_0 h + B_0 k)^2 + (A_0 C_0 - B_0^2) k^2\right]$$

змінює знак в залежності від величини h і k, досить взяти два яких будь окремих випадків, напр., коли при $k \neq 0$ віднімемо для h такту величину, щоб перший член в дужках обертався в нуль, себто $h = -\frac{B_0}{A_0} k$ (що одержимо, розв'язавши рівняння $A_0 h + B_0 k = 0$), то при $(A_0 C_0 - B_0^2) < 0$ многочлен в дужках буде від'ємним. Навпаки, коли при $h \neq 0$ такому ж k буде наближатися до нуля, то многочлен в дужках матиме знак однаковий з членом $A_0^2 h^2$, себто буде додатнім.

Зокрема на такій функції:

$$A_0 = f''_{xx}(\alpha + h, \beta + k)$$

залежить сталий знак, а через те знак приросту Δ буде змінюватися в залежності від знаку величини многочлена в дужках. Отже ні max., ні min. не буде.

Випадок, коли $A_0 = 0$ зводиться до тільки що розглянутого, бо тоді:

$$A_0 C_0 - B_0^2 = -B_0^2 < 0$$

Величини:

$$A_0 = f''_{xx}(\alpha + h, \beta + k)$$

$$B_0 = f''_{xy}(\alpha + h, \beta + k)$$

$$C_0 = f''_{yy}(\alpha + h, \beta + k)$$

є безумовно функціями h і k (бо α і β є певні сталі величини). Ми розглядаємо ці функції при всіх

можливих вартостей h і k, а тому вважаємо A_0, B_0 і C_0 за <u>певні</u> функції h і k.

Вартості A, B і C є неповними вартостями функцій A_0, B_0 і C_0 коли h і k прямують до нуля. В силу своєї малості при достатньо малих абсолютних величинах h і k A і A_0, B і B_0, C і C_0 будуть однакового знаку, а разом і різниці:

$$A_0C_0 - B_0^2 \quad \text{і} \quad AC - B$$

також будуть однакових знаків, тому при дослідженні максимум'а й мінімум'а замість виразу $A_0C_0 - B_0^2$, досить, а практично зручніш, користатися з виразу $AC - B^2$

Отже 1) коли

$$AC - B^2 > 0$$

то при $A<0$ максимум, а при $A>0$ мінімум

2) коли

$$AC - B^2 < 0$$

немає ні максимума, ні мінімума і

3) коли

$$AC = B^2$$

то справа стоїть ще не розв'язаною. На дослідження цього випадку ми не зупиняємося

<u>Приклад 1</u> Сума всіх вимірів прямокутного бруса S, який з усіх брусів має найбільший об'єм!

Задача зводиться до поділу числа на три такі частини, щоб їх здобуток був максимум. Хай частини будуть x, y і $S-(x+y)$. Тоді

$$u = xy(S-x-y) = Sxy - x^2y - xy^2$$

Щоб він був maximum або minimum, треба щоб $f'_x(u)=0$, $f'_y(u)=0$. Тому:

$$f'_x(u) = 5y - 2xy - y^2 \qquad f'_y(u) = 5x - x^2 - 2xy$$

Маємо систему:

$$y^2+(2x-5)y=0;\ y=0;\ y+2x-5=0 \qquad x^2+(2y-5)x=0;\ x=0;\ x+2y-5=0$$

$$\begin{array}{r} 2y+4x-25=0 \\ -\ x+2y-5=0 \\ \hline 3x-5=0 \end{array}$$

$$x_1=0 \quad x_2=0 \quad x_3=5 \quad x_4=\frac{5}{3}$$

$$y_1=0 \quad y_2=5 \quad y_3=0 \quad y_4=\frac{5}{3}$$

Очевидно, що ні один із розв'язків: x_1, x_2, x_3 не відповідає задачі (бо нульових вимірів бруса не має), крім розв'язків x_4, y_4. Тоді 3-ій руб: $z=5-\frac{5}{3}-\frac{5}{3}=\frac{5}{3}$. Довідаймося, чи це буде maximum?

$$f''_{xx}(u) = -2xy; \qquad A = -\frac{25}{3}$$

$$f''_{xy}(u) = 5-2x-2y \qquad B = 5-\frac{25}{3}-\frac{25}{3} = -\frac{5}{3}$$

$$f'_{yy}(u) = 2x \qquad C = -\frac{25}{3}$$

Отже $AC-B^2 = \frac{45^2}{9} - \frac{5^2}{9} = \frac{5^2}{3} > 0$. Раз $A=-\frac{25}{3}<0$ то маємо maximum.

Отже при даній умові найбільшого об'єму бруса має бути кубом.

Приклад 2. Який з прямокутних брусів, що має сталий об'єм $V=a^3$ має найменшу поверхню. Означимо руби бруса через $x, y, z=\frac{a^3}{xy}$. Тоді поверхня:

$$u = S = 2xy + 2\frac{a^3}{y} + 2\frac{a^3}{x}$$

$$u'_x = 2y - 2\frac{a^3}{x^2}; \qquad u'_y = 2x - \frac{2a^3}{y^2}$$

$y-\frac{a^3}{x^2}=0$; $x^2y=a^2$ (1); $x^3y^3=a^6$ Поділивши почергі рівняння (1) і (2) на (3) маємо: $x=a$; $y=a$

$x-\frac{a^3}{y^2}=0$ $xy^2=a^3$ (2); $xy=a^2$ (3)

Решта нереальних розв'язків рівнянь:

$$x^3 = a^3 \; ; \quad y^3 = a^3$$

нам логічно не відповідають.

Отже $x = a$; $y = a$; $z = a$

$$U''_{xx} = \frac{4a^3}{x^3} \; ; \quad U''_{xy} = 2 \; ; \quad U''_{yy} = \frac{4a^3}{y^3}$$

$$A = 4 \; ; \quad B = 2 \; ; \quad C = 4$$


$$AC - B^2 = 16 - 2 > 0$$

але $A = 4 > 0$, тому маємо мінімум. Значить із всіх брусів даного об'єму найменшу поверхню має куб.

Приклад 3. В круг ввести Δ-к з найбільшим полем.

Бокн введеного в коло Δ будуть:

$$a = 2r \sin x \; ; \quad b = 2r \sin y$$



$$S_\Delta = \frac{ab \sin[\pi - (x+y)]}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4r^2 \sin x \sin y \sin(x+y) = 2r^2 \sin x \sin y \sin(x+y)$$

Ясно, що треба знайти максимум здобутку:

$$U = \sin x \cdot \sin y \cdot \sin(x+y)$$

$$U'_x = \cos x \sin y \sin(x+y) + \sin x \sin y \cos(x+y)$$

$$U'_y = \sin x \cos y \sin(x+y) + \sin x \sin y \cos(x+y)$$

Системка:

$$\begin{cases} \cos x \sin y \sin(x+y) + \sin x \sin y \cos(x+y) = 0 \\ \sin x \cos y \sin(x+y) + \sin x \sin y \cos(x+y) = 0 \end{cases}$$

Перенесемо другий член у праву частину й поділимо їх почленно рівняння

тоді: $\operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{tg} y = 1 \; ; \quad \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} y$

$$\cos x \sin(x+y) = -\sin x \cos(x+y) \qquad \sin y = 0$$

$$\operatorname{tg}(x+y) = -\operatorname{tg} x \qquad \sin x = 0$$

А перетворюючи функцію $\operatorname{tg}(x+y)$ за тригон. взорами

маємо: $\frac{tg x + tg y}{1 - tg x \cdot tg y} = -tg x$; $\frac{2tg x}{1 - tg^2 x} = -tg x$; $tg x = 0$

$2 = -1 + tg^2 x$; $tg x = \pm\sqrt{3}$; $x = 60°, 120°$; $y = 60°, 120°$ (бо $tg x = tg y$)

[Другі варіанти не годяться, бо сума кутів Δ-ка $= 180°$]

Отже кути тр-ка: $x = 60°$, $y = 60°$, $z = 60°$

$$U''_{xx} = -\sin x \sin y \sin(x+y) + \cos x \sin y \cos(x+y) + \cos x \sin y \cos(x+y) - \sin x \sin y \sin(x+y) =$$
$$= 2\cos x \sin y \cos(x+y) - 2\sin x \sin y \sin(x+y)$$

$$A = 2\cos 60° \sin 60° \cos 120° - 2\sin 60° \sin 60° \sin 120° = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} =$$
$$= -\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4} = -\sqrt{3}$$

$$U''_{xy} = \cos x \cos y \sin(x+y) + \cos x \sin x \cos(x+y) + \sin x \cos y \cos(x+y) - \sin x \sin y \sin(x+y)$$

$$B = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{8} = -\frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$U''_{yy} = -\sin x \sin y \sin(x+y) + \sin x \cos y \cos(x+y) + \sin x \cos y \cos(x+y) -$$
$$- \sin x \sin y \sin(x+y) = 2\sin x \cos y \cos(x+y) - \sin x \sin y \sin(x+y)$$

$$C = 2\left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] = -2\left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8}\right) = -\sqrt{3}$$

Отже $AC - B^2 = 3 - \frac{3}{4} > 0$. Але $A < 0$ тому маємо максимум

<u>Із всіх трикутників введених у дане коло найбільше поле має правильний</u>

<u>Приклад 4</u> В якому з Δ-ів, введених у дане коло обвід буде найбільший?

Нехай тр-ка:
$$a = 2r \sin x$$
$$b = 2r \sin y$$
$$c = 2r \sin(x+y)$$
$$S = a + b + c = 2r(\sin x + \sin y + \sin(x+y))$$

Очевидно треба знайти максимум виразу в дужках, а саме:

$$u = \sin x + \sin y + \sin(x+y)$$

$u'_x = \cos x + \cos(x+y)$ $\qquad \cos x + \cos(x+y) = 0$

$u'_y = \cos y + \cos(x+y)$ $\qquad \cos y + \cos(x+y) = 0$

$\cos\alpha = -\cos(\alpha+\gamma)$ $\quad \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} = 1 \quad$ $\cos\alpha = \cos\gamma$ (1)

$\cos\gamma = -\cos(\alpha+\gamma)$ $\quad$ $\cos\alpha = -\cos(\alpha+\gamma)$ а тому:

$\cos\alpha = \sin\alpha\sin\gamma - \cos\alpha\cos\gamma$; $\cos\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha}\sqrt{1-\cos^2\gamma} - \cos\alpha\cos\gamma$ а як підставі (1):

$\cos\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha}\sqrt{1-\cos^2\alpha} - \cos^2\alpha$; $\cos\alpha = 1 - \cos^2\alpha - \cos^2\alpha$

$2\cos^2\alpha + \cos\alpha - 1 = 0$; $\cos^2\alpha + \frac{1}{2}\cos\alpha - \frac{1}{2} = 0$; $\cos\alpha = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{2}} =$

$= -\frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{8}{16}} = -\frac{1}{4} \pm \frac{3}{4}$; $\cos\alpha = \frac{1}{2}$; $\cos\alpha = -1$ (для Δ-ка не годиться). Отже $\alpha = 60°$; $\gamma = 60°$; $\beta = 60°$

$U''_{xx} = -\sin x - \sin(x+y)$ $\quad A = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$

$U''_{xy} = -\sin(x+y)$ $\quad B = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$C = U''_{yy} = -\sqrt{3}$ $\quad AC - B^2 = 3 - \frac{3}{4} > 0 \quad A < 0$

З припущених, введених у коло має найбільший обвід правильний.

Приклад 5. Який Δ-к, що має даний обвід $2p$ буде мати найбільше поле?

Нехай: $a = x$; $b = y$; $c = 2p - x - y$

$$S_\Delta = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-2p+x+y)} = \sqrt{p(p-x)(p-y)(x+y-p)}$$

Очевидно, що поле буде мати максимум, коли найбільшу вартість матиме функція

$$U = (p-x)(p-y)(x+y-p)$$

Беремо окремі похідні функції U через x і через y, маємо:

$$U'_x = -(p-y)(x+y-p) + (p-x)(p-y)$$

$$U'_y = -(p-x)(x+y-p) + (p-x)(p-y)$$

Складаємо систему:

$$(p-x)(p-y) - (p-y)(x+y-p) = 0$$

$$(p-x)(p-y) - (p-x)(x+y-p) = 0$$

перенесши другий член в другу частину й поділивши наші рівняння одно на друге, одержимо:

$$1 = \frac{p-y}{p-x}; \quad p-x = p-y; \quad x = y$$

Далі:

$(p-y)[p-x-x-y+p]=0$; $p-y=0$; $y_1=p$ } не годяться.
$p-x=0$; $x_1=p$ }

$-2x-y+2p=0$ $\quad 2x+y=2p$

$$\begin{array}{r} 2y+x=2p \\ \hline 2x+y=2p \\ -\quad 4y+2x=4p \\ \hline 3y=2p \end{array}$$

$b=y=\frac{2p}{3}$; $\quad a=x=\frac{2p}{3}$; $\quad c=\frac{2p}{3}$

$W''_{xx}=-(p-y)-(p-y)=-2(p-y)$; $\quad A=-2\cdot\frac{1}{3}p=-\frac{2}{3}p$

$W''_{xy}=-(p-y)+(x+y-p)-(p-y)=-p+x+x+y-p-p+y=$
$=2x+2y-3p=-\frac{p}{3}$

$W''_{yy}=-2(p-x)=-\frac{2}{3}p$. Отже $AC-B^2=\frac{4}{9}p^2-\frac{p^2}{9}=\frac{p^2}{3}>0$

$A=-\frac{2}{3}p<0$ тому маємо справу з максимумом.
Очевидно, що <u>при даному обводі найбільше поле має правильний Δ.</u>

<u>Приклад 6</u>. З кулі вирізати прямокутний брус найбільшого об'єму.

Косина цього бруса буде поперечником, а тому:

$$(2r)^2=x^2+y^2+z^2$$

$$4r^2=x^2+y^2+z^2\ ;\quad z=\sqrt{4r^2-x^2-y^2}$$

$$V_{бруса}=xyz=xy\sqrt{4r^2-x^2-y^2}$$

Отже маємо функцію:

$$u=xy\sqrt{4r^2-x^2-y^2}$$

$$u'_x=y\sqrt{4r^2-x^2-y^2}-\frac{x^2y}{\sqrt{4r^2-x^2-y^2}}$$

$$u'_y=x\sqrt{4r^2-x^2-y^2}-\frac{xy^2}{\sqrt{4r^2-x^2-y^2}}$$

$$y\sqrt{4r^2-x^2-y^2} = \frac{x^2y}{\sqrt{4r^2-x^2-y^2}}\ ;\quad x\sqrt{4r^2-x^2-y^2} = \frac{xy^2}{\sqrt{4r^2-x^2-y^2}}$$

$\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$; $x^2 = y^2$; $x = y$ (бере відємний рубіж немає)

$$y(4r^2-x^2-y^2) = x^2y \qquad (y \neq 0 - \text{можна})$$

$$\begin{array}{l|l} 4r^2-x^2-y^2 = x^2 & 4r^2-y^2 = 2x^2 \\ 4r^2-x^2-y^2 = y^2 & 4r^2-x^2 = 2y^2 \end{array}\ ;\quad \begin{array}{l} y^2 = 4r^2-2x^2 \\ 4r^2-x^2 = 8r^2-4x^2 \end{array}$$

$3x^2 = 4r^2$; $x = \frac{2r}{\sqrt{3}}$; $y^2 = 4r^2 - 2\cdot\frac{4r^2}{3}$; $y^2 = 4r^2\left(1-\frac{2}{3}\right) = \frac{4r^2}{3}$

$y = \frac{2r}{\sqrt{3}}$; $\frac{4r^2}{3} + \frac{4r^2}{3} + z^2 = 4r^2$; $z^2 = \frac{4}{3}r^2$; $z = \frac{2r}{\sqrt{3}}$

Отже $x = y = z$; куб.

$$W''_{xx} = -\frac{yx}{\sqrt{4r^2-x^2-y^2}} - \frac{2xy(4r^2-x^2-y^2)+x^2y}{(4r^2-x^2-y^2)\sqrt{4r^2-x^2-y^2}} =$$

$$= -\frac{4r^2yx - 2x^3 - y^3x + 8r^2xy - 2x^3y - 2xy^3 + x^3y}{4r^2-x^2-y^2\sqrt{4r^2-x^2-y^2}} = -\frac{12r^2xy - 2x^3y - 3xy^3}{4r^2-x^2-y^2\sqrt{4r^2-x^2-y^2}}$$

$$A = -\frac{12r^2\cdot\frac{4}{3}r^2 - 2\cdot\frac{16r^4}{9} - 3\frac{16r^4}{9}}{\left(4r^2-2\cdot\frac{4r^2}{3}\right)\sqrt{4r^2-2\cdot\frac{4r^2}{3}}} = -\frac{16r^4 - \frac{32r^4}{3} - \frac{48r^4}{9}}{\frac{4}{3}r^2\sqrt{\frac{4}{3}r^2}} = -\frac{64r}{24\sqrt{\frac{1}{3}}} = -\frac{8r}{3\sqrt{\frac{1}{3}}} < 0$$

максимум.

§ 22. Поширюючи правило знаходження максимуму й мінімуму на функції від багатьох незалежних, напр.

$$u = f(x, y, z, u, t \ldots)$$

ми в той спосіб як і для двох незалежних (приймаючи всі прирощення $k, l, m, n, p \ldots$ за нулі, а одно, напр. $h \neq 0$) переконалися, що конечною умовою того щоб $f(x, y, z \ldots)$ мала максимум або мінімум є рівність з нулеві $\frac{\partial f}{\partial x}$; $\frac{\partial f}{\partial y}$; $\frac{\partial f}{\partial z} \ldots$ що зазначено висловиться в умові рівности (при всіх $x, y, z \ldots$ незалежних між собою)

з нулем першого цілого порядку функції:

$$du = 0$$

Загалом розпізнати, чи буде при цій умові максимум або мінімум в загальному випадку трудно й приходиться пробувати в кожному окремому випадкові зокрема.

Але у випадку, коли при $du = 0$, цілий другий порядок функції:

$$d^2u$$

зачовує свій знак, визначення максимума й мінімум'а легке. А саме:

За взором Тейлора маємо (досить 2^x членів)

$$\Delta = f(\alpha+h, \beta+k, \gamma+l \dots) - f(\alpha, \beta, \gamma \dots) = du + \frac{d^2u}{2!} + \dots$$

Отже при двох членах:

$$\Delta = du + \frac{d^2u_0}{2!}$$

де u_0 виразі вставити $y'(x+\theta h)$ і т.д. $0<\theta<1$, але $du = 0$, то

$$\Delta = \frac{d^2u_0}{2!}$$

Отже, коли d^2u_0 при довільних $h, k, l \dots$ зачовує для всіх вартостей змінних знак, то

при $d^2u_0 < 0$ – є максимум

а при $d^2u_0 > 0$ – є мінімум

У випадку, коли б d^2u зі зміною вартостей $h, k, l \dots$ змінювало б знак, то ні максимума, ні мінімум'а нема.

До цього часу ми відшукували максимум і мінімум, маючи справу лише з функція-

ли від незалежних змінних, яких не підпорядковували ніякими умовами. Тому всі розглянені мах. і мін. мають назву безумовних

§ 23. Умовні максимум і мінімум.

Тепер розглянемо максимум і мінімум функцій від змінних, що зв'язані між собою певними умовами. Такі максимум і мінімум, що мають виповнюватися при певних обмеженнях, створених умовами, накладеними на змінні функції, звуться умовними максимумами й мінімумами функції.

Хай дано нам функцію:

$f(x_1, x_2, x_3 \dots)$ від n змінних і треба знайти максимум і мінімум цієї функції, коли ці змінні зв'язано умовами (такими рівняннями)

$$\left.\begin{aligned} &\varphi_1(x_1, x_2, x_3 \dots x_n) = 0 \\ &\varphi_2(x_1, x_2, x_3 \dots x_n) = 0 \\ &\vdots\quad\vdots\quad\vdots\quad\vdots\quad\vdots \\ &\varphi_k(x_1, x_2, x_3 \dots x_n) = 0 \end{aligned}\right\} (\alpha)$$

де $k < n$.

Очевидно, що розв'язуючи ці k рівнянь, ми виразимо k з цих n змінних через решту $n-k$ змінних. Коли б ми знайдені вартості вставили б у дану функцію, то одержали б нову функцію від $n-k$ незалежних змінних і задача наша обернулася б у задачу відшукання безумов-

них максимума й минимума, що ми вже
вміємо.

В де-яких випадках, цей спосіб розв'язання задачі можливий і легко виконується, але в загальному випадку він є надзвичайно складним, а тому Лагранж дав інший значно простіший (а іноді єдиний до виконання) спосіб.

Візьмімо цілий похід даної функції:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3} dx_3 + \dots \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \qquad (\beta)$$

Ми вже бачили, що ті вартости змінних, що при них може бути максимум або мінімум функції мусять при всіх вартостях походів змінних (себто тотожньо) обертати в нуля цілий похід функції.

Отже, коли б ми після розв'язання рівнань і вставивши вартостей розв'язків у $f(x_1, x_2, x_3 \dots x_n)$ мали б що функцію від $(n-k)$ незалежних, то для існування максимума й минимума конечного була рівність:

$$df = 0$$

при всіх вартостях цих незалежних.

Далі беручи походи условних рівнань (α), маємо:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} dx_2 + \dots \dots \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} dx_n = 0 \\
&\frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} dx_2 + \dots \dots \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} dx_n = 0 \\
&\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\
&\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2} dx_2 + \dots \dots \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_n} dx_n = 0
\end{aligned}\right\} \qquad (\gamma)$$

Йдучи за Лагранжем, будемо вилучати з

рівняння (β), похідні заданих к змінних, що ми вважаємо їх функціями решти, в такий спосіб: Помножимо всі рівняння (γ) на якісь довільні числа $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_k$ і додамо їх до рівняння (β), тоді матимемо:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2\frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \dots \lambda_k\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1}\right)dx_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} + \right.$$

$$\left. + \lambda_2\frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} + \dots \lambda_k\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2}\right)dx_2 + \dots\dots\dots\dots\dots +$$

$$+ \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \lambda_2\frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} + \dots \lambda_k\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_n}\right)dx_n .$$

(бо ми до df додали вартости рівні з нулем.)
Тепер припустімо, що перші змінні $x_1, x_2 \dots x_k$ і ті, що ми вважаємо залежними від решти, [згідно на рівняння (d)]. Тому їх похідні $dx_1, dx_2 \dots dx_n$ є змінні величини.

Отже добираємо вартости $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_k$ так, щоб співчинники при $dx_1, dx_2 \dots dx_k$ були рівні з нулем, тоді лишиться рівність.

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{k+1}} + \lambda_2\frac{\partial \varphi_2}{\partial x_{k+1}} + \dots \lambda_k\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_{k+1}}\right)dx_{k+1} +$$

$$+ \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+2}} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{k+2}} + \lambda_2\frac{\partial \varphi_2}{\partial x_{k+2}} + \dots \lambda_k\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_{k+2}}\right)dx_{k+2} + \dots$$

$$\dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \lambda_2\frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} + \dots \lambda_k\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_n}\right)dx_n$$

Це є похід функції від незалежних змінних, а ми знаємо, що для існування максимума й мінімума конечним є рівність його, а себто й окремих співчинників, з нулем. Маємо тепер ми рівнань (перші к співчинників походів

рівні з нулем через добір вартостей $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_k$, а решта на підставі останніх міркувань);
отже:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \dots \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1} = 0 \\
&\frac{\partial f}{\partial x_2} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} + \dots \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2} = 0 \\
&\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\
&\frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} + \dots \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_n} = 0
\end{aligned}\right\} \quad (\delta)$$

Таким чином маємо n одержаних рівнянь і k рівнань даних - разом $n+k$ рівнань; а змінних:

n змінних: $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$

і k змінних: $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \dots \lambda_k$

разом $n+k$ змінних. Очевидно, що ці рівняння дадуть нам змогу знайти ві вартості $x_1, x_2 \dots x_n$ при яких можуть бути або max., або min. Лишається лише дослідити, що саме?

Означимо $f(x_1, x_2 \dots x_n)$ через u і складемо нову функцію:

$$V = u + \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 + \dots \lambda_k \varphi_k$$

(де $\varphi_1, \varphi_2 \dots \varphi_k$ - є дані нам умовними рівняннями) Візьмімо окремі похідні цієї функції й маємо:

$$V'_{x_1} = \frac{\partial u}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \dots \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1}$$

$$V_{x_2} = \frac{\partial u}{\partial x_2} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} + \dots \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2}$$

$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$

$$V_{x_n} = \frac{\partial u}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} + \dots \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_n}$$

Ми бачимо, що прирівнюючи до нуля всі ці окремі похідні, ми одержимо рівняння (δ).

Тому спосіб Лагранжа зводиться до наступного:

Коли нам дано якусь функцію від n змінних і k рівнянь, що зв'язують ці змінні, то:

1) Множимо ліві частини знайдених нами рівнянь на довільні числа й додаємо їх до даної функції.

2) Беремо окремі похідні від нової, одержаної нами додаткової функції, й дорівнюємо їх до нуля.

3) З одержаних n рівнянь і даних k рівнянь складаємо систему, з якої визначаємо потрібні нам змінні, що можуть дати максимум або мінімум.

Дослідження, чи справді одержимо max. або min. - дуже й дуже складне в загальному випадку, а тому його опустимо. В окремих випадках будемо шукати найпростіших способів перекопатися в правдивості питання.

Приклад. Які з трикутників даного обводу мають найбільше поле?

Хай півобводу p, означимо боки через x, y, z, тоді як відомо:

$$S_\Delta = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}$$

але як ми бачимо існує умова:

$$x + y + z = 2p.$$

Очевидно, щоб S_Δ було максимум, треба, щоб було максимум:

$$U = (p-x)(p-y)(p-z)$$

Складаємо функцію V:

$$V = (p-x)(p-y)(p-z) + \lambda(x+y+z-2p)$$

mogi:

$$V_x = \lambda - (p-y)(p-z)$$

$$V_y = \lambda - (p-x)(p-z)$$

$$V_z = \lambda - (p-x)(p-y)$$

Отже маємо систему:

$$x + y + z = 2p$$

$$(p-y)(p-z) = \lambda$$

$$(p-x)(p-z) = \lambda$$

$$(p-x)(p-y) = \lambda$$

Перемножимо три останні рівняння:

$$(p-x)^2(p-y)^2(p-z)^2 = \lambda^3$$

$$(p-x)(p-y)(p-z) = \sqrt{\lambda^3} = \lambda\sqrt{\lambda}$$

Ділимо ці рівняння почерзі на останні три:

$$p-x = \sqrt{\lambda} \qquad x-y=0$$

$$p-y = \sqrt{\lambda} \qquad x-z=0$$

$$p-z = \sqrt{\lambda} \qquad y-z=0$$

Отже $x=y=z=\frac{2p}{3}$. Це є правильний трикутник.

Розділ II

Диференціальна геометрія

В цьому розділі ми маємо мету застосувати методи аналізу б-ласних до дослідження властивостей геометричних образів. Ми вже вивчили основні властивості цих образів за допомогою аналітичної геометрії й тепер, грунтуючись на них зможемо перейти до більш складних випадків окремих образів, а також дослідити різні їх комбінації й системи. Очевидно, що розгляду нашому належатимуть лише ті геометричні образи, рівняння яких дають можливість застосування до них диференціального числення, себто ці криві є тягнені в границях нашого дослідження й у більшості дають право вживання теореми Тейлюра (себто мають похідні певні вищих порядків).

Першим нашим завданням буде вивчення плоских кривих. Як побачимо далі, про особливі властивості деякої точки такої кривої ми зможемо судити по характеру дотичної, поведеної через цю точку, а тому головним нашим завданням буде дослідження цих дотичних.

Аналітичне рівняння плоскої кривої

Ми вже знаємо, що функція, що може для всіх значень вартостей незалежного (криві, може бути,

де деякі окремі, що звуться особливими, розгортуються в ряди Тейлора, звуться аналітичною.

Із попередніх міркувань видно, що ми будемо мати діло лише з кривими аналітичними, що визначаються того же імені функціями.

Звернемося до аналітичної геометрії, де ми студіювали рівняння:

1) простої:

$$y = mx + n$$

$$x\cos\varphi + y\cos(\omega - \varphi) = \delta$$

$$Ax + By + C = 0$$

або 2) кривої другого ступіня, загального вигляду:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

і 3) деякі криві вищих ступенів.


Всі ці рівняння в загальному вигляді можемо виобразити так:

1) $f(x, y) = 0$ — (невизначено)

2) $y = f(x)$ — (визначено)

Очевидно, що кожна точка кривої, напр. M визначається певними вартостями значників: $x = x_0$, $y = y_0$. Кожна инша точка N буде визначена вже новими вартостями значників, а саме: $x = x_1$, $y = y_1$. Щоб мати визначення цілої кривої, або певного геометричного осередку окремих її точок, нам треба буде установити

Рис. 1.



функціональну залежність між цими змінними, щоб ця залежність висловлювала ту спільну прикмету (або закон), що їй підлягають всі точки кривої без виключення.

Ця залежність і буде:


$$F(x, y) = 0 \qquad (1),$$

що устанавлює закон взаємозмінності між x і y — значеннями окремих точок кривої. Цей самий закон устанавлюється й рівнянням

$$y = f(x) \qquad (2)$$

де вартости рядної y підпорядковуються змінам вартостей відтинкової x.

В цьому разі крива лінія є геометричним осередком кінців рядних для всіх можливих вартостей відтинкової x.



Фиг. 2.

Очевидно, що рівняння (2) є висловленим рівнянням (1) як вислід визначення з нього вартости рядної y через x.

Крім наданого роду рівнянь, ми в аналітичній геометрії зустрічаємо ще й такі:

$$x = a(\theta - \sin\theta) \; ; \qquad y = a(1 - \cos\theta)$$

(рівняння циклоїди), де θ була загадана нами змінником. В цьому разі устанавлюється закон підпорядкування вартостей обох змінних значників окремих точок кривої якійсь незалежно-змінній третій величині, що має назву параметра або змінника.

Це підпорядкування й є тою причиною, що визначає криву як певний геометричний осередок. Загально виображаємо його так:

$$x = \varphi(t) \; ; \quad y = \psi(t) \quad \ldots (3)$$

Очевидно вилучивши з цих рівнань змінника t, ми перейдемо до одного з рівнань (1) або (2).

§2. Виведемо змінникові рівняння де-яких простіших геометричних образів:

I Проста

Візьмімо осі координат і просту, що переходить через задану точку $A(a,b)$. Означимо кути, що творить проста з осями x і y через α і β, а $\cos\alpha = \lambda$ і $\cos\beta = \mu$. Ми знаємо, що лет відтинку AM на вісь x-ів буде:




Рис. 3

$$AM_x = AK = x - a = t\cos\alpha = \lambda t,$$

а лет цього ж відтинку AM на вісь y-ів буде:

$$AM_y = KM = y - b = t\cos\beta = \mu t$$

Таким чином ми можемо за рівняння простої взяти:

$$x = a + \lambda t$$
$$y = b + \mu t$$

це є змінникові рівняння простої. А виключаючи змінника t ми одержимо:

$$(t=)\ \frac{x-a}{\lambda} = \frac{y-b}{\mu}$$

рівняння прямої, що проходить через дану точку, а саме:

$$\mu(x-a) - \lambda(y-b) = 0$$

або, помноживши на спільника пропорційності κ і беручи $\kappa\mu = A$ і $\kappa\lambda = B$, матимемо відоме рівняння:

$$A(x-a) + B(y-b) = 0$$

II Змінникове рівняння кола.

Візьмімо початок вісей в центрі кола й точку $M(x,y)$ на обводі його. Поведемо луч r в цю точку й який кут, що творить цей луч з віссю x-ів буде θ. Тоді з тр-ка OMK маємо:




Рис. 4

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

Це й є змінникові рівняння кола, бо виключаючи з них змінника θ (підносячи до квадрату й додаваючи), ми матимемо відоме рівняння кола:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

III Змінникове рівняння еліпси.

Очертімо навколо початку вісей два концентричні кола лучів a і b. На більшому колі візьмімо точку K й поведемо луч $OK = a$, тоді $OZ = b$. З точок K і Z спустимо на вісь x-ів прямі




Рис. 5

і через точку L поведемо $LM \parallel$ вісі [illegible] зна-
чимо, що точка M перетина пряма KB і LM
буде наближати до еліпси, що має осі $2a$ і $2b$
(див. будування еліпси). Означимо змінні точ-
ки M через: $x = OB$ і $y = BM = AL$ і обчислимо їх.
З $\triangle OBL$ маємо: $OB = x = a\cos\theta$, а з $\triangle OLA$ маємо $AL = y = b\sin\theta$. Ці дві залежності x і y (змінних до-
вільної точки еліпси) від одного й того самого
змінника θ і є змінниковими рівняннями
еліпси:

$$x = a\cos\theta$$

$$y = b\sin\theta$$

Справді: $\sin\theta = \frac{y}{b}$, $\cos\theta = \frac{x}{a}$. Піднесемо до квадрату
й додамо рівності:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

IV Змінникове рівняння гіперболи.

Із курсу аналітичної геометрії знаємо, що ко-
ли від початку координат відкласти відтинки $OA = a$
і $OB = b$ поставити до осі x-ів
в цих точках прямі, повес-
ти довільний промінь OK
що відтинає його OD до пе-
ретину з першою прямою
(в точці A) буде одного з
відтинкових точок гіперболи, а відтинок дру-
гого прямої BC утворений тим самим променем
буде рядною тієї ж точки, що має відтинкову OD (рис. 6)




Рис. 6

Означимо кут відхилення променя ОА від осі y-ків через θ, тоді $x = OD = \frac{OA}{\operatorname{tg} ODA} = \frac{a}{\operatorname{tg}\theta}$. А з Δ ОВС маємо: $y = BC = OB \operatorname{ctg} OCB = b \operatorname{ctg}\theta$. Таким чином змінникові рівняння гіперболи є:

$$x = \frac{a}{\operatorname{tg}\theta}$$

$$y = b \operatorname{ctg}\theta$$

§3. Дотична до плоскої кривої.

Ми вже зазначили, що для дослідження властивостей окремих точок кривої нам необхідно довідатися про характер дотичної до кривої, через цю точку поведеної. Тому в першу чергу перейдемо до складання загального рівняння дотичної до кривої в поданій її точці.

Зогляду на те, що ми розглядатимемо не певну означену точку кривої (x_0, y_0), а кожну точку в цій кривій, то замість її будемо означати x, y. Щоб відрізняти бігучі змінні рівняння ми їх будемо означати через заставні літери X, Y.

Отже хай в прямокутній системі координат дана крива виражається рівнанням:

$$y = f(x) \quad \ldots\ldots (a)$$

Візьмім на цій кривій точку $M(x, y)$ (рис. 7) і другу близьку до неї точку $M_1(x_1, y_1)$ де $x_1 = x + \Delta x$ і $y_1 = y + \Delta y$. Тоді рівняння простої (в даному разі січної), що перейде через ці точки M і M_1 буде:




Рис. 7.

$$y - y = \frac{y_1 - y}{x_1 - x}(x - x)$$

або:

$$y - y = \frac{\Delta y}{\Delta x}(x - x)$$

Коли наближуватимемо точку M_1 до M до їх злиття, то Δx і Δy прямуватимуть до нуля і в момент злиття M і M_1, себто, коли дана січна стане дотичною до кривої в точці M, ми матимемо:

$$y - y = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}(x - x)$$

або:

$$y - y = y'(x - x) \quad \ldots\ldots (4)$$

або:

$$y - y = f'(x)(x - x)$$

де із розуміння про похідну ми вже знаємо, що $y' = \operatorname{tg}\alpha$ - кутовому коефіцієнту самої дотичної. З рівняння (4) маємо:

$$y - y = \frac{dy}{dx}(x - x)$$

або:

$$\frac{x - x}{dx} = \frac{y - y}{dy} \quad \ldots\ldots (5)$$

Коли б крива визначалася б залежностями рівняннями: $x = \varphi(t)$ і $y = \psi(t)$ то ми мали б

$$dx = \varphi'(t)\,dt \quad \text{і} \quad dy = \psi'(t)\,dt$$

А тому рівняння (5), після вставки знайдених величин dx і dy, та скорочення на dt, мало б вигляд:

$$\frac{x - x}{\varphi'(t)} = \frac{y - y}{\psi'(t)}$$

Нарешті, коли рівняння кривої є в неявній формі:

$$F(x,y)=0$$

то за правилом диференціювання невиявних функцій маємо:

$$y'=-\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

А тому вставивши нові вартості y' в рівняння (4), після зведення до спільного знаменателя, дає:

$$(X-x)\frac{\partial f}{\partial x}+(Y-y)\frac{\partial f}{\partial y}=0\ldots..(7)$$

Лишається ще нам з'ясувати положення сталої дотичної на площі, а це, як нам відомо з аналітичної геометрії, виявляється кутами, що творить ця дотична з осями координат. До обчислення цих кутів і перейдемо:

§4. Кути спаду дотичної до кривої на осі координат.

Ми вже зазначили, що $y'=tg\alpha$, а тому:

$$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{dy}{dx}$$

а звідси:

$$\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{dy^2}{dx^2}$$

Складаючи попередню пропорцію й маємо:

$$\frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{dy^2}{dx^2+dy^2}$$

або:

$$\sin^2\alpha=\frac{dy^2}{dx^2+dy^2}$$

Таким чином:

$$\sin\alpha=\frac{dy}{\pm\sqrt{dx^2+dy^2}}$$

Але $\angle\alpha + \angle\beta = \frac{\pi}{2}$ (див. рис. 8), а тому:

$$\cos\beta = \pm \frac{dy}{\sqrt{dx^2+dy^2}}$$

Аналогічно:

$$\cos\alpha = \pm \frac{dx}{\sqrt{dx^2+dy^2}}$$




Рис. 8

З попередніх курсів ми знаємо, що:

$$ds = \sqrt{dx^2+dy^2}$$

а тому:

$$\lambda = \cos\alpha = \pm \frac{dx}{ds};\ \mu = \cos\beta = \pm \frac{dy}{ds} \quad \ldots\ldots (8)$$

Умовимося брати знак + коли дотична спрямована в бік зростання дуги й навпаки.

Очевидно, що коли рівняння кривої має вигляд:

$$x = \varphi(t)\ ;\quad y = \psi(t),$$

то $dx = \varphi'(t)\,dt$; $dy = \psi'(t)\,dt$ і

$$ds = \pm dt\sqrt{\varphi'(t)^2+\psi'(t)^2},$$

а тому (після скорочення на dt):

$$\lambda = \cos\alpha = \pm \frac{\varphi'(t)}{\frac{ds}{dt}};\ \mu = \cos\beta = \pm \frac{\psi'(t)}{\frac{ds}{dt}}$$

або вживаючи символів: $\frac{dx}{dt} = x'$; $\frac{dy}{dt} = y'$; $\frac{ds}{dt} = s'$

маємо:

$$\lambda = \cos\alpha = \pm \frac{x'}{s'};\ \mu = \cos\beta = \pm \frac{y'}{s'} \quad \ldots\ldots (9)$$

Розглянемо тепер кілька прикладів:

1) Написати рівняння дотичної до параболи $y^2 = 2px$.

Рівняння дотичної є: $y - y_1 = y'(x - x_1)$.

Але $2yy' = 2p$; $yy' = p$; $y' = \frac{p}{y}$ тому:

$$y - y_1 = \frac{p}{y}(x - x_1)$$

або:

$$y^2 - yy' = px - px_1$$

тому:

$$yy' = p(x + x_1)$$

(відоме з аналітичної геометрії рівняння)

2) Написати рівняння дотичної до еліпса:

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{a^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{b^2}$$

$$(x - x_1)\frac{2x}{a^2} + (y - y_1)\frac{2y}{b^2} = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 0; \quad \frac{x_1 x}{a^2} + \frac{yy'}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

$$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1.$$

3) Написати рівняння дотичної до кривої

$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2Ax + D; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2By + E$$

Отже:

$$(x - x_1)(2Ax + D) + (y - y_1)(2By + E) = 0$$

або:

$$2Ax^2 + Dx - 2Axx_1 - Dx_1 + 2By^2 + Ey - 2Byy_1 - Ey_1 = 0$$

або:

$$Ax^2 + \frac{D}{2}x - Axx_1 - \frac{D}{2}x_1 + By^2 + \frac{E}{2}y - Byy_1 - \frac{E}{2}y_1 = 0$$

$$Axx_1 + Byy_1 + \frac{D}{2}x_1 + \frac{E}{2}y_1 = Ax^2 + By^2 + \frac{D}{2}x + \frac{E}{2}y$$

Додамо до обох частин рівняння: $\frac{D}{2}x + \frac{E}{2}y + F$ і після упорядкування маємо:

$$Axx_1 + Byy_1 + \frac{D}{2}(x + x_1) + \frac{E}{2}(y + y_1) - F = 0$$

4) Написати рівняння дотичної до циклоїди.

Рівняння її:

$$x = a(t - \sin t);\quad y = a(1 - \cos t) \quad \ldots\ldots (1)$$

$dx = a(1-\cos t)\,dt = 2a\sin^2\frac{t}{2}\,dt;\quad dy = a\sin t\,dt$

А тому рівняння дотичної до циклоїди матиме вигляд (див. рівн. 4)

$$y - y_1 = \frac{a\sin t\,dt}{2a\sin^2\frac{t}{2}dt}(x - x_1)$$

або:

$$y - y_1 = \operatorname{ctg}\frac{t}{2}(x - x_1)$$


або:

$$y - y_1 = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right)(x - x_1) \quad \ldots\ldots (\beta)$$

Очевидно, що кут спаду дотичної навіть x-ів є $\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right)$.

Візьмімо на циклоїді точку $M(x_1, y_1)$ і твірне коло що переходить через точку M. Поведемо поперечник кола $AB \perp$ до вісі x-ів і отримаємо точку M_1 і B. Маємо ΔOBM, рівнораменний, в якому кути $\angle B$ і $\angle M_1$ є рівні половині зовнішнього Δ-ові кутут t. Отже $\angle MBO = \frac{t}{2}$ а з Δ-ка ABK маємо $\angle\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$. Отже кут спаду простої MB буде $\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ але як свідчить рівняння (β), це є кут спаду дотичної, що проходить через точку M, а тому MB є рештою дотичною самої циклоїди.

Рис. 9



Ці міркування дають спосіб збудування дотичної до циклоїди, а саме: через точку дотику ведемо твірне коло й проста MB, що отримуємо

точку дотику з верхнім кінцем основного поперечника колеса й буде дотичною.

§5. Нормаля (пряловка)

Ми знаємо, що пряловкою зветься пряма до дотичної, поведений через точку дотику. З цього видно, що для кутових зліпників обох прямих мусить існувати умова їх прямовісти, а саме $m_1 = -\frac{1}{m}$ де m_1 є кутовий зліпник нормалі, а m кутовий зліпник дотичної. Ми довели, що кутовий зліпник дотичної $\frac{dy}{dx}$, а тому кутовий зліпник пряловки має вигляд:




Рис. 10

$$-\frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)}$$

Отже I) коли крива визначається рівнянням $y = f(x)$, то рівняння пряловки буде:

$$1)\ Y - y = -\frac{1}{f'(x)}(X - x)$$

або:

$$(X + x) + f'(x)(Y - y) = 0 \ldots\ldots (10)$$

$$2)\ Y - y = -\frac{dx}{dy}(X - x)$$

або:

$$(X - x)\,dx + (Y - y)\,dy = 0 \ldots\ldots (11)$$

II) коли крива визначається рівнянням $F(x, y) = 0$ то

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

а тому:

$$y - y = + \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial x}} (x - x)$$

або:

$$\frac{X - x}{\frac{\partial F}{\partial x}} = \frac{y - y}{\frac{\partial F}{\partial y}} \quad \ldots\ldots (12)$$

і III коли крива визначається параметричними рівняннями:

$$x = \varphi(t)$$

$$y = \psi(t)$$

то: $dx = \varphi'(t)\,dt$; $dy = \psi'(t)\,dt$, а через те рівняння (11) після скорочення на dt дає:

$$(X - x)\varphi'(t) + (Y - y)\psi'(t) = 0 \quad \ldots\ldots (13)$$

§6. Кути прямової з осями.

Означимо кути спаду дотичної АМ на вісь x-ів через α, а на вісь y-кіл - через β. Кути ж спаду прямової на тупі вісь x-ів через τ, а на вісь y-ів через ν. Тоді з Δ АМВ маємо (рис 11):




Рис. 11.

$$\tau = \beta$$

(як прямово-рачені кути)

а кут $\nu = \frac{\pi}{2} + \tau = \pi - \alpha$ (з Δ АМВ)

А тому:

$$\cos\tau = \cos\beta$$

а $\cos\nu = -\cos\alpha$; але $\cos\alpha = \pm\frac{dx}{ds}$; $\cos\beta = \pm\frac{dy}{ds}$, тому:

$$\lambda_n = \cos\tau = \pm\frac{dy}{ds}; \quad \mu_n = \cos\nu = \mp\frac{dx}{ds}$$

В даному разі знак $\pm$ взято щодо напрямку прямової, так: + беруть тоді, коли напрям прямової одержується поворотом додатнього напрямку дотичної на 90° проти стрілки годинника.

Коли ж крива визначається рівнянням:

$$F(x,y)=0$$

то з рівності:

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial x}}\ (\text{див. рівн. 12})$$

як вислід попередніх перетворень маємо:

$$\lambda_n=\cos\alpha=\pm\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2}}=\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\Delta F}=\frac{1}{\Delta F}\cdot\frac{\partial F}{\partial x}$$

і аналогічно:

$$\mu_n=\cos\nu=\pm\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2}}=\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\Delta F}=\frac{1}{\Delta F}\cdot\frac{\partial F}{\partial y}$$

де вираз:

$$\Delta F=\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2}\quad\ldots\ldots(13)$$

має назву <u>диференціального знімника першого порядку.</u>

Як приклад написання рівняння нормалі до циклоїди.

Рівняння самої кривої буде:

$$x=a(t-\sin t)\qquad y=a(1-\cos t)$$

а тому:

$$dx=a(1-\cos t)\,dt\ ;\qquad dy=a\sin t\,dt$$

Маючи тепер, вставляючи ці рівності в рівняння (11) і скорочуючи члени на a і dt, маємо:

$$(X-x)(1-\cos t)+(Y-y)\sin t=0$$

t є центровий кут твор-
ного кола ДОЛ, що відпові-
дає даній точці дотику.
Вставляючи в наше рівнян-




Рис. 12.

на вартості x і y матимемо:

$$[x-a(t-\sin t)](1-\cos t)+[y-a(1-\cos t)]\sin t=0,$$ або:

$$(x-at)(1-\cos t)+a\sin t(1-\cos t)+y\sin t-a\sin t(1-\cos t)=0,$$

або:

$$(x-at)\sin\frac{t}{2}+y\cos\frac{t}{2}=0.$$

Щоб збудувати прямову до циклоїди, ми будемо шукати точку перехрещення її з віссю x-ів і для цього вважатимемо в останньому рівнянні $y=0$; тоді:

$$(x-at)\sin\frac{t}{2}=0, \text{ або } x=at$$


Але, з властивости циклоїди: $OA=\smile AM=at$, а тому прямова має проходити через точку A дотику творного кола до осі x-ів. Отже спосіб будувати прямової до циклоїди ясний: Для цього досить сполучити просту точку дотику з нижнім кінцем головного поперечника творного кола.

Це твердження цілком оправдується геометрично, бо коли, як доведено, дотична до циклоїди є проста (тятива), що проходить через точку дотику й верхній кінець головного поперечника творного кола циклоїди, то прямова мусить проходити через нижній кінець того ж поперечника, бо кут BMA (рис 12) є прямий і обводовий для кола (бо рахуємо MB є тятивою кола) а тому він спирається на поперечника, що й підтверджує наші доводи.

§7. Обчислення величин дотичностей кривої.

Ми знаємо, що відтинки KP і KN (рис 13) звуть-

ся відповідно піддотичного й підпрямового. Їх напрям вважається від основи ординати до перехрестя дотичної, або прямової, з віссю x-ів. Коли напрям як піддотичної, як підпрямової однаковий з напрямом осі x-ів, то ми беремо їх вартості за додатні й навпаки.



Розглянемо ΔPMK (рис.а). З нього маємо:

$$-S_t = PK = y\operatorname{ctg}\alpha$$

(тут знак — бо напрям піддотичної протилежний напряму осі x-ів). Звідси:

$$S_t = -\frac{y}{\operatorname{tg}\alpha} = -\frac{y}{y'}, \text{ або } S_t = -\frac{y\,dx}{dy} \quad \ldots\ldots (14)$$

[Також з ΔMNP (рис.б) маємо: $S_t = y\operatorname{ctg}(180-\alpha) = -y\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{y}{y'} = -\frac{y\,dx}{dy}$].

Звідси, за теоремою Піфагора, маємо:

$$t^2 = y^2 + S_t^2 = y^2 + \frac{y^2dx^2}{dy^2} = \frac{y^2}{dy^2}(dx^2 + dy^2)$$

або:

$$t = \frac{y}{dy}\sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{y\,ds}{dy} \quad \ldots\ldots (15)$$

Далі з Δ-ка MKN (рис. а) маємо:

$$S_n = y\operatorname{tg}\alpha = yy' \quad \ldots\ldots (16)$$

або:

$$S_n = \frac{y\,dy}{dx} \quad \ldots\ldots (16^a)$$

[а з ΔMKN (рис. б) маємо: $-S_n = NK = y\operatorname{tg}(180-\alpha) = -y\operatorname{tg}\alpha$, або $S_n = yy'$].

і нарешті, за теоремою Піфагора, одержимо:

$$n^2 = S_n^2 + y^2 = y^2 y'^2 + y^2 = y^2\left(\frac{dy^2}{dx^2} + 1\right); \quad n^2 = \frac{y^2}{dx^2}(dx^2 + dy^2)$$

$$n = \frac{y\,ds}{dx} \quad \ldots\ldots (17)$$

Приклади.

I. Обчислити величину субнормалей еліпса:

$$x = a\cos\theta$$

$$y = b\sin\theta$$

Маємо:

$$dx = a\sin\theta\,d\theta; \quad dy = -b\cos\theta\,d\theta$$

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = d\theta\sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}$$

Маємо 1). $$t = \frac{y\,ds}{dy} = \frac{b\sin\theta\,d\theta\sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}}{b\cos\theta\,d\theta} = \operatorname{tg}\theta\sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}$$

[Виключаємо змінний θ:

$$\sin\theta = \frac{y}{b}; \quad \cos\theta = \frac{x}{a}; \quad \operatorname{tg}\theta = \frac{ay}{bx}$$

$$t = \frac{ay}{bx}\sqrt{a^2\frac{y^2}{b^2} + b^2\frac{x^2}{a^2}} = \frac{y}{b^2x}\sqrt{a^4y^2 + b^4x^2}$$

(де x, y змінні точки дотику). Це є відомий з аналітичної геометрії взір.].

2) $$S_t = -\frac{y\,dt}{dy} = \frac{b\sin\theta\cdot a\sin\theta\,d\theta}{b\cos\theta\,d\theta} = \frac{a\sin^2\theta}{\cos\theta}$$ [Виключимо θ:

$$S_t = \frac{a\sin^2\theta}{\cos\theta} = \frac{a(1-\cos^2\theta)}{\cos\theta} = \frac{a\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)}{\frac{x}{a}} = \frac{a^2-x^2}{x}\,]$$

Примітка. Ми бачимо, що величина піддотичної не залежить від величини малої осі еліпса, а тому можна твердити що: коли на спільній великій осі збудувати декілька еліпсів і через яку-небудь точку цієї осі провести




Рис 14.

прямову до неї тятиву, то дотичні поведені до всіх цих еліпс через перехрестя їх з даною тятивою збігаються в одній точці, що лежить на продовженню головної осі.

Коли ця тятиву наближати до малої осі, то точка збігу дотичних простує на безмежність і в лінійному положенню (коли тятива простує до малої осі) всі ці дотичні є рівнобіжні. Навпаки, коли тятива віддаляється від малої осі, тоді точка збігу дотичних наближається до еліпс і в лінійному положенню, коли ця тятива переходить через вершок еліпс дотичного їй, то й точка збігу дотичних зливається зі спільним вершком еліпс, а всі дотичні зливаються з цією тятивою творять одну спільну дотичну до всіх еліпс.

Очевидно, що в кожні еліпс збудовані на даній великій осі буде й приналежне коло цих еліпс і дотична поведена до цього кола через перехрестя його з даною тятивою також перейде через ту ж точку збігу дотичних.

Для власності дає змогу нам збудувати дотичну до еліпси в даній точці її обводу. Припустім, що нам дається еліпса AB (рис. 15) і точка на ній M через яку треба повести дотичну до еліпси. Будуємо приналежне коло й з точки M спускаємо пряму MN на головну вісь




Рис. 15.

еліпса. Продовжуємо цей промінь до перетину з еліпсом в точці K. Ми тільки-що довели, що дотичні проведені до кола в точці K і до еліпса в точці M будуть збігатися в одній точці L, а тому будемо в точці K дотичну до кола і точку L перехрестя її з продовженням головної вісі еліпса будувати за допомогою KL. Це й буде потрібна дотична

3) $n = \frac{y ds}{dx} = \frac{b \sin\theta \, b\sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}}{-a\sin\theta \, d\theta} = -\frac{b}{a}\sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}$

Знак „–" тепер є зрозумілий, що за додатного прямого кута відкладаємо **зовнішню**, тоді він в даному разі будемо мати завжди внутрішню нормаль. Тому за нормаль візьмемо лише абсолютну величину:

$$n = \frac{b}{a}\sqrt{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}$$

[після перетворення до рівняння виду $f(x,y)=0$ матимемо:

$$n = \frac{1}{a^2}\sqrt{b^4x^2 + a^4y^2}$$

що є найкращим для нас взором.]

4) $S_n = \frac{y dy}{dx} = \frac{b\sin\theta \cdot b\cos\theta \, d\theta}{-a\sin\theta \, d\theta} = -\frac{b^2}{a}\cos\theta$

Тут знак „–" цілком зрозумілий, бо коли підготовка є додатного, то підрядкова лінія буде від'ємною (по напрямку) тому для обчислення її величини скористуємося абсолютною вартістю:

$$S_n = \frac{b^2}{a^2}\cos\theta$$

[перетворивши: $\cos\theta = \frac{x}{a}$; тому $S_n = \frac{b^2x}{a^2}$].

II приклад. Знайти величину дотичної до параболи: $y^2 = 2px$.

Звідси: $2yy' = 2p$; $y' = \frac{p}{y}$. тому:

$$t = \frac{y\,ds}{dy} = y\frac{\sqrt{dx^2+dy^2}}{dy} = y\sqrt{\left(\frac{dx}{dy}\right)^2+1} = y\sqrt{\frac{1}{y'^2}+1} = \frac{y}{y'}\sqrt{1+y'^2} =$$

$$= \frac{y^2}{p}\sqrt{1+\frac{p^2}{y^2}} = \frac{y}{p}\sqrt{y^2+p^2}$$

або:

$$t = \sqrt{\frac{y^4}{p^2}+y^2}$$

оскільки $y^2 = 2px$; $y^4 = 4p^2x^2$; тому:

$$t = \sqrt{4x^2+y^2}$$

2) $S_t = -\frac{y}{y'} = -\frac{y^2}{p}$ або $y^2 = 2px$, тому: $S_t = -2x$

(„–" відповідає напрямку підтичної протилежному до напрямку осі x-ів.)




Рис. 16.

3) $n = \frac{y\,ds}{dx} = y\sqrt{1+y'^2} = y\sqrt{1+\frac{p^2}{y^2}} =$

$$= \sqrt{p^2+y^2}$$

4) $S_n = yy' = y\frac{p}{y} = p$ (const).

Ми ми вже знаємо, що ось симетрії параболи, що для кожної точки її обводу підтягнута рівна з півпараметром p.

Доведемо тепер, що лінія властивістю нагадує лише параболи, а інший цікавий.

Нехай маємо що:

$$yy' = a \quad (\text{const})$$

тоді звідси:

$$y\,dy = a\,dx$$

Інтегруємо:

$$\int y\,dy = a\int dx$$

$$\frac{1}{2}y^2 = ax + c \quad \text{або} \quad y^2 = 2ax + C$$

$$y^2 = 2a\left(x + \frac{c}{a}\right)$$

Це є парабола зі зліпником $2p = 2a$ й вершиною вершина $(-\frac{c}{a}, 0)$. Даючи довільному числу c всяких від нуля до $\pm\infty$, ми одержимо через параболи що мають віссю вісь x-ів. В окремому випадку, коли $c=0$, матимемо параболу з вершиною в початку координат.

III Приклад. Обчислити величини досліджуючи: $x = a(\theta - \sin\theta)$; $y = a(1-\cos\theta)$

Диференціюємо:

$$dx = a(1-\cos\theta)\,d\theta; \quad dy = a\sin\theta\,d\theta$$

Тому: $ds = a\,d\theta\sqrt{(1-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta} = a\,d\theta\sqrt{1+2\cos\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta}$

$$ds = a\,d\theta\sqrt{2(1-\cos\theta)} = 2a\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta$$

Отже:

1) $t = \frac{y\,ds}{dy} = \frac{a(1-\cos\theta)}{\cos\frac{\theta}{2}} = 2a\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}$

2) $\mathcal{J}_t = -\frac{y}{y'} = -a\frac{(1-\cos\theta)^2}{\sin\theta} = -2a\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\sin^2\frac{\theta}{2}$

3) $n = \frac{y\,ds}{dx} = \frac{a(1-\cos\theta)\,2a\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta}{a(1-\cos\theta)\,d\theta} = 2a\sin\frac{\theta}{2}$

4) $\mathcal{J}_n = \frac{y\,dy}{dx} = \frac{a(1-\cos\theta)\cdot a\sin\theta\,d\theta}{a(1-\cos\theta)\,d\theta} = a\sin\theta$

§8. Крива в бінуп овних координатах.

З аналітичної геометрії ми знаємо, що кожна крива в бінуповій координатах визначається певною залежністю між величиною луча-вектора ρ й величиною бінупового кута. Таким типом в загальному випадку рівняння такої кривої буде:

1) у явній формі: $\rho = f(\theta)$

або 2) в неявній формі: $F(\rho, \theta) = 0$

і нарешті 3) в зліпниковій формі: $\rho = \varphi(t)$; $\theta = \psi(t)$

Всі ці рівняння легко перетворити одно в друге.

Візьмемо якусь криву L і зорієнтуємо її, щодо бігунових координат з віссю OX і бігуном O. Хай луч-вектор її буде ρ а бігунковий кут θ. Тоді якраз рівняння її можна буде написати:




Рис. 17.

$$\rho = f(\theta) \quad \ldots\ldots (\alpha)$$

Поведемо через яку будь точку $M(x,y)$ кривої дотичну до неї MK (рис 17.)

Очевидно, що коли нам відомо напрям луча-вектора, що переходить точку M, то легко установити й напрям дотичної MK. Для цього лише треба знайти кут нахилу її дотичної до луча вектора ρ. Цей дотичковий кут означимо через μ й обчислимо його. Повівши через суміжну O просту ON рівнобіжну до дотичної ми одержимо кут MON рівний куту μ. Коли кут спаду дотичної означимо через α, то кут:

$$\mu = \alpha - \theta$$

А звідси:

$$tg\mu = tg(\alpha-\theta) = \frac{tg\alpha - tg\theta}{1 + tg\alpha\, tg\theta} \quad \ldots\ldots (\beta)$$

Лишається лише обчислити $tg\alpha$ через координати ρ і φ. Кут α є кут спаду дотичної (на вісь x-ів) а тому в декартових координатах $tg\alpha = y' = \frac{dy}{dx}$

Тому:

$$tg\varkappa = \frac{\frac{dy}{dx} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta}}{1 + \frac{dy}{dx}\cdot\frac{\sin\theta}{\cos\theta}} = \frac{\cos\theta\, dy - \sin\theta\, dx}{\cos\theta\, dx + \sin\theta\, dy}$$

Але взори переходу від прямокутних до бігусових координат:

$$x = \rho\cos\theta; \quad y = \rho\sin\theta$$

А звідси:

$$dy = \sin\theta\, d\rho + \rho\cos\theta\, d\varphi$$
$$dx = \cos\theta\, d\rho - \rho\sin\theta\, d\varphi$$

Множимо перше рівняння на $\cos\theta$, а друге на $\sin\theta$ й віднімаємо одне від одного. Тоді маємо:

$$\cos\theta\, dy - \sin\theta\, dx = \rho(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\, d\theta = \rho\, d\theta$$

Множимо, навпаки, перше рівняння на $\sin\theta$, а друге на $\cos\theta$ й додавши одне до другого одержимо:

$$\cos\theta\, dx + \sin\theta\, dy = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\, d\rho = d\rho$$

Таким чином:

$$tg\varkappa = \frac{\rho\, d\theta}{d\rho} = \frac{\rho}{\rho'} \quad \ldots\ldots (18)$$

§9. Величини дотичності кривої у бігусових координатах.

Визначення.

I. Вісь метів.

Віссю метів кривої $\rho = f(\theta)$ в даній точці зветься пряма, проведена через бігус паралельно до кута вектора точки, що досліджується.




Рис. 18

II Величини дотичності в бігусових координатах

1) Відтинком дотичної й полярної звуться відтинки згаданих прямих від точки дотику до зустрічі їх з віссю ліній. [Рис. 18 - відтинок дотичної МК; полярної - МР.]

2) Піддотичного й підполярного звуться відтинки осі ліній від бігуна до зустрічі з відповідною прямою [рис. 18: піддотична ОК, а підполярна ОР.]

Обчислення. З Δ-ка МОК маємо:

1) $КМ = T = \frac{\rho}{\cos\varphi} = \rho \sec\varphi = \rho\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\varphi}$

але $\operatorname{tg}\varphi = \frac{\rho}{\rho_1}$, тому відтинок дотичної буде:

$$T = \frac{\rho}{\rho_1}\sqrt{\rho^2+\rho'^2} \quad \ldots\ldots (19)$$

2) З того ж Δ-ка відтинок піддотичної

$$T_t = \rho\operatorname{tg}\varphi = \frac{\rho^2}{\rho_1} \quad \ldots\ldots (20)$$

3) Відтинок полярної: з Δ-ка МОР маємо:

$$N = \frac{\rho}{\sin\varphi} = \rho\csc\varphi = \rho\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2\varphi}$$

або

$$N = \rho\sqrt{1+\frac{\rho^2}{\rho'^2}} = \sqrt{\rho^2+\frac{\rho^4}{\rho'^2}} \quad \ldots\ldots (21)$$

Підполярна: з того ж Δ-а маємо:

4) $$\beta_n = \rho\operatorname{ctg}\varphi = \rho' \quad \ldots\ldots (22)$$

Далі ціні величини ще інші вирази.

Диференціал дуги:

$$ds = \sqrt{dx^2+dy^2}$$

але $x = \rho\cos\theta$; $y = \rho\sin\theta$, де $\rho = f(\theta)$

Тому:

$$dx = \cos\theta\,d\rho - \rho\sin\theta\,d\theta$$
$$dy = \sin\theta\,d\rho + \rho\cos\theta\,d\theta$$

А звідси:

$$dx^2+dy^2 = (\cos^2\theta+\sin^2\theta)\,d\rho^2 + \rho^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\,d\theta$$

або:

$$dx^2 + dy^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2 = d\theta^2(\rho'^2 + \rho^2)$$

Маємо тоді:

$$ds = d\theta\sqrt{\rho^2 + \rho'^2}$$

Вставляючи цю вартість у вори (19) і (21) маємо:

$$T = \frac{\rho}{\rho'}\sqrt{\rho^2 + \rho'^2} = \frac{\rho\, ds}{\rho' d\theta} = \frac{\rho ds}{d\rho} \quad \text{----(23}$$

$$N = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} = \frac{ds}{d\theta} = \frac{ds}{d\theta} \cdot \frac{d\rho}{d\rho} = \frac{\rho' ds}{d\rho} \quad (24)$$

§10. Циссоїда Діокля.

Візьмімо в колі лука і поперечник і через один з його кінців B поведемо дотичну, а другий його кінець A візьмемо за бігун променів, що перетинають коло. Кожний з цих променів зустріне в якійсь точці обвід кола, а далі своїм продовженням і згадану дотичну BK.

Коли відалення від точки зустрічі променя з колом до зустрічі з цією дотичною будемо відкладати на тому ж самому промені від бігуна A, то геометричний осередок кінців цих відтинків є криволо, що зветься Циссоїдою Діокля.

Означимо кут між якимнебудь променем і основним поперечником AB через θ, напр. $\angle KAB = \theta$ й візьмімо за бігунову вісь самий поперечник AB




Рис. 19.

а точку A за бігун. Очевидно що для даного променя AK луч вектор $\rho = AZ$. Але зіцно умові відтинок $AZ = NK$, а тому $\rho = AZ = AK - AN$. Тепер з Δ-ка AKB маємо: $AK = \frac{2r}{\cos\theta}$, а з Δ-ка ANB: $AN = 2r\cos\theta$. Тому:

$$\rho = \frac{2r}{\cos\theta} - 2r\cos\theta = \frac{2r}{\cos\theta}(\overbrace{1-\cos^2\theta}^{\sin^2\theta})$$

або

$$\rho = 2r\sin\theta\operatorname{tg}\theta \quad \ldots\ldots (25)$$

Це й є бігунове рівняння цисоїди.

Щоб перевести це рівняння до прямокутних координат, беремо взори відповідного переходу, а саме:

$$\rho = \sqrt{x^2+y^2}\ ;\quad \operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x}\ ;\quad \sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

і вставляємо їх у рівняння (25). Тоді маємо:

$$\sqrt{x^2+y^2} = \frac{2ry^2}{x\sqrt{x^2+y^2}}$$

або:

$$x^3 = y^2(2r-x) \quad \ldots\ldots (\text{ів})$$

Як спостерігаємо, рівняння цисоїди Діокля є третього ступіня.

Для аналізи рівняння визначаємо y:

$$y = \pm x\sqrt{\frac{x}{2r-x}}$$

і бачимо, що коли x наближається до вартости $\sqrt{2r}$, то y прямує на безмежність, себто крива асимптотично наближається до дотичної, повсденої через кінець B головного поперечника.

Обчислимо тепер кут, що творить дотична до кривої в якій-небудь її точці з відповідним променем вектором.

$$\operatorname{tg}\mu = \frac{\rho}{\rho'} = \frac{2r\sin\theta\operatorname{tg}\theta}{\frac{2r\cos\theta\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{2r\sin\theta}{\cos^2\theta}} = \frac{\operatorname{tg}\theta}{1+\frac{1}{\cos^2\theta}}, \text{ або } \operatorname{tg}\mu = \frac{\sin\theta\cos\theta}{\cos^2\theta+1}$$

Знайдемо ρ': диференціал дуги:

$$\rho' = 2r\sin\theta\left(1+\frac{1}{\cos^2\theta}\right) = 2r\operatorname{tg}\theta\sec\theta\left(1+\cos^2\theta\right)$$

$$ds = d\theta\sqrt{4r^2\sin^2\theta\operatorname{tg}^2\theta + 4r^2\operatorname{tg}^2\theta\sec^2\theta\left(1+\cos^2\theta\right)} =$$

$$= 2r\operatorname{tg}\theta\sec\theta\, d\theta\sqrt{\sin^2\theta\cos^2\theta + (1+\cos^2\theta)^2} = 2r\operatorname{tg}\theta\sec\theta\, d\theta\sqrt{1+3\cos^2\theta}$$

1) Обчислення відрізку дотичної:

$$T = \frac{\rho ds}{d\rho} = \frac{2r\sin\theta\operatorname{tg}\theta\cdot 2r\operatorname{tg}\theta\sec\theta\, d\theta\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{2r\cdot\operatorname{tg}\theta\sec\theta\left(1+\cos^2\theta\right)d\theta} = \frac{2r\sin\theta\operatorname{tg}\theta\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{1+\cos^2\theta}$$

2) Обчислення відрізку нормалі:

$$N = \frac{\rho' ds}{d\rho} = \frac{ds}{d\theta} = \frac{2r^2\operatorname{tg}\theta\sec\theta\, d\theta\sqrt{1+3\cos^2\theta}}{d\theta} = 2r\operatorname{tg}\theta\sec\theta\sqrt{1+3\cos^2\theta}$$

3) Обчислення піддотичної:

$$T_t = \frac{\rho^2}{\rho'} = \frac{4r^2\sin^2\theta\operatorname{tg}^2\theta}{2r\operatorname{tg}\theta\sec\theta\left(1+\cos^2\theta\right)} = 2r\frac{\sin^3\theta}{1+\cos^2\theta}$$

4) Обчислення піднормалі:

$$T_n = \rho' = 2r\operatorname{tg}\theta\sec\theta\left(1+\cos^2\theta\right)$$

§11. Архімедова спіраль.

Рівняння її $\rho = a\theta$

Припустимо, що луч-вектор обертається рівномірно кругу бігуна і в той самий час точка M рівномірно посувається вздовж луча вектора від бігуна (рис. 20).




Рис. 20

Виміряємо кут (фазу) в

круговий одиницю і припускаємо, що одиниці міри кута θ відповідає віддалення a - точки M від бігуна O. Тоді зрозуміло, що відділення ρ є пропорційним куту θ, а тому:

$$\rho = a\theta \quad \ldots\ldots\ldots (27)$$

де a служить коефіцієнтом пропорційності.

Знайдемо величину стичностей:

$$\rho = a\theta; \qquad \rho' = a$$

Отже:
$$ds = d\theta\sqrt{\rho^2+\rho^2} = d\theta\sqrt{a^2\theta^2+a^2} = a\,d\theta\sqrt{1+\theta^2}$$

А тому:
$$T = \frac{a\theta\, a\,d\theta\sqrt{1+\theta^2}}{a\,d\theta} = a\theta\sqrt{1+\theta^2}$$

$$N = \frac{a\cdot a\,d\theta\sqrt{1+\theta^2}}{a\,d\theta} = a\sqrt{1+\theta^2}$$

$$\sigma_t = \frac{\rho^2}{\rho'} = \frac{a^2\theta^2}{a} = a\theta^2; \qquad \sigma_n = \rho' = a$$

Вартість підприємової $\sigma_n = a$ незалежить від бігункового кута θ, а тому для всіх точок архімедової спіралі є величиною сталою. Що властивість можна скористати для будування дотичної в якій бажано точці спіралі. А саме:

Візьмімо на архімедовій спіралі яку будь точку M і поведімо через неї кут вектор OM. Тоді S, прямо ρ, поведений через бігун O буде нормового вісею, а через те $OK = \sigma_n$ є підприємовою, а тому рівна a. Тепер спосіб будування дотичної стає цілком ясним, а саме:




Рис. 21

1) через точку M ведемо пучок векторів і будуємо лінійну вісь L (рис 21). 2) На цій вісі від бігуна O відкладаємо a й знаходимо точку K. Далі 3) сполучаємо точку K з точкою M і це буде променевою, а 4) промінь повернений до KM через точку M буде потрібного нам довжини

§11. Гіперболічна спіраль.

Візьмемо бігунову координатну систему й припустимо, що дана точка по мірі зростання бігунового кута наближається з безмежности до бігуна рівномірно посуваючися вздовж променя вектора. Тоді ясно, що в кожний момент, віддалення точки від бігуна буде зворотно пропорційним величині бігунового кута. Припустимо, що одиниці (круговій) міри бігунового кута відповідає віддалення точки від бігуна рівне a. Тоді:

$$\rho : a = 1 : \theta$$

а звідси рівняння гіперболічної спіралі:

$$\rho\theta = a \quad \ldots\ldots\ldots (28)$$

З аналізи рівняння видно, що коли $\theta = 0$, то $\rho = \infty$; коли θ зростає, то ρ зменшується і наприкінці, коли $\theta = \infty$, то $\rho = 0$. Отже крива творить безліч оборотів навколо бігуна, все більш і більш наближаючися до бігуна, але ніколи досягає його ніг і віддалення від нього точки може




Рис. 22.

стати зрозуміло чому) тому цей бігун звертається асимптотично точкою гіперболічної спіралі (рис. 22).

Ми залишаємо студіюючим для вправи обчислення всіх величин стичності цієї спіралі, а зупинимося лише на обчисленні величини бігунової підготовної. Отже:


$$\delta_t = \frac{\rho^2}{\rho_1} \text{ але } \rho' = \left(\frac{a}{\theta}\right)' = -\frac{a}{\theta^2}$$

тому:

$$\delta_t = \frac{a^2}{\theta^2} : -\frac{a}{\theta^2} = -a$$

Таким чином бігунова підготовна для дотичних у всіх точках гіперболічної спіралі є однакова, а це дає легкий спосіб будування самої дотичної, а саме: сполучаємо точку дотику M з бігуном, через бігун ведемо лінію вісь. Коли на цій вісі відкладемо $OK = |a|$, то проста, що сполучить точку K з даною M буде потрібною дотичною

Рис. 23.



§12. Логарифмічна спіраль

Розглянемо властивості ще третьої спіралі, що має назву логарифмічної й виражається рівнянням:

$$\lg \frac{\rho}{a} = m\theta \text{ або: } \rho = ae^{m\theta} \quad \ldots (24)$$

де a є довільно вибране число.

Досліджимо рівняння:

1) коли $\theta \neq 0$, то $\rho \neq 0$

2) коли $\theta = 0$, то $\rho = a$

3) коли $\theta = +\infty$, той $\rho = +\infty$

4) коли $\theta = -\infty$, то $\rho = 0$




Рис. 24.

Очевидно, що точка O (бігун) знова є асимптотичною. Називаючи на боці обчислення величини дотичностей, ми обчислимо дотиковий кут μ. Ми знаємо вже, що $\operatorname{tg}\theta = \frac{\rho}{\rho'}$, але

$$\rho' = ame^{m\theta}$$

а тому:

$$\operatorname{tg}\mu = \frac{ae^{m\theta}}{ame^{m\theta}} = \frac{1}{m} \quad (const)$$

Таким чином кут нахилу дотичної не залежить від величини бігунового кута, а тому однаковий для всіх точок логарифмічної спіралі. Це є причиною того, що логарифмічну спіраль звуть рівнокутною. Очевидно, що ця властивість також дає дуже простий спосіб будування дотичної в кожній точці спіралі, коли відома вартість $\operatorname{tg}\mu$

§13. Форма кривої (випуклість або вгнутість).

Візьмімо якусь криву AB визначену рівнянням $y = f(x)$ і на ній точку $M(x, y)$. Через цю точку ведемо дотичну L. Візьмімо ще другу точку N дуже близьку




Рис. 25

до M і означимо її значення через ξ і η, причому $\xi = x + \Delta x = x + h$ і $\eta = f(x+h)$

Щоб дослідити форму кривої нам треба буде знайти як вона віддалена від дотичної з обох боків її дотику. Для цього знайдемо вартість NK, віддалення точки N кривої від даної дотичної взагалі від відповідної рядної. З рис. 25 ми бачимо що $NK = PN - PK$, але $NP = y = f(x+h)$ а для визначення PK уявляємо те, що точка K лежить на дотичній, а тому її значення повинні задовольняти рівняння цієї дотичної, а саме, вставляючи ці значення $x_1 = \xi = x+h$ і y_1 в загальне рівняння дотичної ми маємо мати тотожність:

$$y - y_1 = f'(x)(x - x_1)$$

або: $$f(x) - y_1 = f'(x)(x - x - h) = h f'(x)$$

А звідси: $$KP = y_1 = f(x) + h f'(x) -$$

іншим чином: $NK = f(x+h) - [f(x) + h f'(x)]$.

Або розкриваючи $f(x+h)$ в ряд Тейлора, маємо:

$$NK = f(x) + h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{2.3} f'''(x) + \dots - f(x) - h f'(x) =$$

$$= \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{2.3} f'''(x) + \dots \qquad (d)$$

Ми взяли точку N дуже близько до точки M і через те можемо вважати величину h так малою, що за властивістю цілих функцій матимемо право твердити, що знак NK залежить лише від знаку старшого члену, себто від знаку $\frac{h^2}{2} f''(x)$. В цьому члені h є в ква-

тому ступені, а через те знак відтинка NK залежатиме лише від знаку $f''(x)$. Зверніть увагу ще й на те, що при сталому ступені k знак його залежати не впливає на вартість величини NK. Тобто крива з обох боків точки дотику лежить лише по один бік дотичної. Виявилося, що бік кривої обернений до дотичної її *випуклістю*, а протилежний бік *випуклістю* кривої. Тоді можна сказати що коли $f''(x) > 0$, то крива (що лежить в першій або в другій чвертках координатних осей) обернена випуклістю до осі ікс-ів (лежить поза кутом створеним дотичною й віссю ікс-ів), а коли $f''(x) < 0$, то крива обернена до осі ікс-ів випуклістю (лежить на полі згаданого кута) (рис. 26).




Рис. 26

Легко довести, що коли крива лежить в III і IV чвертках координат (від'ємні вартості змінних) то ці твердження трансформуються навпаки (бо тоді y і η є від'ємні і різниця $(\eta - y)$ має вартість протилежну знаком відповідній вартості різниці $(\eta - y)$ в першому випадку)

Щоб об'єднати обидва випадки, зверніть увагу на те, що в першому з них сама функція $y = f(x)$ має додатню вартість, себто має той

же знак, що $f''(x)$ при <u>випуклості кривої</u>, а у другому випадкові $y = f(x)$ – є від'ємною, але також буде мати знак однаковий зі знаком $f''(x)$ при <u>випуклості кривої</u>.

Тому можна загалом твердити, що:

<u>Коли для кривої $y = f(x)$ вартість другої похідної $f''(x)$ має знак однаковий з самою функцією $f(x)$, то крива обернена випуклістю до осі ікців, а коли ці величини функції та її другої похідної різних знаків, то крива обернена до осі ікців випуклістю.</u> Це твердження можна аналітично висловити так.

$$\left.\begin{aligned} &\frac{f''(x)}{f(x)} > 0 \quad \text{– випуклість} \\ &\frac{f''(x)}{f(x)} < 0 \quad \text{– випуклість} \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots (30)$$

Розглянемо ще й той випадок, коли вартість $f''(x)$ обертається в нуля. Очевидно, що тоді (див. вище d):

$$NK = \frac{h^3}{3!} f'''(x) + \frac{h^4}{4!} f^{IV}(x) + \ldots$$

і на підставі попередніх міркувань знак NK залежатиме від вартости:

$$\frac{h^3}{3!} f'''(x)$$

Але в цьому разі зміна знаку h змінює знак NK, а через те крива лежить з обох боків дотичної. Такого роду точка (M) має назву точки <u>перегину кривої</u>. Очевидно, що тоже і $f'''(x)$ обер-




Рис. 27

тангенс в нуля і т.д. Тоді ми досліджуємо криву за допомогою першої по черзі $\neq 0$ похідної. Коли вона парного, то крива лежить по один бік дотичної, коли не парного, то маємо справу з точкою перегину.

Відношення $\frac{f''(x)}{f(x)}$ дає нам розуміння про форму кривої, але при $f'(x)=0$ вздовж (30) не дадуть нам критерія для пізнання форми кривої. Але в цьому разі (перегину) обидві гілки кривої (з обох боків точки M) матимуть ту, чи іншу форму й положення, що до вісі ікс-ів. З метою їх дослідження ми вибираємо на кривій з обох боків точки M допоміжні точки N і N', досить близькі до точки M, але таке щоб для тангенсів їм друга похідна функція не була рівною з нулем. Хай відповідні цих точок N і N' будуть $x+h$ (де h для першої й другої точки різного знаку) тоді вздовж (30) матиме вигляд:

$$\alpha = \frac{f''(x+h)}{f(x+h)}$$

а розкладаючи числителя в ряд Тейлора маємо:

$$\alpha = \frac{f''(x) + h f'''(x) + \frac{h^2}{2!} f^{IV}(x) + \cdots}{f(x+h)}$$

але $f''(x)=0$, а тому обмежуючи ряд лише другим членом (бо h беремо досить малим) маємо:

$$\alpha = \frac{h f'''(x+\theta h)}{f(x+h)}$$

Тут друга похідна $f(x+h)$ буде з огляду на

свою тричисть однакового знаку з $f(x)$, а знак числителя завжди залежить від знаку h, бо містить його в першому степені, в той час як $f'''(x+\theta h)$ в силу своєї тричасти рази не обертається в нуль буде зберігати свій знак. Отже, коли d буде для $\pm h$ змінювати знак з — на + то крива переходить від випуклості до вигнутості й навпаки.

Розглянемо ще випадок, коли дотична рівнобіжна до осі ікісів, як до осі ігреків:

в першому разі $f'(x) = 0$

а в другому — $f'(x) = \infty$

Ми бачимо, що в другому разі маємо розрив тричасти й користуватися взорам Тейлора не можемо. Але тоді вимагаючи зрівняння $y = f(x)$, беремо x матимемо нову функцію $x = \varphi(y)$, для якої вже перша похідна $\varphi'(y) = 0$. Отже в обох випадках можна користатися однаковими ознаки.

Очевидно, що при цих умовах, коли $f''(x) = 0$ (себто $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$), то точка перегнутя має дотичну рівнобіжну до осі x-ів, а коли $f''(y) = 0$ (себто $\frac{d^2x}{dy^2} = 0$) то точка перегнутя має дотичну рівнобіжну до осі y-ків (рис. 28). Загальним ознаком існування точки перегнутя є рівність $f''(x) = 0$ [або $f''(y) = 0$]




Рис. 28

Очевидно, що знаходячи точки M, точки перегнутя,

можна знайти, як розв'язки системи:

$$\left.\begin{array}{l} f''(x) = 0 \\ y = f(x) \end{array}\right\} \ldots\ldots (31)$$

Приклад 1. (можна у Лоссе)
Знайти точку перегину кривої:

$$y = \frac{x^3}{a^2 + x^2}$$

Диференціюючи маємо:

$$y' = \frac{x^2(x^2 + 3a^2)}{(x^2 + a^2)^2} \qquad y'' = \frac{2a^2x(3a^2 - x^2)}{(a^2 + x^2)^3}$$

Очевидно що рівняння $y'' = 0$, при умові, що $y'' \neq 0$ дає нам відповідні потрібних точок перегину. Тому розв'язуючи рівняння $y'' = 0$, або $2a^2x(3a - x^2) = 0$, маємо $x = 0$; $x_{2,3} = \pm a\sqrt{3}$. Коли тепер ці вартості вставимо в рівність:

$$y''' = \frac{6a^2(a^2 - x^2)}{(a^2 + x^2)^3}$$

то матимемо:

$$1)\ y''' = \left[\frac{6a^2(a^2 - x^2)}{(a^2 + x^2)^3}\right]_{x=0} \neq 0 \qquad 2)\ \left[y'''\right]_{x = \pm a\sqrt{3}} \neq 0$$

Отже всі знайдені точки є перегинами. Рядні їх знайдемо вставивши наші вартості x_1, x_2 і x_3 в саме рівняння кривої.
Точок перегину з дотичною, рівнобіжною до осі y-ів немає, бо умова $y' = \infty$ дає $x^2 + a^2 = 0$ $x = \pm ai$. Точка є уявна.

Приклад 2. Які точки перегину має синусоїда $y = \sin x$?
Диференціюючи рівняння $y = \sin x$ і маємо:

$$y' = \cos x\ ;\quad y'' = -\sin x$$

точки перегину одержимо з си-

$$\left.\begin{array}{l} y = -\sin x = 0 \\ y = \sin x \end{array}\right\} \text{або} \quad \begin{array}{l} \sin x = 0 \\ y = 0 \end{array} \quad x = k\pi \Bigg\} \text{ при умові що } y''' \neq 0$$

Тому досліджуємо що третю похідну й маємо:

$$y''' = -\cos x \underset{(x = \pi k)}{=} \mp 1$$

Отже існує безліч точок $(x = k\pi, y = 0)$, що лежать на осі x-ів. Точок же перегину, що мають горизонтальну дотичну до осі y-ів немає, бо $f'(x) = \cos x$ ніколи не може бути рівною 3 см.

Приклад 3. Знайти точку перегину кривої:

$$y^3 = x^2$$

Звідси $y = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$. Диференціюємо й маємо:

$$y' = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}; \quad y'' = -\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}$$

Точок перегину звичайних немає, бо рівняння $(y'') = -\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}} = 0$ дає розв'язки $x = \infty$; а тому й $y = \infty$. Але однаково з цим ми маємо вартість $x = 0$ для якої: $y' = \left[\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}\right]_{x=0} = \infty$. Отже треба дослідити чи не буде перегину при дотичних, рівнобіжних до осі y-ів. Висловлюємо з рівняння x і маємо:

$$x = \sqrt{y^3} = y^{\frac{3}{2}}$$

Звідси: $x' = \frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}$; $x'' = \frac{3}{4}y^{-\frac{1}{2}}$; тому маємо:

$$(x'') = \frac{3}{4}y^{-\frac{1}{2}} = 0; \quad y = \infty$$

Отже й такого роду точок перегину

Приклад 4. Знайти точки перегину;

кривої $x^3 = y$.

Диференціюємо й прирівнюємо до нуля другу похідну, тоді маємо:

$$1)\ y' = 3x^2\ ;\ y'' = 6x$$
$$2)\ 6x = 0;\ x = 0;\ y = 0$$

Досліджуючи третю похідну: $y''' = 6 \neq 0$ ми переконуємося, що точкою перегину є початок координат.

§14. Дослідження точок перегину кола рівняння кривої має інші форми

I) Коли рівняння кривої має участь в параметровій формі:

$$x = \varphi(t)\ ;\ y = \psi(t)$$

то відшукуючи похідні через x і y маємо:

$$dx = \varphi'(t)\,dt\ ;\ dy = \psi'(t)\,dt$$

А звідси:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \left(\text{або } \frac{y'}{x'}\right)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(y')}{dx} = \frac{d(y')}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]' \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} =$$

$$= \frac{\varphi'(t)\,\psi''(t) - \psi'(t)\cdot\varphi''(t)}{\left[\varphi'(t)\right]^3} = \frac{x'y'' - y'x''}{(x')^3}$$

Аналогічно ми можемо обчислити й другу похідну x:

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{y'x'' - y''x'}{(y')^3}$$

Отже для визначення точок перегину маємо рівняння:

$$\left.\begin{array}{l} \text{або: } x'y'' - y'x'' = 0 \\ \text{або: } y'x'' - y''x' = 0 \end{array}\right\} \quad \ldots\ldots (32)$$

Дослідження подібне до попереднього й тому на ньому не зупиняємося.

II). Коли криву дано в формі:

$$F(x, y) = 0$$

Тоді:

$$y' = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} \quad \ldots\ldots (\alpha)$$

Знайдемо другу похідну y'' і для цього диференціюємо рівняння $F(x,y)=0$ і маємо:

1) в першому разі:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + y' \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

2) в другому разі:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + y'' \frac{\partial F}{\partial y} + y' \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} y' + y'^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} =$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + 2y' \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + y'^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + y'' \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

А вставляючи вартість y' з рівності (α) одержимо:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - 2\left(\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}\right)\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + y'' \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

або:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - 2\frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + y''\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^3 = 0 \quad \ldots (\beta)$$

Ми знаємо, що умовою існування точок перегину є рівність $y''=0$, а тому рівняння (β) ма-

таке вигляд:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - 2\frac{\partial F}{\partial x}\cdot\frac{\partial F}{\partial y}\cdot\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 0 \quad \ldots \quad (33)$$

Останнє рівняння (33) легко записати в формі детермінанта, а саме:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \ldots \quad (34)$$

Розв'язання цього рівняння нам дасть значення точок, що можуть бути перегинами і між їх досліджуємо, як і попередньо.

Приклад 1. Знайти точки перегину кривої $y^3 - x^5 = 0$

Відшукуємо потрібні окремі похідні і складаємо рівняння (34)

1) $\frac{\partial F}{\partial x} = -5x^4$; $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -20x^3$; $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 0$

$\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2$; $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 6y$

Отже 2)

$$\Delta = \begin{vmatrix} \pm 20x^3 & 0 & \pm 5x^4 \\ 0 & 6y & 3y^2 \\ -5x^4 & 3y^2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Звідси: $\Delta = 150x^8 y - 180 y^4 x^3 = 0$. Маємо (після скорочення) маємо систему:

$$x^3y^3(5x^5 - 6y^3) = 0$$

$$y^3 - x^5 = 0$$

Звідси $x^5 = y^3$ і маємо $5y^3 - 6y^3 = 0$; $y = 0$; $x = 0$

Це є точка перегину, бо крива переходить через початок координат: по обидва боки його $y'' = \frac{\Delta}{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^3}$ [див. рівн. (3)] змінює знак, бо містить непарну ступінь x.

Приклад II. Знайти точку перегину кривої $y = (x-a)^4$.

Диференціюємо рівняння й маємо:

$$y' = 4(x-a)^3; \quad y'' = 12(x-a)^2, \quad y''' = 24(x-a)$$

Прирівнявши до нуля другу похідну y'', одержимо:

$12(x-a)^2 = 0$; звідси $x = a$; але тоді $y''' = 0$ а $y^{IV} = 24 \neq 0$

Отже першою нерівною з нуля є парна похідна, а через те точки перегину немає.

Вставляючи величину $x = a$ в рівняння кривої матимемо $y = 0$, тому сама функція y і парна перша нерівна нулю четверта похідна y^{IV} одного знаку. Тому в цій точці крива вигнута в бік осі x-ів.

Приклад III. Знайти точку перегину кривої: $x = t^3$; $y = 2t + 1$.

Похідні цих функцій будуть:

$$x' = 3t^2; \quad x'' = 6t; \quad x''' = 6; \quad y' = 4t; \quad y'' = 4; \quad y''' = 0$$

Тому: $\frac{dy}{dx} = \frac{4t}{3t^2} = \frac{4}{3t}$; $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'y'' - y'x''}{(x')^3} = \frac{3t^2 \cdot 4 - 4t \cdot 6t}{27t^6} = -\frac{12t^2}{27t^3}$

Умова існування точок перегину: $x'y'' - y'x'' = 0$ має вигляд: $-12t^2 = 0$, або $t = 0$. Звідси $x = 0$, $y = 1$ (рів. рівняння кривої).

Приклад IV. Дослідити циклоїду: $x = a(\theta - \sin\theta)$; $y = a(1-\cos\theta)$.

Шукаємо y' і y'' і маємо:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_\theta}{x'_\theta} = \frac{a\sin\theta\, d\theta}{a(1-\cos\theta)\,d\theta} = \operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}\right)'_\theta \frac{1}{x'_\theta} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sin^2\frac{\theta}{2}}\cdot\frac{1}{a(1-\cos\theta)} = -\frac{1}{4a\sin^4\frac{\theta}{2}}$$

Очевидно, що $\frac{d^2y}{dx^2}$ є завжди від'ємне, а тому крива звернена до осі x-ів своєю випуклістю (загалом випуклість її завжди звернена в бік від'ємних y-ів).

§15. Дослідження форми кривої в околі точки. Особливі точки.

Нехай рівняння кривої буде $\rho = f(\theta)$. Візьмемо на кривій (рис 29) точку $M(\rho, \theta)$ і відкладемо при точці O з обох боків ρ досить малий кут α, тоді утворяться нові вектори з кутами $\theta+\alpha$ і $\theta-\alpha$, що пустять кривий AB в деяких точках A і B. Сполучимо ці точки хордою AB. Очевидно, що коли крива AB буде повернена випуклістю до точки O, то точка M буде лежати з того ж боку хорди AB що й точка O і найвигіднішим положенням вектора ρ до хорди AB буде:





Рис. 29

1) Коли крива звернена випуклістю до точки O, то $\Delta = \angle AOB < 0$

2) Коли крива обернена випуклістю до точки O, то $\Delta = \angle AOB > 0$ (рис 30)

$OM = \rho = f(\theta)$

Рис. 30



Обчислимо ще варіянту OD з ΔOAB.

OD є симетрисальна Δ-ка, а тому в силу тригонометричного взору

$$\therefore OD = B_{AB} = \frac{2OA \cdot OB \cdot \cos\alpha}{OA + OB}$$

Якщо точки A і B лежать на кривій, а тому значення її задовольняють рівняння кривої. Значить тогож:

1) A будуть $OA_1(\theta+\alpha)$; 2) B будуть OB і $(\theta-\alpha)$. Отже вставляючи їх в рівняння $\rho = f(\theta)$ кривої маємо:

$$OA = f(\theta+\alpha) \; ; \qquad OB = f(\theta-\alpha)$$

Маємо тоже:

$$OD = \frac{2\cos\alpha \, f(\theta+\alpha) f(\theta-\alpha)}{f(\theta+\alpha) + f(\theta-\alpha)} \quad \ldots\ldots (a)$$

Отже:

$$\Delta = f(\theta) - \frac{2\cos\alpha \, f(\theta+\alpha) \cdot f(\theta-\alpha)}{f(\theta+\alpha) + f(\theta-\alpha)} \lesseqgtr 0$$

А звідси:

$$f(\theta)\left[f(\theta+\alpha) + f(\theta-\alpha)\right] - 2\cos\alpha \, f(\theta+\alpha) \cdot f(\theta-\alpha) \lesseqgtr 0 \ldots (б)$$

Це й є ознака випуклості або вгнутості кривої що-до бігуна в бігунових координатах.

Спростимо цей вираз:

1) Ми беремо варіянту α досить малою, дуже близького до 0 (коли α прямує до нуля, а тому для $f(\theta+\alpha)$ і $f(\theta-\alpha)$ можемо застосувати розвинення в ряд Тайлора, а саме:

$$f(\theta+\alpha) = f + \alpha f' + \frac{\alpha^2}{2} f'' + \frac{\alpha^3}{3} f''' + \ldots$$

$$f(\theta-\alpha) = f - \alpha f' + \frac{\alpha^2}{2} f'' - \frac{\alpha^3}{3} f''' + \ldots$$

де символом f означаємо $f(\theta)$

Тоді:

$$\left.\begin{aligned} &1)\ f(\theta+\alpha)+f(\theta-\alpha)=2f+\alpha^2f'' \\ &2)\ f(\theta+\alpha)\cdot f(\theta-\alpha)=f^2+\alpha^2ff''-\alpha^2(f')^2 \end{aligned}\right\}$$

спричинені в вищенаведеній формулі, при даній малості α - нехтуємо.

Вставляючи ці вартості у вираз (δ) маємо:

$$2f^2+\alpha^2ff''-2\cos\alpha\, f^2-2\alpha^2\cos\alpha\, ff''+2\alpha^2\cos\alpha\,(f')^2\lesseqgtr 0$$

або:

$$2f^2(1-\cos\alpha)+2\alpha^2ff''\left(\tfrac{1}{2}-\cos\alpha\right)+2\alpha^2\cos\alpha\,(f')^2\lesseqgtr 0$$

або:

$$f^2+\frac{\alpha^2\left(\frac{1}{2}-\cos\alpha\right)}{1-\cos\alpha}ff''+\frac{\alpha^2\cos\alpha}{1-\cos\alpha}(f')^2\lesseqgtr 0$$

Обчислимо справжні вартості коефіцієнтів виразу при згаданій умові, що α прямує до нуля.

$$1)\ \frac{\alpha^2\left(\frac{1}{2}-\cos\alpha\right)}{1-\cos\alpha}=\frac{\alpha^2\left[(1-\cos\alpha)-\frac{1}{2}\right]}{1-\cos\alpha}=\alpha^2-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1-\cos\alpha}{\alpha^2}}=-1$$

(бо при $\alpha\to 0$, маємо $\alpha=0$; $\lim\limits_{\alpha\to 0}\frac{1-\cos\alpha}{\alpha^2}=\lim\limits_{\alpha\to 0}\frac{2\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\alpha^2}=\lim\limits_{\alpha\to 0}\frac{1}{2}\frac{\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}$)

$$2)\ \frac{\alpha^2\cos\alpha}{1-\cos\alpha}=\frac{\alpha^2\left[1-(1-\cos\alpha)\right]}{1-\cos\alpha}=\frac{\alpha^2}{1-\cos\alpha}-\alpha^2=2\quad\text{(через те саме)}$$

Таким чином, ознаки випуклості або випуклості кривої що-до бінума буде:

$$f^2-ff''+2(f')^2\lesseqgtr 0 \qquad \ldots\ldots(35)$$

або:

$$\rho^2-\rho\rho''+2\rho'^2\lesseqgtr 0$$

Словами: Положення кривої в бінумових координатах визначається так: коли для даної вартості ρ: 1) вираз $\rho^2-\rho\rho''+2\rho'^2<0$ то випуклість кривої для даної точки повернена в бінума (рис. 29) а 2) коли цей же вираз є достатній (>0) то до бінума обернена випуклість кривої (рис. 30) 3) коли цей вираз є рівний з нулем, то дана точка кривої є точкою перегину (рис. 31)

Приклади: I) Візьмімо спіраль Архімеда: $\rho = a\theta$ і дослідимо її положення щодо бінуса.




Рис. 31

Маємо:

$$\rho' = a; \qquad \rho'' = 0$$

тому:

$$\Delta = (a\theta)^2 + 2a^2 = a^2(\theta^2+2)$$

Цей вираз завжди додатній, а тому спіраль Архімеда у всіх своїх точках обернена до бінуса своєю вигнутістю (рис. 32)

II Гіперболічна спіраль: $\rho\theta = a$

1) $\rho = \frac{a}{\theta}$; 2) $\rho' = -\frac{a}{\theta^2}$; 3) $\rho'' = \frac{2a}{\theta^3}$




Рис. 32

тому:

$$\Delta = \frac{a^2}{\theta^2} - \frac{2a^2}{\theta^4} + \frac{2a^2}{\theta^4} = \frac{a^2}{\theta^2}$$

Отже $\Delta = \left(\frac{a}{\theta}\right)^2$ також завжди додатнє і крива у всіх точках повернена вигнутістю до бінуса (рис 33)

III приклад: Дослідити положення циссоїди рівняння $\rho = 2a \sin\theta \operatorname{tg}\theta$.




Рис. 33

Знаходячи ρ' і ρ'', ми одержимо: $\Delta = \frac{c}{\cos^3\theta}$, себто крива завжди обернена до бінуса вигнутістю.

§16. Загальне розуміння про кривину (лук) кривих.

Припустімо, що нам дано якусь криву й ми хочемо дослідити міру її скривлення. Цю міру скривлення будемо звати кривиною кри-

бої при даній точці. Щоб дослідити її нам треба розглянути яку-будь дугу цієї кривої обмежену, напр., точками M і N. Вважаємо, що на цій дузі немає точок перегину, себто дуга в цілому або випукла, або вгнута. Через граничні точки дуги M і N (рис. 34) проведемо дотичні й за додатний напрям їх будемо брати згідно з попередньо узятою, бік зростання кривої. Тоді кут між цими додатними напрямами дотичних γ будемо звати середньою кривиною даної дуги MN (кут γ вимірюється в кругових одиницях). Хай довжина дуги MN буде Δs, тоді відношення:




Рис. 34

$$K = \frac{\gamma}{\Delta s}$$

звуть середньою кривиною даної дуги MN.

Припустимо, що ми хочемо точку N поволі наближувати до точки M; в той самий час і кут γ, а разом з тим і дуга Δs будуть зменшуватися простуючи обоє до нуля. В цьому випадку межу нашого відношення K:

$$\lim_{\Delta s \to 0} K = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\gamma}{\Delta s} = \mathcal{K} \quad \ldots\ldots (36)$$


звуть (правдивою) кривиною кривої в точці M. При цьому кут γ стає безмежно-малим кутом між двома суміжними дотичними і тому зветься кутом суміжності.

Отже:

Кривиною кривої в даній точці зветься межа відношення кута суміжності до величини зміненої відповідною дотичною дуги, коли ця дуга прямує до нуля.

Приклад. Знайти кривину кола.

Рис. 35



Хай кут між дугами, проведеними в точки до-тику даної дотичної буде γ. Тоді $\gamma = \alpha$ (кути з пря-мовисними). Кут ми ви-міряємо центровими одини-цями, а тому дуга $\Delta s = r\cdot\alpha$ (рис. 35)

Таким чином середня кривина дуги кола MN буде:

$$K = \frac{\gamma}{\Delta s} = \frac{\alpha}{r\alpha} = \frac{1}{r}$$


Середня кривина K є величиною сталою, не-залежною від величини Δs, а тому й правдива кривина кола в кожній його точці буде $K = \frac{1}{r}$.

Звідси маємо:

$$r = \frac{1}{K}$$

Цю величину (луч кола) будемо звати лучем кривини (луку) кривої в даній точці і умо-вимося її означати через ρ.

Рис. 36



Хай точка M належить до якоїсь кривої AB і для кривини її в точці M ми одержимо вартість K (рис. 36)

Тоді рух кривини кривої в точці M:

$$\rho = \frac{1}{K} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (37)$$

буде уявляти з себе рух того кола, що повсюдно його через точку M, так щоб він мав перетину свою кривину однакову з кривиною кривої AB в точці M.

Очевидно, що коли:

$$K = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\gamma}{\Delta s}$$

то

$$\rho = \frac{1}{K} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta s}{\gamma}$$

§17. Кривина плоскої кривої.

I. Хай крива визначається рівнянням $y = f(x)$ Візьмімо на ній дві дуже близькі точки $M(x, y)$ і $N(x + \Delta x, y + \Delta y)$. Проведемо через точку M і N дотичні і хай їх кути спаду на вісь ікс'ів будуть: α і $\beta = \alpha + \Delta\alpha$




Рис. 37

Тоді з Δ-ка MBN маємо:

$$\gamma = \Delta\alpha$$

де α, а разом і Δs є функціями змінної x.

А тому:

$$\rho = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta\alpha} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{\Delta s}{\Delta x}}{\frac{\Delta\alpha}{\Delta x}} = \frac{\frac{ds}{dx}}{\frac{d\alpha}{dx}} \quad \ldots (a)$$

Але:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{1 + y'^2}$$

а тому:

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + y'^2}$$

Крім того відомо, що $y' = \operatorname{tg}\alpha$, а тому:

$$\alpha = \operatorname{arctg} y'$$

Звідси:

$$\frac{d\alpha}{dx} = (\operatorname{arctg} y')' = \frac{y''}{1 + y'^2}$$

Отже, вставляючи знайдені вартості у вираз (а), маємо:

$$\rho = \frac{\frac{ds}{dx}}{\frac{d\alpha}{dx}} = \frac{(1+y'^2)^2\sqrt{1+y'^2}}{y''} = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} \quad \ldots (38)$$

при цьому беремо лише абсолютну величину цього виразу, бо вартість ρ уповноважені вважати завжди додатною.

II. Коли рівняння кривої було задане у параметричній формі, напр.

$$x = \varphi(t) \; ; \; y = \psi(t)$$

то

$$\rho = \frac{ds}{d\alpha}$$

можна було б написати також:

$$\rho = \frac{\frac{ds}{dt}}{\frac{d\alpha}{dt}}$$

Але в цьому разі:

$$ds = dt\sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}$$

або:

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}$$

Крім того, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ або $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

маємо:

$$\alpha' = \frac{d\alpha}{dt} = \left[\operatorname{arctg}\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]' =$$

$$= \frac{1}{1+\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]^2} \cdot \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}$$

Таким чином:

$$\rho = \frac{\frac{ds}{dt}}{\frac{d\alpha}{dt}} = \frac{[\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2]^{\frac{3}{2}}}{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)} \quad \ldots\ldots (39)$$

або скорочуючи позначення $\varphi(t) = x$; $\psi(t) = y$, маємо:

$$\rho = \frac{[x'^2 + y'^2]^{\frac{3}{2}}}{x''y' - x'y''} \quad \ldots\ldots (40)$$

де похідні x і y взято по t.

Або ще інакше:

$$x' = \frac{dx}{dt}; \quad y' = \frac{dy}{dt}; \quad x'' = \frac{d^2x}{dt^2}; \quad y'' = \frac{d^2y}{dt^2}$$

тому:

$$\rho = \frac{[dx^2 + dy^2]^{\frac{3}{2}}}{d^2x\,dy - dx\,d^2y} \quad \ldots\ldots (41)$$

III. Коли рівняння кривої є в неявній формі:

$$F(x, y) = 0$$

то:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} y' = 0$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} y'^2 + \frac{\partial F}{\partial y} y'' = 0$$

Отже:

$$y' = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

$$y'' = \frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} y'^2}{\frac{\partial F}{\partial y}},$$

або, вставляючи у цей вірш вартість y', маємо:

$$y'' = -\frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}}\left[\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\cdot\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\cdot\frac{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2}{\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2}\right]$$

а звідси:

$$y'' = -\frac{1}{\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^3}\left[\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 - 2\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\cdot\frac{\partial F}{\partial x}\cdot\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2\right]$$

Вставляючи ці вартості у вираз:

$$\rho = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{y''}$$

маємо:

$$\rho = \frac{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 - 2\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\cdot\frac{\partial F}{\partial x}\cdot\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2} \quad \dots (42)$$

IV. Ще дуже корисно мати деякі відомості про дуги кривих в тому випадку, коли незалежною є сама дуга кривої, себто, коли крива визначена рівняннями:

$$x = \varphi(s) \quad ; \quad y = \psi(s) \quad \dots\dots (\alpha)$$

Ми вже довели, що кути, що творить дотична з осями визначаються:

$$\cos\alpha = \frac{dx}{ds} \; ; \; \cos\beta \left(= \pm \sin\alpha\right) = \frac{dy}{ds} \quad \dots (\delta)$$

й знаємо, що:

$$\rho = \frac{ds}{d\alpha} = \frac{1}{\frac{d\alpha}{ds}} \quad \dots\dots\dots\dots (\beta)$$

А тому:

щоб знайти що вартість $\frac{d\alpha}{ds}$, зауважимо, що s є незалежною, ми диференціюємо через s рівняння (δ) і маємо:

$$-\sin\alpha\frac{d\alpha}{ds} = \frac{d^2x}{ds^2}$$

$$\pm\cos\alpha\frac{d\alpha}{ds} = \frac{d^2y}{ds^2}$$

Далі піднесемо до квадрату ці рівності і вкінці їх додамо, маємо:

$$\left(\frac{d\alpha}{ds}\right)^2 = \left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2}\right)^2$$

або:

$$\frac{d\alpha}{dt} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2}\right)^2}$$

тому:

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2}\right)^2}} \quad \ldots\ldots (43)$$

або інакше:

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\varphi''(s)^2 + \psi''(s)^2}} \quad \ldots\ldots (44)$$

V. Дуже простий вираз дуга кривизни в деякій точці одержимо, коли визначимо його через величину прямової до кривої, поведеної через цю точку. Ми знаємо вже, що:

$$n = y\sqrt{1+y'^2}$$

а звідси:

$$n^2 = y^2(1+y'^2) \quad \text{або} \quad 1+y'^2 = \frac{n^2}{y^2}$$

Коли крива задана рівнянням $y = f(x)$, то:

$$\rho = \frac{[1+y'^2]^{\frac{3}{2}}}{y''}$$

а тому:

$$\rho = \frac{n^3}{y^3 y''} \quad \ldots\ldots (45)$$

§18. Основні приклади обчислення кривини.

Приклад 1. Знайти вираз дуга кривизни кри-

вої 2го ступіня.

Рівняння цієї кривої:

$$y^2 = 2px + qx^2$$

а тому, диференціюючи його маємо:

$$2yy' = 2p + 2qx \text{ ; або } yy' = p + qx$$

Звідси:

$$y' = \frac{p + qx}{y}$$

Диференціюючи далі, маємо:

$$y'^2 + yy'' = q$$

й звідси:

$$y'' = \frac{q - y'^2}{y}$$

або:

$$y'' = \frac{qy^2 - (p+qx)^2}{y^3} = \frac{q(2px + qx^2) - (p+qx)^2}{y^3} = -\frac{p^2}{y^3}$$

Таким чином:

$$\rho = \frac{n^3}{y^3\left(-\frac{p^2}{y^3}\right)}$$

або:

$$\rho = \left|\frac{n^3}{-p^2}\right| \quad \ldots\ldots (46)$$

Отже:

<u>Луг кривини кривої 2го ступіня є рівний з абсолютного величиною відношення кубу прядлової до квадрата півзліпника кривої.</u>

<u>Вислов.</u> <u>Луг кривини є пропорційний до кубу відповідної прядлової до кривої.</u>

<u>Приклад.</u> Вислови луг кривини параболи рівняння: $y^2 = 2px$.

Маємо: $n = y^2\left(1 + \frac{p^2}{y^2}\right) = y^2 + p^2$; $n = \left(y^2 + p^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

Таким чином:

$$\rho = \left| \frac{n^3}{-p^2} \right| = \frac{(y^2 + p^2)^{3/2}}{p^2}$$

Приклад 2. Знайти вирази радіуса кривини еліпса й гіперболи, що визначаються рівнянням:

$$b^2x^2 \pm a^2y^2 = a^2b^2 \quad \ldots (a)$$

Ми знаємо що:

$$\rho = \frac{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2\right]^{3/2}}{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + 2\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2} \quad \ldots (8)$$

А тому обчислюємо елементи цього виразу із рівняння (а) окремо:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2b^2x; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \pm 2a^2y; \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 2b^2; \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \pm 2a^2; \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 0$$

і вставляємо їх у задане рівняння (б) і маємо:

$$\rho = \left| \frac{(4b^4x^2 + 4a^4y^2)^{3/2}}{8a^4b^2y^2 \pm 8a^2b^4x^2} \right| =$$

$$= \left| \frac{8(b^4x^2 + a^4y^2)^{3/2}}{8a^2b^2(a^2y^2 \pm b^2x^2)} \right| = \left| \frac{(b^4x^2 + a^4y^2)^{3/2}}{a^2b^2(\pm a^2b^2)} \right|$$

бо $b^2x^2 \pm a^2y^2 = a^2b^2$, звідки: $a^2y^2 \pm b^2x^2 = \pm a^2b^2$.

Тому:

$$\rho = \frac{(b^4x^2 + a^4y^2)^{3/2}}{a^4b^4} \quad \ldots (в)$$

Це буде рад кривини еліпса й гіперболи.

З рівнянь кривих:

$$b^2x^2 \pm a^2y^2 = a^2b^2$$

одержимо:

$$\pm a^2y^2 = a^2b^2 - b^2x^2 = b^2(a^2 - x^2)$$

Отже:

$$a^2y^2 = \pm b^2(a^2 - x^2)$$

Вставляючи ці вирази у рівність (6), маємо:

$$\rho = \frac{\left[b^4x^2 \pm a^2b^2(a^2-x^2)\right]^{3/2}}{a^4b^4}$$

або:

$$\rho = \frac{b^6\left[b^2x^2 \pm a^4 \mp a^2x^2\right]^{3/2}}{a^4b^4}$$

Звідки:

$$\rho = \frac{\left[(b^2 \mp a^2)x^2 \pm a^4\right]^{3/2}}{a^4b} = \frac{\left[\frac{b^2 \mp a^2}{a^2}x^2 \pm x^2\right]^{3/2}}{ab}$$

де $\frac{a^2 \mp b^2}{a^2} = \varepsilon^2$ (– еліпса, + гіпербола). Тому:

$$\rho_{еліп} = \frac{(a^2 - \varepsilon^2x^2)^{3/2}}{ab}$$

$$\rho_{гіп} = \frac{(\varepsilon^2x^2 - a^2)^{3/2}}{ab}$$

Приклад 3. Знайти вираз радіуса кривизни циклоїди, що має рівняння: $x = a(\theta - \sin\theta)$, $y = a(1-\cos\theta)$

Скористуємося виразом (40) радіуса кривизни кривої визначеної рівняннями, а саме:

$$\rho = \left|\frac{\left[x'^2 + y'^2\right]^{3/2}}{x''y' - y''x'}\right| \quad \ldots\ldots (d)$$

Обчислимо окремі члени виразу:

$x' = a(1-\cos\theta) = 2a\sin^2\frac{\theta}{2}$; $y' = a\sin\theta = 2a\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$; $x'' = a\sin\theta$; $y'' = a\cos\theta$

Тому:

$$\rho = \left|\frac{\left[4a^2\sin^4\frac{\theta}{2} + 4a^2\sin^2\frac{\theta}{2}\cos^2\frac{\theta}{2}\right]^{3/2}}{a^2\sin^2\theta - a^2\cos\theta(1-\cos\theta)}\right| = \left|\frac{8a^3\sin^3\frac{\theta}{2}\left(\sin^2\frac{\theta}{2} + \cos^2\frac{\theta}{2}\right)^{3/2}}{a^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) - a^2\cos\theta}\right| =$$

$$= \frac{8a\sin^3\frac{\theta}{2}}{1-\cos\theta} = \frac{8a\sin^3\frac{\theta}{2}}{2\sin^2\frac{\theta}{2}} = 4a\sin\frac{\theta}{2}$$

З другого боку:

$$n = \frac{y\,ds}{a\,dx} = \frac{a(1-\cos\theta)\,d\theta\sqrt{a^2(1-\cos\theta)^2 + a^2\sin^2\theta}}{a(1-\cos\theta)\,d\theta}$$

Після скорочення й перетворення маємо:

$$n = a\sqrt{1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta + \sin^2\theta} = a\sqrt{2(1-\cos\theta)} = a\sqrt{2 \cdot 2\sin^2\frac{\theta}{2}} = 2a\sin\frac{\theta}{2}$$

Таким чином:

$$\rho = 2n$$

Радіус кривини циклоїди в кожній її точці є рівний її подвійному довжині відповідної прямової.

§19. Коло кривини й центр кривини.

Хай дано криву AB і на ній точку $M(x, y)$. Через цю точку поведемо (як ми вже надували) коло кривини. Очевидно, що це коло має такі прикмети:




Рис. 38

1) Має спільну з кривою дотичну, поведену через точку M.
2) Радіус цього кола буде ρ.
3) Центр його $O(\xi,\eta)$ лежить на прямовій до кривої, поведеній через точку $M(x,y)$ і на відстані від цієї точки рівному MO.
4) Коло це буде положене з боку вигнутости кривої.

Центр $O(\xi,\eta)$ цього кола зветься центром кривини даної кривої AB в точці її M. Щоб обчислити величини цього центру, збудуємо в точці $M(x,y)$ коло кривини центру $O(\xi,\eta)$ (Рис 39).




Рис. 39

Хай пряма творить з осями координат кути τ і δ. Тоді з ΔMOK маємо:

1) $\xi - x = \rho\cos\tau$
2) $\eta - y = \rho\cos\delta$

або:

$$\left.\begin{aligned} \xi &= x + \rho\cos\tau \\ \eta &= y + \rho\cos\vartheta \end{aligned}\right\} \ldots\ldots\ldots (47)$$

Але ми знаємо, що косинуси кутів прямової з осями координат визначаються:

1) $$\cos\tau = \mp\frac{dy}{ds} = \mp\frac{dy}{dx\sqrt{1+y'^2}} = \mp\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}$$

2) $$\cos\vartheta = \pm\frac{dx}{ds} = \pm\frac{dx}{dx\sqrt{1+y'^2}} = \pm\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$$

Тому:

$$\xi = x \mp \frac{\rho y'}{\sqrt{1+y'^2}}$$

$$\eta = y \pm \frac{\rho}{\sqrt{1+y'^2}}$$

Але $\rho = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{y''}$, а тому:

$$\xi = x \mp y'\,\frac{1+y'^2}{y''} \ldots\ldots (\alpha)$$

$$\eta = y \pm \frac{1+y'^2}{y''} \ldots\ldots (\beta)$$

Лишається проаналізувати знак $\mp$.

В дробу $\frac{1+y'^2}{y''}$ чисельник завжди додатній, а тому знак самого дробу залежить від знаку знаменника y''.

Коли $y'' > 0$, то відношення $\frac{1+y'^2}{y''} > 0$ [де $y = f(x)$ - з рівняння кривої], себто випуклість кривої обернена в бік осі x-ів (рис 40а), але тоді $\eta > y$.




Рис 40а

Тепер тільки у виразі (β) знак перед дробом мусить бути +.

Коли ж $y''<0$, то й відношення $\frac{y'}{y''}<0$. Крива обернена до осі x-ів випуклістю (рис. 40б). Але тоді $\eta<y$, а тому у взорі (β) дріб $\frac{1+y'^2}{y''}$ має бути від'ємним, себто змінює знак y''. Таким чином перед дробом також слідує стояти +. Отже маємо:




Рис. 40б

$$\left.\begin{aligned}\xi &= x - y'\frac{1+y'^2}{y''}\\ \eta &= y + \frac{1+y'^2}{y''}\end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots (48)$$

(бо знак перед дробом у визначенні ξ є протилежний знаку перед дробом у визначенні η.)

§20. Визначення луча кривини в біполярних координатах.

Введемо такі означення:

1) Луч кривини - ρ
2) Відповідний луч вектор - r
3) Фаза даного луча вектора - θ
4) Кут спаду відповідної дотичної - α
5) Напрямний (векторовий) кут дотичної - M




Рис. 41

Тоді можемо написати:

$$\alpha = \theta + M \quad \ldots\ldots (a)$$

Перед цим ми довели, що:

$$\rho = \frac{ds}{d\alpha} \quad \text{де} \quad ds = d\theta\sqrt{r^2 + r'^2}$$

Треба ще обчислити величину $d\alpha$:

Для цього диференціюємо рівність (α) і маємо:

$$d\alpha = d\theta + d\mu$$

Але $tg\mu = \frac{r}{r'}$, або $\mu = arctg\frac{r}{r'}$

а звідси:

$$d\mu = \frac{1}{1 + \frac{r^2}{r'^2}} \cdot \frac{r'^2 - rr''}{r'^2} d\theta$$

або:

$$d\mu = \frac{r'^2 - rr''}{r^2 + r'^2} d\theta$$

Отже:

$$d\alpha = d\theta + \frac{r'^2 - rr''}{r^2 + r'^2} d\theta = \left[\frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{r^2 + r'^2}\right] d\theta$$

Таким чином:

$$\rho = \left| \frac{(r^2 + r'^2)^{3/2}}{r^2 + 2r'^2 - rr''} \right| \quad \ldots\ldots\ldots (49)$$

Примітка. До цього самого висліду дійдемо шляхом перетворення осей.

Приклади.

1) Обчислити луг кривини архімедової спіралі: $r = a\theta$.

Диференціюючи рівняння кривої маємо: 1) $r' = a$, 2) $r'' = 0$

Тому:

$$\rho = \frac{a^3(1+\theta^2)^{3/2}}{a^2(2+\theta^2)} = \frac{a(1+\theta^2)^{3/2}}{2+\theta^2}$$

2) Обчислити луг кривини гіперболічної спіралі: $r\theta = a$.

Маємо диференціюючи рівняння кривої маємо:

1) $r' = -\frac{a}{\theta^2}$; 2) $r'' = \frac{2a}{\theta^3}$. Тому:

$$\rho = \frac{a^3(\theta^2-1)^{3/2}}{\theta^6\left(\frac{a^2}{\theta^2} + 2\frac{a^2}{\theta^4} - 2\frac{a^2}{\theta^4}\right)} = \frac{a(\theta^2-1)^{3/2}}{\theta^4}$$

3) Обчислити луг кривини логарифмічної спіралі: $r = ae^{m\theta}$

Ми знаємо, що $\rho = \frac{ds}{d\alpha}$, де $\alpha = \theta + \mu$, а тому: $d\alpha = d\theta + d\mu$. Але для логарифмічної спіралі $\mu = const$, себто $d\mu = 0$. Отже $d\alpha = d\theta$.

Маємо тепер:

$$\rho = \frac{ds}{d\theta} = \sqrt{r^2 + r'^2} = N$$

себто: Луг кривини логарифмічної спіралі є рівний з відтинком бінормалі, дотикової променевої. Центри кривини логарифмічної спіралі завжди лежать на осі полів.

§21. Визначення луга кривини через відділення відповідної дотичної від бінома.

Ми тут розглянемо ще один спосіб обчислення луга кривини, що нам дуже часто користу-ватиметься в механіці.

Спустимо з бінома O на дотичну, повернену через прямий кут, пряму ON (рис. 41) і означимо її довжину через p.

З ΔMON маємо:

$$p = r\sin(\pi - \mu) = r\sin\mu$$

Але ми довели, що $tg\mu = \frac{r}{r'}$, а звідси $\sin\mu = \frac{r}{\sqrt{r^2 + r'^2}}$

Тому:

$$p = \frac{r^2}{\sqrt{r^2 + r'^2}}$$

Беремо похідну (диференціал) від p й маємо:

$$dp = \frac{2r\,dr\sqrt{r^2+r'^2} - \frac{r^2(2r\,dr + 2r'r''d\theta)}{2\sqrt{r^2+r'^2}}}{r^2 + r'^2} = \frac{2r\,dr(r^2+r'^2) - r^2(r\,dr + r''dr)}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}$$

бо $r'd\theta = dr$

Виносимо rdr за дужки й робимо зведення членів:

$$dp = rdr\,\frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}$$

Далі користуючись виразом ρ (49) ми одержимо:

$$dp = \frac{rdr}{\rho}$$

А звідси:

$$\rho = \frac{r\,dr}{dp} \quad \ldots\ldots\ldots (50)$$

Як переконаємося в механіці цей вираз через свою простоту дає великі зручності для його використання.

§22. Евольюта й евольвента (інволюта)

Припустімо, що нам дано де-яку криву AB. Для кожної її точки збудуємо відповідний їй круг кривини й визначимо центр кривини. Геометричний осередок всіх цих центрів має назву <u>евольюти</u> (A_1B_1) або <u>кривої розгортання</u> (рис. 42)




Рис. 42

Сама ж крива AB зветься <u>евольвентою (інволютою)</u> кривої A_1B_1, або розгортною кривою (евольюти) A_1B_1.

Очевидно, що кожна пряма, що проходить через відповідний центр кривини матиме лише одну спільну точку з евольютою, себто всі прямі евольвенти є дотичними евольюти. Так звати, евольюта є спільно-дотичною до

всіх кривих - евольвенти.

Хай рівняння кривої $y = f(x)$

Ми довели, що значки центра кривини якої-будь точки M кривої будуть:

$$\xi = x - y' \frac{1+y'^2}{y''}, \quad \eta = y + \frac{1+y'^2}{y''} \quad (a)$$

Очевидно, щоб одержати рівняння геометричного осередку центрів кривини, треба вилучити змінні x і y і установити зв'язок лише між ξ і η. Вставляючи вартості: $y = f(x)$; $y' = f'(x)$ і $y'' = f''(x)$ ми маємо два рівняння, що містять крім ξ і η лише x:

$$\xi = x - f'(x) \frac{1 + f'(x)^2}{f''(x)}$$

$$\eta = f(x) + \frac{1 + f'(x)^2}{f''(x)} \quad (б)$$

Вилучаючи з цих рівнянь x, ми одержимо шукане рівняння:

$$\varphi(\xi, \eta) = 0$$

що й є рівнянням евольвенти кривої AB.

Приклад 1. Написати рівняння евольвенти параболи: $y^2 = 2px$.

Диференціюючи рівняння маємо:

1) $2yy' = 2p$, або $y' = \frac{p}{y}$ 2) $y'^2 + yy'' = 0$, або $y'' = -\frac{p^2}{y^3}$

Крім того з самого рівняння одержимо: 3) $x = \frac{y^2}{2p}$.

Тепер вилучаючи з (a) змінні x і маємо:

$$\xi = \frac{y^2}{2p} - \left(\frac{p}{y} \cdot \frac{1 + \frac{p^2}{y^2}}{-\frac{p^2}{y^3}}\right); \quad \eta = y + \frac{1 + \frac{p^2}{y^2}}{-\frac{p^2}{y^3}}$$

Або:

$$\xi = \frac{y^2}{2p} + \frac{y^2+p^2}{p} = \frac{3y^2}{2p} + p$$

$$\eta = y + y\cdot\frac{y^2+p^2}{-p^2} = \frac{-yp^2+y^3+yp^2}{-p^2} = -\frac{y^3}{p^2}$$

Нарешті, коли з цих рівнянь,

$$\xi = \frac{3y^2}{2p} + p \quad і \quad \eta = -\frac{y^3}{p^2}$$

виключимо й останню змінну y, то одержимо:

$$(\xi - p)^3 = \frac{27y^6}{8p^3}\ ; \qquad \eta^2 = \frac{y^6}{p^4}$$

а поділивши почленно перше рівняння на друге маємо:

$$\frac{(\xi-p)^3}{\eta^2} = \frac{27p}{8}$$

або:

$$\eta^2 = \frac{8}{27p}(\xi - p)^3$$




Рис.43

Ми одержали так звану <u>півкубічну параболу</u> (рис.43). Цю параболу ми ще досліджували.

<u>Приклад 2</u>. Евольвента еліпса.

Візьмімо эліптикове рівняння еліпса:

$$x = a\cos\theta\ ; \qquad y = b\sin\theta$$

і диференціювання їх обчислюємо y' і y''. Маємо:

$$dx = -a\sin\theta\, d\theta\ ; \qquad dy = b\cos\theta\, d\theta$$

або:

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a}\operatorname{ctg}\theta$$

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dx} = \frac{b}{a}\cdot\frac{1}{\sin^2\theta}\cdot\frac{1}{-a\sin\theta} = -\frac{b}{a^2}\cdot\frac{1}{\sin^3\theta}$$

Отже:

$$1+y'^2 = 1+\frac{b^2}{a^2}\operatorname{ctg}^2\theta = \frac{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{a^2-(a^2-b^2)\cos^2\theta}{a^2\sin^2\theta} =$$

$$= \frac{a^2-e^2\cos^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{1-\varepsilon^2\cos^2\theta}{\sin^2\theta}$$

Тому за виразом (48) маємо:

$$\xi = a\cos\theta - \left[+\frac{b\cos\theta(1-\varepsilon^2\cos^2\theta)\,a^2\sin^3\theta}{a\sin\theta\cdot\sin^2\theta\cdot b}\right]$$

або:

$$\xi = a\cos\theta - a\cos\theta + a\varepsilon^2\cos^3\theta. \text{ Отже:}$$

$$\xi = a\varepsilon^2\cos^3\theta \quad (*)$$

$$\eta = b\sin\theta + \frac{1-\varepsilon^2\cos^2\theta\, a^2\sin^3\theta}{\sin^2\theta\cdot(-b)} = \frac{b^2\sin\theta - a^2\sin\theta + a^2\varepsilon^2\sin\theta\cos^2\theta}{b}$$

$$= \frac{(b^2-a^2)\sin\theta + a^2\varepsilon^2\sin\theta(1-\sin^2\theta)}{b} = \frac{-a^2\varepsilon^2\sin\theta + a^2\varepsilon^2\sin\theta - a^2\varepsilon^2\sin^3\theta}{b}$$

Отже:

$$\eta = -\frac{a^2\varepsilon^2}{b}\sin^3\theta \quad (**)$$

Виключаючи з рівнянь (*) і (**) змінну θ і маємо:

$$\xi^{2/3} = a^{2/3}\cdot\varepsilon^{2/3}\cdot\cos^2\theta; \qquad \eta^{2/3} = +\frac{a^{2/3}\cdot\varepsilon^{2/3}}{b^{2/3}}\sin^2\theta$$

або:

$$\left(\frac{\xi}{a}\right)^{2/3} = \varepsilon^{2/3}\cos^2\theta; \qquad \left(\frac{\eta b}{a^2}\right)^{2/3} = \varepsilon^{2/3}\sin^2\theta$$

А звідси:

$$\left(\frac{\xi}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{\eta b}{a^2}\right)^{2/3} = \varepsilon^{2/3}$$

але $\varepsilon = \frac{e}{a}$, тому:

$$\left(\frac{\xi}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{\eta b}{a^2}\right)^{2/3} = \frac{e^{2/3}}{a^{2/3}} \text{ або } (a\xi)^{2/3} + (\eta b)^{2/3} = e^{2/3}$$

А звідси:

$$\left(\frac{a\xi}{c^2}\right)^{2/3}+\left(\frac{b\eta}{c^2}\right)^{2/3}=1 \quad \ldots\ldots (51)$$

Ця крива (рис. 44) має назву астроїди (зореподібна крива)




Рис. 44

Приклад 3. Еволюта гіперболи.

Параметричні рівняння гіперболи будуть:

$$x=\frac{a}{\sin t}\ ;\quad y=\frac{b}{\sin t}\cdot\cos t$$

тому, подібно до попереднього, матимемо:

$$\xi=\frac{a^2+b^2}{a\sin^3 t}\ ;\quad \eta=-\frac{a^2+b^2}{b\operatorname{tg}^3 t}$$

або:


$$\xi=\frac{c^2}{a\sin^3 t}\ ;\qquad \eta=-\frac{c^2}{b\operatorname{tg}^3 t}$$

Отже:

$$\operatorname{cosec}^3 t=\frac{a\xi}{c^2}\ ;\quad \operatorname{ctg}^3 t=-\frac{b\eta}{c^2}$$

$$\operatorname{cse}^2 t=\left(\frac{a\xi}{c^2}\right)^{2/3}\ ;\quad \operatorname{ctg}^2 t=\left(\frac{b\eta}{c^2}\right)^{2/3}$$

Рис. 45



З тригонометрії відомо, що $\operatorname{cse}^2 t=1+\operatorname{ctg}^2 t$, або $\operatorname{cse}^2 t-\operatorname{ctg}^2 t=1$.

Тому:

$$\left(\frac{a\xi}{c^2}\right)^{2/3}-\left(\frac{b\eta}{c^2}\right)^{2/3}=1$$

Це є рівняння еволюти гіперболи (рис. 45).

Приклад 4. Еволюта циклоїди.

Рівняння циклоїди:

$$x=a(\theta-\sin\theta);\quad y=a(1-\cos\theta)$$

Звідси:

$$y'=\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2};\quad y''=-\frac{1}{4a\sin^4\frac{\theta}{2}}\ ;\quad 1+y'^2=\frac{1}{\sin^2\frac{\theta}{2}}$$

Отже:

$$\xi = x - y'\frac{1+y'^2}{y''} = a(\theta - \sin\theta) + \operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}\,\frac{4a\sin^4\frac{\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2}} =$$

$$= a(\theta - \sin\theta) + 4a\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} = a\theta - a\sin\theta + 2a\sin\theta = a(\theta + \sin\theta)$$

Аналогічно:

$$\eta = y + \frac{1+y'^2}{y''} = -a(1-\cos\theta)$$

Це рівняння також циклоїди. Справді, беремо $\theta = \pi + \theta_1$ і маємо:


$$\xi = a[(\pi + \theta_1) - \sin\theta_1]; \quad \eta = -a(1+\cos\theta_1)$$

Перенесемо осі координат в точку $A(\pi a, -2a)$, тоді $\xi = \pi a + \xi'$, $\eta = -2a + \eta$ і тому:

$$\xi' = a(\theta_1 - \sin\theta_1); \quad \eta' = a(1-\cos\theta_1)$$

Це знайоме рівняння циклоїди. Збудуємо її.

Рис. 46



<u>Приклад 5.</u> Еволюта логарифмічної спіралі.


Рівняння спіралі:

$$\rho = ae^{m\theta}$$

Ми вже знаємо, що центр кривини буде точка $K(\rho_1, \theta_1)$. Тому значення ρ_1 буде ОК (підрадіусова). Але $OK = \rho'$, а тому:

$$\rho_1 = ame^{m\theta}$$

Рис. 47.



Далі, кут $\vartheta_1 = \angle KOA = \frac{\pi}{2} + \theta_1$, а через те:

$$\rho_1 = ame^{m(\theta_1 - \frac{\pi}{2})}$$

Це є також логарифмічна спіраль.

Справді: повернемо осі координат на якийсь кут α, тоді, означивши нові координати через ρ_2 і θ_2, матимемо:

$$\rho_2 = \rho_1 \; ; \quad \theta_2 = \theta_1 - \alpha \quad \text{або} \quad \theta_1 = \theta_2 + \alpha$$

Тому:

$$\rho_2 = ame^{m(\theta_2 + \alpha - \frac{\pi}{2})}$$

або:

$$\rho_2 = ae^{m\theta_2} \cdot me^{m(\alpha - \frac{\pi}{2})}$$

Себто:

$$\lg m + m\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \; ; \; \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\lg m}{m}$$

Отже, коли повернути осі координат на кут $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\lg m}{m}$, то матимемо рівняння:

$$\rho_2 = ae^{m\theta_2}$$

що є звичайним рівнянням логарифмічної спіралі

§23. Властивості евольоти.

1) <u>Дотична до евольоти є прямовою евольвенти</u> (себто дотична до евольоти є прямою до дотичної евольвенти)

Хай рівняння даної кривої (евольвенти) $y = f(x)$ а рівняння евольоти її буде: $\eta = \varphi(\xi)$.

Тоді кутовий зміщник дотичної до евольоти буде:

$$\eta' = \frac{d\eta}{d\xi}$$

а кутовий злиття дотичної до евольвенти:

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

Нам треба довести, що ці дотичні є взаємно прямові, себто, що $\eta' y' + 1 = 0$, або

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{d\eta}{d\xi} + 1 = 0$$

(умова прямовості).

Рівняння прямової до даної кривої:

$$(X - x) + y'(Y - y) = 0$$

Центр кривини, себто відповідна точка евольюти, лежить на цій прямовій, а тому:

$$(\xi - x) + y'(\eta - y) = 0 \quad \ldots \quad (a)$$

Диференціюємо це рівняння, маємо:

$$d\xi - dx + (\eta - y)\,dy' + y'(d\eta - dy) = 0$$

або:

$$d\xi - dx + (\eta - y)y''dx + y'(d\eta - y'dx) = 0$$

а звідси:

$$d\xi + y'd\eta - dx[1 - (\eta - y)y'' + y'^2] = 0$$

Але:

$$\eta = y + \frac{1 + y'^2}{y''}$$

а тому:

$$d\xi + y'd\eta - dx\Big[1 - \frac{1 + y'^2}{y''}y'' + y'^2\Big] = 0$$

(0)

або:

$$d\xi + y'd\eta = 0$$

Таким чином:

$$1 + y'\frac{d\eta}{d\xi} = 0$$

Що й треба було довести.

2). Площа дуги евольвенти числово рівний з площею круга кривини евольвенти.

Нехай дуга евольвенти буде s, тоді:

$$ds = \sqrt{d\xi^2 + d\eta^2}$$

Ми знаємо, що рад кривини:

$$\rho = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''}$$

Але з другого боку квадрат того ж рад. через значення кінців його буде:

$$\rho^2 = (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 \quad \ldots\ldots (\delta)$$

Тому маємо рівняння:

$$(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''} \quad \ldots\ldots (6)$$

Диференціюючи його, як після скорочення на 2 одержимо:

$$(\xi - x)\,d\xi + (\eta - y)\,d\eta - dx\left[(\xi - x) + (\eta - y)\,y'\right] = \rho\,d\rho$$

На підставі же рівності (а), вирах в квадратових дужках є рівний з нулем і через те:

$$(\xi - x)\,d\xi + (\eta - y)\,d\eta = \rho\,d\rho$$

Підносимо це рівняння до квадрату:

$$(\xi - x)^2 d\xi^2 + 2(\xi - x)(\eta - y)\,d\xi\,d\eta + (\eta - y)^2 d\eta^2 = \rho^2 d\rho^2$$

Далі з рівняння (б) маємо:

$$1)\ (\xi - x)^2 = \rho^2 - (\eta - y)^2$$

$$2)\ (\eta - y)^2 = \rho^2 - (\xi - x)^2$$

І тому:

$$\rho^2 d\xi^2 + \rho^2 d\eta^2 - \left[(\eta - y)^2 d\xi^2 - 2(\xi - x)(\eta - y)\,d\xi\,d\eta + (\xi - x)^2 d\eta^2\right] = \rho^2 d\rho^2$$

або:

$$\rho^2(d\xi^2+d\eta^2)-[(\eta-y)d\xi-(\xi-x)d\eta]^2=\rho^2 d\rho^2 \quad \ldots (2)$$

А із першої властивості маємо:

$$-1+y'\frac{d\eta}{d\xi}=0$$

або $d\xi=-y'd\eta$

Вставляючи це в рівність (2), одержимо:

$$\rho^2(d\xi^2+d\eta^2)+[(\eta-y)y'+(\xi-x)]^2 d\eta^2=\rho^2 d\rho^2$$

$[\ ]=0$ на нормалі рівності (а)

Маємо:

$$d\xi^2+d\eta^2=d\rho^2$$

а звідси:

$$d\rho=\pm\sqrt{d\xi^2+d\eta^2}=\pm ds$$

де + відповідає одночасному зростанню і ρ, і s, а −, коли при зростанню s дуг ρ спадає.

Хай дуга зростає, коли дуг спадає, тоді:

$$\Delta s=-\Delta\rho$$

або:

$$\Delta(s+\rho)=0$$

себто:

$$\rho+s=\text{const}$$

Хай дано еволюту AB (рис. 48). Візьмімо нитку, що не розтягується, нитку і закріпимо її кінець в якій будь точці C еволюти. Натягнемо цю нитку вздовж дотичної до еволюти CK і зрізаному нитку в точці K.




Рис. 48

Коли далі будемо натягати

ми нитку на еволюту (прилягли її натягнутою в напрямку дотичної), тоді кінець цієї нитки K буде окреслювати евольвенту MN, бо при цьому елемента натягнутої нитки завжди буде рівне приросценню натягнутої на дугу нитки, себто:

$$-\Delta\rho = \Delta s$$

Теже саме одержимо, коли наверпутку на еволюту нитку будемо розгортати. [Отже звідсіль створилася назва: евольвента = розгортка]

§24. Огортальні кривих.

Ми знаємо, що кожна крива виражається рівнянням:

$$F(x, y) = 0 \ldots\ldots (1)$$

Припустімо, що в це рівняння введено довільну величину α, яко довільний змінник і будемо розглядати рівняння:

$$F(x, y, \alpha) = 0 \ldots\ldots (2)$$

де x і y є певні змінні величини, а α параметр, що йому ми довільно можемо давати різні вартости.

Очевидно, що при всіх вартостях α, рівняння (2) буде виражати однакові криві (напр. всі вони будуть або еліпси, або кола і т. д.) подібні до кривої (1), для якої $\alpha = 0$

Шерег таких кривих, що виражаються рівнянням (2) при всіх можливих вартостях α звемо поодинокою (сімейством) кривих.

А рівняння (2) є рівнянням цієї родини кривих.

Хай маємо (рис. 49) дві яким-небудь криві L_0 і L_1 із родини кривих визначених рівнянням: $F(x,y,\alpha)=0$

Крива L_0 відповідає якійсь сталій вартості змінного $\alpha = \alpha_0$, а крива L_1 вартості $\alpha = \alpha_1$




Рис. 49.

Припустімо, що ми взяли вартість α_1, таку близьку до α_0, що різниця між цими $\alpha_1 - \alpha = \Delta\alpha$ дає можливість кривим L_0 і L_1 зазнати перетинання. Кожні дві криві можуть перетинатися або в одній, або в двох, або в кількох точках. Хай одна з таких точок буде A. Очевидно, що ця точка визначається як перетин кривих:

$$F(x,y,\alpha)=0 \quad \text{і} \quad F(x,y,\alpha+\Delta\alpha)=0$$

Коли $\Delta\alpha$ буде зменшуватися, прямуючи до нуля, то крива L_1 буде повертатися й перетворювуватися так, щоб в останній момент, коли $\Delta\alpha$ зрівняється з нулем, злилася з кривою L_0. Після цього процесу й точка A, перетину цих кривих, посуватиметься (положення $A_1, A_2 \ldots$), поки що в самий момент їх злиття займе вже останнє положення A_n. Останнє положення точки A_n буде прилеглою точкою кривої L_0.

Таким чином: коли нам дано родину кри-

<u>ших, то приналежної точкової одиці з них є остаточне (лискове) положення її, безлискено-близького до неї иншого кривого з тієї же родини кривих.</u>

Зважаючи на те, що дві криві можуть перетинатися і в кількох точках, то загалом, на кожній даній кривій з родини, може бути не тільки одна, але й кілька приналежних точок.

Ясна річ, що значення приналежної точки можна визначатися із системи рівнянь:

$$F(x, y, \alpha) = 0$$
$$F(x, y, \alpha + \Delta\alpha) = 0$$

коли в останньому рівнянню $\Delta\alpha$ прямує до нуля. Це друге рівняння можна ще перетворити так:

1) Відніймо з нього 1-ше рівняння, а саме:

$$F(x, y, \alpha + \Delta\alpha) - F(x, y, \alpha) = 0$$

2) поділимо всі члени цього рівняння на $\Delta\alpha$;

Тоді маємо:

$$\frac{F(x, y, \alpha + \Delta\alpha) - F(x, y, \alpha)}{\Delta\alpha} = 0$$

Одержимо нову систему рівнянь:

$$F(x, y, \alpha) = 0 \quad \cdots \quad (\alpha)$$

$$\frac{F(x, y, \alpha + \Delta\alpha) - F(x, y, \alpha)}{\Delta\alpha} = 0 \quad \cdots \quad (3)$$

Ця система є рівносильна з першою, а друге її рівняння є виходом рівняння попередньої системи. Коли тепер $\Delta\alpha$ прямує до своєї лискової величини, себто до нуля, то рівняння (3) обертається в

$$F'_\alpha(x, y, \alpha) = 0$$

і через те значення цього параметра точки будуть розв'язками системи:

$$\left.\begin{aligned} F(x, y, \alpha) &= 0 \\ F'_\alpha(x, y, \alpha) &= 0 \end{aligned}\right\} \ldots\ldots (52)$$

Очевидно, що ця прикметна точка належатиме кожній ріс до певної кривої із родини їх, в залежності від заданої вартості α.

Коли ж із системи (52) вилучити змінника α, то ми одержимо геометричний осередок всіх прикметних точок даної родини кривих виразу: $\Phi(x, y) = 0$ Це буде кривою, що має назву: <u>огортальної родини кривих</u>, самі ж криві цієї родини звуться <u>огорненими.</u>

Міркування цього § приводять нас до таких висновків:

Кожне рівняння виразу:

$$F(x, y, \alpha) = 0$$

може бути:

1) Рівнянням <u>родини кривих</u>, коли в ньому α є довільним змінником, що може мати які нам бажано вартости.

2) рівнянням <u>однієї з кривих</u>, що належить до даної родини, себто рівнянням якоїсь огорненої кривої, що відповідає <u>одній (окремій) сталій</u> вартості α [напр. $F(x, y, \alpha) = 0$]

3) рівнянням <u>огортальної</u>, коли в ньому α є змінною функцією x і y, вибраною з прикметно-

го рівняння $F_\alpha(x, y, \alpha) = 0$

Приклад: Знайти огортальну родини кол рівняння: $u = (x-\alpha)^2 + y^2 = r^2$. (1)

З форми самого рівняння ми бачимо, що це є родина кол сталого радіуса, центри яких лежать на осі x-ів (рис. 50). Складаємо приєднане рівняння:




Рис. 50

$$u'_\alpha = -2(x-\alpha) = 0 \quad \text{або} \quad x-\alpha = 0 \quad \cdots \quad (2)$$

Щоб мати рівняння огортальної даних кол, ми виключаємо з (1) і (2) змінне α й одержуємо:

$$0^2 + y^2 - r^2 = 0 \quad \text{або} \quad y^2 - r^2 = 0$$

Звідси:

$$(y+r)(y-r) = 0 \quad \text{або} \quad y = -r; \; y = +r$$

Це є система двох простих рівнобіжних до осі x-ів і в даному разі спільних дотичних до всіх кол.

§25. Основна властивість огортальних родини кривих.

Дотична до огортальної в кожній її точці є також дотичною до тієї огорненої з родини кривих, для якої задана точка є приєднаною.

Візьмімо будь яку криву з родини даних кривих. Хай вона буде L_0. Означимо одну з її приєднаних точок через $M(x, y)$. Очевидно, що ця точка буде спільною й для даної огорненої L_0 і для огортальної всій родині З. Щоб довести, що дотична, поведена

через точку M до кривої $\mathfrak{J}$ буде дотичною також і до кривої L_0, досить нам скласти рівняння дотичної поведеної через точку M, окремо до кривої L_0 і кривої $\mathfrak{J}$ і показати, що ці рівняння є ідентичні. Отже:

1) Рівняння дотичної до кривої L_0, що має рівняння $F(x,y,\alpha_0)=0$, де $\alpha_0=\text{const}$, матиме вигляд:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(X-x)+\frac{\partial F}{\partial y}(Y-y)=0 \quad \ldots \quad (\alpha)$$

2) Аналогічно, рівняння дотичної поведеної через ту саму точку $M(x,y)$ до огортальної $\mathfrak{J}$ буде:

$$\frac{\partial}{\partial x}\big[F(x,y,\alpha)\big](X-x)+\frac{\partial}{\partial y}\big[F(x,y,\alpha)\big](Y-y)=0 \quad \ldots \quad (\beta)$$

Тепер обчислимо похідні: $\frac{\partial}{\partial x}\big[F(x,y,\alpha)\big]$ і $\frac{\partial}{\partial y}\big[F(x,y,\alpha)\big]$, беручи на увагу, що дана крива $\mathfrak{J}$ є огортальною, а тому у рівнянні $F(x,y,\alpha)=0$ змінна α є функцією x і y, визначеною з рівняння $F'_\alpha=0$, або $\frac{\partial F}{\partial \alpha}=0$. Тому тоді $F(x,y,\alpha)$ є складною й ми маємо:

$$1)\ \frac{\partial}{\partial x}\big[F(x,y,\alpha)\big]=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial x}$$

$$2)\ \frac{\partial}{\partial y}\big[F(x,y,z)\big]=\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial y}$$

Але приймаючи рівняння дає $\frac{\partial F}{\partial \alpha}=0$, а тому маємо:

$$1)\ \frac{\partial}{\partial x}\big[F(x,y,\alpha)\big]=\frac{\partial F}{\partial x}$$

$$2)\ \frac{\partial}{\partial y}\big[F(x,y,\alpha)\big]=\frac{\partial F}{\partial y}$$

(ці самі вислідки, коли ми вважали $\alpha=\text{const}$)

Виключивши тепер, рівняння (3) дотичної до огортаючої Δ в точці M одержимо вираз:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(X-x)+\frac{\partial F}{\partial y}(Y-y)=0 \ldots (8)$$

Бачимо, рівняння (7) є ідентичним з рівнянням (4), а тому теорема є доведена.

Зауваження. Може бути так, що характеристична крива, до якої всі дані огорнені прості сім'ї будуть дотичними.

Очевидно, що коли ми будемо мати рівності $\frac{\partial F}{\partial x}=0$ і $\frac{\partial F}{\partial y}=0$, то певно означеної дотичної в даній точці M не існує, а тому такого роду точка зветься особливою. В цьому випадку виключення α з системи рівнянь (5) дає рівняння геометричного осередку особливих такого роду точок. Це питання ми будемо розглядати нижче і будемо для цього окремий §.

§26. Інші трактування еволюти.

Еволюта є огортаючою всіх нормалей до еволюти.

Нехай дана крива визначається рівнянням $y=f(x)$ (1). Тоді складаючи за загальним правилом рівняння нормалі до неї в довільній точці $M(x,y)$, одержимо:

$$(x-\alpha)+(y-\beta)\frac{dy}{dx}=0 \ldots (2)$$

Точка M лежить на цій прямій, а тому її координати задовольняють рівнянню (1), а са-

де $\beta = f(\alpha)$. Отже:

$$(x-\alpha) + [y - f(\alpha)] f'(\alpha) = 0 \quad \ldots (3)$$

Даючи α всі можливі вартості, ми одержимо рівняння всіх прямових до даної кривої (1).

Очевидно, що рівняння (3) є деякою функцією x, y і довільного змінника α, а через те ми можемо йому дати вигляд: $F(x, y, \alpha) = 0$. Це є рівняння родини прямових до даної кривої.

Далі, щоб знайти рівняння огортальної і цієї родини прямових (3) ми до рівняння (1) приєднуємо ще приємне рівняння вигляду $F_\alpha(x, y, \alpha)$, а саме [беручи похідну через α від рівняння (3)] письмо:

$$-1 + [y - f(\alpha)] f''(\alpha) - f'^2(\alpha) = 0 \quad \ldots\ldots (4)$$

Очевидно, що коли з рівнянь (3) і (4) вилучити змінник α, то одержимо рівняння огортальної. Але коли ми з тих самих рівнянь (3) і (4) вилучимо вартості x і y (через α), то матимемо точки перетину огортальної з окремими прямовими з їх родини, себто ті приємні точки. Отже, вибираючи y з рівняння (4) і вставляючи його потім в рівняння (3), матимемо:

$$y = f(\alpha) + \frac{1 + f'(\alpha)}{f''(\alpha)}$$

$$x = \alpha - f'(\alpha) \frac{1 + f'^2(\alpha)}{f''(\alpha)}$$

Це є, як ми зазначали, значники приємних точок родини даних прямових до кривої $y = f(x)$, але разом з тим, (див. взір 48), це є значники

центрів кривини тієї же кривої. Отже, огортальна прямових до кривої $y=f(x)$, себто геометричний осередок прилеглих точок їх, буде одночасно й геометричним осередком центрів кривини тієї же самої кривої $y=f(x)$, себто її еволютою.

Вправа. Центр кривини конечної кривої є межовим положенням перетину перетину двох безмежно-близьких прямових її (їх прилеглого точкою!

§27. Родина кривих від кількох незалежників.

I. Розглянемо попередньо родину кривих, залежну від 2^x яких довільних змінників α і β.

Хай, напр., родина кривих визначається рівнянням:

$$F(x, y, \alpha, \beta) = 0 \quad \cdots\cdots (a)$$

де змінники α і β звязано рівнянням:

$$\varphi(\alpha, \beta) = 0 \quad \cdots\cdots (б)$$

Очевидно, що рівняння (б) дає змогу визначити β, як функцію α, себто:

$$\beta = \psi(\alpha)$$

Тоді:

$$F[x, y, \alpha, \psi(\alpha)] = 0$$

або:

$$\Phi(x, y, \alpha) = 0$$

Ми приходимо до випадку одного змінника, а тому огортальна визначиться як вилід вилу-

, α з рівнянь:

$$\Phi(x, y, \alpha) = 0$$

і $$\Phi'_\alpha(x, y, \alpha) = 0$$

Ясна річ, що Φ'_α можна трактувати як:

$$F'_\alpha(x, y, \alpha, \beta) = 0 \quad \text{де } \beta = \psi(\alpha)$$

А через те:

$$\Phi'_\alpha(x, y, \alpha) = F'_\alpha(x, y, \alpha, \beta)_{\beta=\psi(\alpha)} = F'_\alpha(x, y, \alpha, \beta) + F'_\beta(x, y, \alpha, \beta)\frac{d\beta}{d\alpha} = 0$$

Щоб знайти вартість $\frac{d\beta}{d\alpha}$ диференціюємо рівняння (δ) і маємо:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} + \frac{\partial \varphi}{\partial \beta} \cdot \frac{d\beta}{d\alpha} = 0$$

або:

$$\frac{d\beta}{d\alpha} = -\frac{\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha}}{\frac{\partial \varphi}{\partial \beta}}$$

Отже, ми маємо систему:

$$\left.\begin{array}{ll} 1) & F(x, y, \alpha, \beta) = 0 \\ 2) & \varphi(\alpha, \beta) = 0 \\ 3) & F'_\alpha(x, y, \alpha, \beta)\frac{\partial \varphi}{\partial \beta} - F'_\beta(x, y, \alpha, \beta)\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} = 0 \end{array}\right\} \cdots (53)$$

Виключення з цих рівнянь α і β дає нам рівняння огортальної.

<u>Приклад 1.</u> Знайти огортальну сім'ї, визначеної рівнянням:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

де α і β є довільно змінними величинами зв'язаними умовою: $\alpha + \beta = \varkappa (const)$

Отже, наша задача є знайти огортаючу еліпс зі змінними осями, що сума їх величин стала. Щоб скласти рівняння (3) системи (53) беремо:

$$F'_\alpha = -\frac{2x^2}{\alpha^3} \; ; \qquad F'_\beta = -\frac{2y^2}{\beta^3} \; .$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} = 1 \; ; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \beta} = 1$$

і тому маємо систему:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

$$\alpha + \beta = \kappa$$

$$\frac{x^2}{\alpha^3} - \frac{y^2}{\beta^3} = 0$$

З останнього рівняння системи ми маємо пропорцію:

$$\frac{x^2}{\alpha^3} : \alpha = \frac{y^2}{\beta^3} : \beta$$

і складаємо з неї таку похідну:

$$\left(\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2}\right) : (\alpha + \beta) = \frac{x^2}{\alpha^2} : \alpha = \frac{x^2}{\alpha^3} = \frac{y^2}{\beta^2} : \beta = \frac{y^2}{\beta^3}$$

Але $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, а $\alpha + \beta = \kappa$, тому:

$$\frac{x^2}{\alpha^3} = \frac{1}{\kappa} \; ; \quad \frac{y^2}{\beta^3} = \frac{1}{\kappa}$$

Звідси:

$$\alpha^3 = \kappa x^2 \; ; \quad \beta^3 = \kappa y^2$$

або:

$$\alpha = (\kappa x^2)^{1/3} \; ; \quad \beta = (\kappa y^2)^{1/3}$$

Додаючи останні рівності одна до одної, і беручи на увагу, що $\alpha + \beta = \kappa$, маємо:

$$(\kappa x^2)^{1/3} + (\kappa y^2)^{1/3} = \kappa$$

або:

$$x^{2/3} + y^{2/3} = k^{2/3} \quad \ldots\ldots (54)$$

що уявляє циклоїду з 4-ма вістрями. (рис. 51)




Рис. 51

Задача. Довести, що ту саму огинальну лінію родина прямих: $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$, коли змінники α і β є кінцями гіпотенузи прямокутного Δ-ка зі сталою протилежною, себто $\alpha^2 + \beta^2 = k^2$.

Приклад 2. Знайти огинальну прямих, що творять на осях координат відтинки сталої суми S.

Отже ми маємо рівняння прямої:

$$\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$$

де $\alpha + \beta = S$. Обчислюємо елементи 3-го рівняння:

$$F'_\alpha = -\frac{x}{\alpha^2}; \quad F'_\beta = -\frac{y}{\beta^2}; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} = 1; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \beta} = 1.$$

і одержимо систему:

$$\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1; \quad \alpha + \beta = S; \quad \frac{y}{\beta^2} - \frac{x}{\alpha^2} = 0$$




Рис. 52.

З 3-го рівняння маємо пропорцію:

$$\frac{y}{\beta} : \beta = \frac{x}{\alpha} : \alpha, \text{ а звідси: } \left(\frac{y}{\beta} + \frac{x}{\alpha}\right) : (\alpha + \beta) = \frac{x}{\alpha^2} = \frac{y}{\beta^2}, \text{ або:}$$

$$1 : S = \frac{x}{\alpha^2} = \frac{y}{\beta^2}; \quad \frac{1}{S} = \frac{x}{\alpha^2}; \quad \frac{1}{S} = \frac{y}{\beta^2}; \quad \alpha = (xS)^{1/2}; \quad \beta = (yS)^{1/2};$$

$$\alpha + \beta = S; \quad (xS)^{1/2} + (yS)^{1/2} = S^1$$

або:

$$x^{1/2} + y^{1/2} = S^{1/2}$$

Не буде нарібним, що ви вже раз одержали

осей координат (рис.52). Справді, повернемо осі координат на кут $\frac{\pi}{4}$ і перенесемо їх в точку $(\frac{s}{4}, \frac{s}{4})$. Тоді загальні вигляди перетворення будуть:

$$x = \frac{s}{4} - \xi\cos\frac{\pi}{4} - \eta\sin\frac{\pi}{4}; \quad y = \frac{s}{4} + \xi\sin\frac{\pi}{4} + \eta\cos\frac{\pi}{4}$$

де $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Звідси:

$$x = \frac{s}{4} + \frac{\xi}{2}\sqrt{2} - \frac{\eta}{2}\sqrt{2}; \quad y = \frac{s}{4} + \frac{\xi}{2}\sqrt{2} + \frac{\eta}{2}\sqrt{2}$$

або:

$$x = \frac{1}{2}\left(\frac{s}{2} - \xi\sqrt{2} - \eta\sqrt{2}\right) \quad y = \frac{1}{2}\left(\frac{s}{2} + \xi\sqrt{2} + \eta\sqrt{2}\right)$$

Вставляючи ці вирази в рівняння $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = s^{\frac{1}{2}}$, маємо:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{s}{2} + \xi\sqrt{2} - \eta\sqrt{2}\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{s}{2} + \xi\sqrt{2} + \eta\sqrt{2}\right)^{\frac{1}{2}} = s^{\frac{1}{2}}$$

або:

$$\left(\frac{s}{2} + \xi\sqrt{2} - \eta\sqrt{2}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{s}{2} + \xi\sqrt{2} + \eta\sqrt{2}\right)^{\frac{1}{2}} = (2s)^{\frac{1}{2}}$$

Останнє рівняння відносно до квадрату й одержимо:

$$s = 2\xi\sqrt{2} + 2\sqrt{\frac{s^2}{4} + s\xi\sqrt{2} + 2\xi^2 - 2\eta^2} = 2s$$

або:

$$\sqrt{\frac{s^2}{4} + s\xi\sqrt{2} + 2\xi^2 - 2\eta^2} = \frac{s}{2} - \xi\sqrt{2}$$

Відносно ще раз до квадрату й маємо:

$$\frac{s^2}{4} + s\xi\sqrt{2} + 2\xi^2 - 2\eta^2 = \frac{s^2}{4} - s\xi\sqrt{2} + 2\xi^2$$

або звідси:

$$\eta^2 = s\xi\sqrt{2}$$

або:

$$\eta^2 = 2p\xi \quad \text{де } 2p = s\sqrt{2}$$

Це, як бачимо, є рівняння параболи.

Приклад 3. Знайти ортогональну траєкторію, що має центр в початку координатних осей, а осі їх лежать на осях координат. Поле не всіх цих ліній є величина стала.

Отже маємо рівняння родини: $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ (1)
де α і β є довільні змінні зв'язані умовою:

$$\pi\alpha\beta = S \text{ або: } \alpha\beta = \kappa \text{ (2)} \quad \text{де } \kappa = \frac{S}{\pi}$$

Залишається, щоб виключити одну із змінних через другий, ми можемо продиференціювати обидва дані рівняння через ці змінні й матимемо:

$$1)\ \frac{x^2 d\alpha}{\alpha^3} + \frac{y^2 d\beta}{\beta^3} = 0; \quad \text{або } \frac{x^2 d\alpha}{\alpha^3} = -\frac{y^2 d\beta}{\beta^3}$$

$$2)\ \beta d\alpha + \alpha d\beta = 0 \quad \text{або} \quad \beta d\alpha = -\alpha d\beta$$

Ділячи одне рівняння на друге, маємо:

$$\frac{x^2}{\alpha^2\beta} = \frac{y^2}{\alpha\beta^2} \text{ або скорочуючи на } \alpha\beta: \ \frac{x^2}{\alpha^2} = \frac{y^2}{\beta^2}$$

Тому робимо вставку для вартостей у рівняння (1), маємо:

$$\frac{2x^2}{\alpha^2} = 1; \ \frac{x^2}{\alpha^2} = \frac{1}{2}; \ \alpha = \pm x\sqrt{2}$$

$$\frac{2y^2}{\beta^2} = 1; \ \frac{y^2}{\beta^2} = \frac{1}{2}; \ \beta = \pm y\sqrt{2}$$




Рис. 53

Тепер вставляючи вартості α і β у рівняння (2) одержимо:

$$xy = \pm\frac{\kappa}{2}$$

рівняння здружених прямокутних гіпербол, віднесених до осей координат, як асимптот (рис. 53).

II. Очевидно, тут самим методом виключаючи, ми родину кривих визначаються рівняннями:

$$F(x, y, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \ldots \alpha_n) = 0$$

де $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \ldots \alpha_n$ – є n змінних, зв'язаних $n-1$ рівняннями.

Мозі математичної системи:

1) Рівняння родини кривих: $F = 0$

2) $n-1$ рівняння лише з параметрами

і 3) Рівняння вигляду:

$$F'_{a_1} + F'_{a_2}\frac{da_2}{da_1} + F'_{a_3}\frac{da_3}{da_1} + \dots = 0$$

де $\frac{da_2}{da_1}$ і $\frac{da_3}{da_1}$ і т. д. визначаються із системи рівнянь 2) шляхом їх диференціювання. Отже маємо $n+1$ рівнянь для знаходження n параметрів $a_1, a_2, a_3 \dots$

§28. Дотичні кривих.

Хай на деякій множині задано дві криві L_1 і L_2. Означимо змінні координати точок першої кривої L_1 через x, y, а другої кривої L_2 через ξ, η. Мозі рівняння цих кривих матимуть такий вигляд:

$$y = f(x) \; ; \quad \eta = \varphi(\xi) \quad \dots\dots (a)$$

Припустимо, що ці дві криві мають якусь спільну точку M_0. Мозі координати її будуть

$$x_0 = \xi_0 \quad \text{і} \quad y_0 = \eta_0$$

Розглянемо, як близько одна до одної лежать ці криві біля точки M_0 (рис. 54). Візьмімо на кривій L_1 безконечно-близьку точку до M_0, напр., $M'[x_0+h, f(x_0+h)]$ де h прямує до нуля. Аналогічно на кривій L_2 маємо точку $M''[\xi_0+h, \varphi(\xi_0+h)]$ або $M''[(x_0+h), \varphi(x_0+h)]$. Віддалення між цими кривими в точках M' і M'' визначається відтинком: $\Delta = M'M''$




Рис. 54

тобто:

$$\Delta = f(x_0+h) - \varphi(x_0+h)$$

За взором Тейлора маємо:

1) $f(x_0+h) = f(x_0) + h f'(x_0) + \frac{h^2}{1.2} f''(x_0) + \dots \frac{h^n}{n!} f^n(x_0+\Theta h)$

2) $\varphi(x_0+h) = \varphi(x_0) + h\varphi'(x_0) + \frac{h^2}{1.2.} \varphi''(x_0) + \dots \frac{h^n}{n!} \varphi^n(x_0+\Theta h)$

де $f(x_0) = \varphi(x_0)$, бо $\eta_0 = y_0$

Звідси:

$$\Delta = h\left[f'(x_0) - \varphi'(x_0)\right] + \frac{h^2}{2!}\left[f''(x_0) - \varphi''(x_0)\right] + \dots + \frac{h^n}{n!}\left[f^n(x_0+\Theta h) - \varphi^n(x_0+\Theta h)\right] \dots (\delta)$$


Очевидно, що з цих виразів буде спадати h, що входить в цю різницю, тим більше будуть лежати криві одна до одної.

1) Припустимо, що взагалі:

$$f'(x_0) \neq \varphi'(x_0)$$

Тоді до цих кривих в точці M можна провести дві окремі дотичні, себто ці криві перетинаються (рис. 55)

Рис. 55



Кажуть:

Ці криві мають дотикання нульового порядку.

2) Коли б:

$$f'(x_0) = \varphi'(x_0)$$

себто:

$$\Delta = \frac{h^2}{2!}\left[f''(x_0) - \varphi''(x_0)\right] + \dots$$

то ці криві мали б спільну дотичну в точці M_0, бо кутові коефіцієнти цих дотичних $f'(x_0)$ і $\varphi'(x_0)$ - є рівні. Ці криві дотикаються б в точці M_0. (рис. 56) Це зветься дотикання 1го порядку.




Рис. 56

3) Припустимо тепер, що:

$$f'(x_0) = \varphi'(x_0) \text{ і } f''(x_0) = \varphi''(x_0) \text{ але } f'''(x_0) \neq \varphi'''(x_0)$$

Тоді:

$$\Delta = \frac{h^3}{3!}\left[f'''(x_0) - \varphi'''(x_0)\right] + \dots$$

Це є дотикання 2го порядку.

Загалом, коли k-ті похідні від рівнянь першої і другої кривої для значень даної точки є рівні між собою, а $(k+1)^{\text{ші}}$ похідні не рівні, себто коли:

$$\Delta = \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}\left[f^{(k+1)}(x_0) - \varphi^{(k+1)}(x_0)\right] + \dots$$

то криві мають в даній точці дотикання $k^{\text{го}}$ порядку.

§29. Геометричне трактування питання про дотикальність кривих.

Визначення.

Коли дві якісь-небудь криві мають спільну точку, що через неї можна провести спільну до обох кривих дотичну, то загалом кажуть, що ці криві дотикаються.

[Цим визначенням виключається хвилястий перетин кривих (дві дотичних), що ми назвали дотиканням нульового порядку].

Існування спільної дотичної загалом покажуть, що точка M є складного, а саме: геометричне положення якої не менше 2^k точок. Справді, через одиноку точку можна провести безліч простих. Коли же через дану спільну точку кривих можна провести лише одну просту дотичну до них, то може існувати хоча б без-

нескінченно-малий відтинок простої, себто хоч дві точки, які зазнають напруги зламаї з цим відтинком дотичної. Інакше кажучи, ми уявляємо дану точку M як сукупність 2^x безмежно-близьких точок. Щоб справдити цю умову, візьмімо дві якісь-будь криві L_1 і L_2, що мають спільну точку M (рис. 57) і поведемо через неї спільну до обох кривих дотичну MK. Цю дотичну можна розглядати, або як межове положення січної AB, коли точки A і B безмежно наближаються одна до одної, або як межове положення січної CD при аналогічних умовах. В обох випадках точка M є злиттям точок A і B, або C і D, або точніш M є сукупністю двох безмежно-близьких точок перетину січної з кривої, що простують до цілковитого злиття. Коли припустимо, що точки A' і B' є ці безмежно близькі точки, що утворюють M, то відтинок A'B', що є фактично частиною дотичної MK буде цілком визначений з напруги (як проста поміж двох точок), а тому й сама дотична MK буде цілковито визначеною. Це й є доторкання першого порядку




Рис. 57

Розглянемо тепер доторкання $2^{го}$ порядку. Припустімо, що задані криві L_1 і L_2 мають принаймні близькі одна до одної спільні точки (рис. 58) A, B і C. Ми знаємо, що через кожні три точки (що не лежать на прямій) завжди можна

на повести цілком визначене коло. Коли б ці точки B і C все наближалися до A, то настав би час, коли дуги AB і AC злилися до нуля й ми одержали б точку злиття M, а коло придбало якесь певне положення і величину. Означимо через x і y біжучі координати якоїсь точки цього кола, а значки центра кола означимо через a і b, тоді рівняння цього кола матиме вигляд:




Рис. 58

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad \ldots\ldots (\alpha)$$

Означимо значки точки A через ξ і η, а значки близької до неї точки B через $\xi_1=\xi+\Delta\xi$, $\eta_1=\eta+\Delta\eta$. Аналогічно значки точки C можемо означити через: $\xi_2=\xi_1+\Delta\xi_1$ і $\eta_2=\eta_1+\Delta\eta_1$. Коли коло рівняння (α) переходить через ці точки, то ми матимемо тотожності:

$$(\xi-a)^2+(\eta-b)^2=r^2 \quad \ldots\ldots (\beta)$$

$$(\xi_1-a)^2+(\eta_1-b)^2=r^2 \quad \ldots\ldots (\gamma)$$

$$(\xi_2-a)^2+(\eta_2-b)^2=r^2 \quad \ldots\ldots (\delta)$$

Віднявши від рівняння (γ) рівняння (β), маючи на увазі що $\xi_1=\xi+\Delta\xi$, $\eta_1=\eta+\Delta\eta$, одержимо:

$$(2\xi-2a+\Delta\xi)\Delta\xi+(2\eta-2b+\Delta\eta)\Delta\eta=0$$

або поділивши всі члени на $\Delta\xi$, матимемо:

$$(2\xi-2a+\Delta\xi)+(2\eta-2b+\Delta\eta)\frac{\Delta\eta}{\Delta\xi}=0$$

Коли ж точка B безмежно наближається до A, то $\Delta\xi$, а разом і $\Delta\eta$ прямують до нуля, а через те:

$$\lim_{\Delta\xi\to 0}\left[(2\xi - 2a + \Delta\xi) + (2\eta - 2b + \Delta\eta)\frac{\Delta\eta}{\Delta\xi}\right]$$

матиме вид:

$$2(\xi - a) + 2(\eta - b)\eta' = 0$$

де $\eta' = \frac{d\eta}{d\xi}$, або:

$$(\xi - a) + (\eta - b)\eta' = 0 \quad \ldots\ldots (K)$$

Це буде умовою проходження кола через точку A і безмежно-близьку до неї точку B. Таким відкинувши рівняння (γ) і рівняння (δ), беручи на увагу що $\xi_1 = \xi + \Delta\xi$; $\eta_1 = \eta + \Delta\eta$, одержимо:

$$(2\xi_1 - 2a + \Delta\xi_1)\Delta\xi_1 + (2\eta - 2b + \Delta\eta_1)\Delta\eta_1 = 0$$

або ділячи на $\Delta\xi$ і беручи границю, коли $\Delta\xi \to 0$, одержимо:

$$(\xi_1 - a) + (\eta_1 - b)\eta_1' = 0 \quad \ldots\ldots (\lambda)$$

де $\eta_1' = \frac{d\eta_1}{d\xi_1}$. Рівняння (λ) є умовою проходження кола через точки A і C, коли C безмежно наближається до A. Очевидно, що рівняння (K) і (λ) разом є умовою проходження даного кола через всі три безмежно близькі точки A, B і C.

Перетворимо цю умову й для того з рівняння (λ) відніймемо рівняння (K) і після поділу на $\Delta\xi$ маємо:

$$1 + (\eta - b)\frac{f'(\xi + \Delta\xi) - f'(\xi)}{\Delta\xi} + \frac{\Delta\eta}{\Delta\xi}f'(\xi + \Delta\xi) = 0$$

де ξ_1 ми замінили через $\xi + \Delta\xi$. Коли $\Delta\xi$ прямує до

де то є знаки значення:

$$1 - (\eta - b) f''(\xi) + [f'(\xi)]^2 = 0$$

А звідси значення центру кола будуть:

$$a = \xi - f'(\xi) \frac{1 + f'(\xi)^2}{f''(\xi)}$$

$$b = \eta + \frac{1 + f'(\xi)^2}{f''(\xi)}$$

Легко бачити, що в даному разі ми одержали значення центру кривини, що відповідає b і центрові нашого кола. Таким чином можемо стверджувати, що коли дві криві мають в точці їх дотикання спільну кривину, то це точка дотикання є потрійною.

Доведемо те, що при цьому значенні справу з дотиканням 2го порядку.

Най значення заданої потрійної точки для кривої L_1 будуть x, y, а для кривої L_2 - ξ і η (рис 59) і ми знаємо що для даного випадку обидві криві мають спільну кривину. Тоді значення центру спільної кривини їх можемо написати так: 1) через значення кривої




Рис. 59

$$a = x - y' \frac{1 + y'^2}{y''} \qquad x - a = y' \frac{1 + y'^2}{y''}$$

(1) або:

$$b = y + \frac{1 + y'^2}{y''} \qquad b - y = \frac{1 + y'^2}{y''}$$

2) через значення кривої L_2:

$$a = \xi - \eta' \frac{1 + \eta'^2}{\eta''} \qquad \xi - a = \eta' \frac{1 + \eta'^2}{\eta''}$$

(2) або

$$b = \eta + \frac{1 + \eta'^2}{\eta''} \qquad b - \eta = \frac{1 + \eta'^2}{\eta''}$$

В попередній системі (1) і (2) дійсно перше рівняння набуде й такого:

$$y' = \frac{x-a}{b-y}; \quad \eta' = \frac{\xi-a}{b-\eta}$$

Але точка M є спільною для обох кривих, а тому $\xi = x$; $y = \eta$, а через те:

$$y' = \eta'$$

Далі повертаючися до рівнянь (1) і (2) маємо:

$$a = x - y'\frac{1+y'^2}{y''} = \xi - \eta'\frac{1+\eta'^2}{\eta''}$$

$$b = y - \frac{1+y'^2}{y''} = \eta - \frac{1+\eta'^2}{\eta''}$$

Коли ж для точки M: $x = \xi$, $y = \eta$ і $y' = \eta'$, то й y'' мусить бути рівним η''.

Як ми маємо $y' = \eta'$ і $y'' = \eta''$, то дотичні 2го порядку.

Тепер перейдемо до дослідження дотичних якого бажано kго порядку. Очевидно, що коли в цьому випадку означимо рівняння даних кривих:
1) $y = f(x)$ і $y = \varphi(x)$, а точки їх спільної назвемо через x_0, y_0 то матимемо:

$$f^{(k)}(x_0) = \varphi^{(k)}(x_0)$$

а ще:

$$f^{(k+1)}(x_0) \neq \varphi^{(k+1)}(x_0)$$

Точка же M буде $(k+1)^{ої}$ кратності.

Розглянемо два випадки: коли k є парне й коли k - непарне.

Ми довели, що на випадок дотичних kго порядку, маємо:

$$\Delta = \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}\left[f^{(k+1)}(x_0) - \varphi^{(k+1)}(x_0)\right] + \frac{h^{k+2}}{(k+2)!}\left[f^{(k+2)}(x_0) - \varphi^{(k+2)}(x_0)\right] + \dots$$

Очевидно, що знак Δ залежатиме від знаку лише 1-го члену правої частини, бо h є безмежно малим.

I. Коли k є числом парним, то число $(k+1)$ непарне і тому ступінь h^{k+1} буде змінювати знак в залежності від зміни знаку самого h. Разом з тим буде змінювати знак і Δ. Це свідчить (рис 60) що коли крива L_1 з одного боку точки M лежить ближче до осі x-ів ніж крива L_2, то з другого боку вісі от точки M - навпаки. Ми переконуємось, що дотичні криві в точці дотикання перетинаються.




Рис. 60



Рис 61

II. Коли k є числом непарним, то $(k+1)$ буде парним через те, незалежно від знаку h ступінь h^{k+1} буде додатнього, а тому Δ знаку не змінюватиме з якого боку M не лежатиме точка M'. Це свідчить (рис 62) що крива L_2 з обох боків точки M лежить ближче до осі x-ів ніж крива L_1. Ми переконуємось, що дотичні криві в точці дотикання є дотичними одна до одної.




Рис. 62

Умовимося казати:

1) випадок, коли найвищий порядок рівних нулю похідних є парним - дотик парного 1го роду.

і 2) випадок, коли найвищий порядок рівних нулю похідних є парним - дотикання 2го роду.

Очевидно, що дотикання 1го роду є власним дотиканням кривих, а дотикання 2го роду перехрещенням кривих в якій будь точці, що лежить на спільній їй дотичній.

§30. Дотикальні криві.

Коли нам дається родина кривих, визначена рівнянням:

$$y = \varphi(x, a_1, a_2, a_3 \ldots a_n) \ldots (I)$$

і дасть нам крива, що належить до цієї родини й визначається рівнянням:

$$y = f(x) \ldots (II)$$

то умовимося називати:

Дотикальною до даної кривої (II) ту криву з даної родини (I), що матиме з нею дотикання можливо найвищого порядку.

Ми в попередніх §§ довели, що умовою дотикання кривої:

$$y = \varphi(x, a_1, a_2, a_3, \ldots a_n)$$

(де $a_1, a_2, a_3 \ldots a_n$ є певно вибрані сталі величини.) з кривою $y = f(x)$ якого будь $k^{го}$ порядку є рівність її перших похідних вигляду:

$$\text{III)}\quad \begin{cases} y'(x_0) = \varphi'(x_0, a_1, a_2, a_3 \dots a_n) \\ y''(x_0) = \varphi''(x_0, a_1, a_2, a_3 \dots a_n) \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ y^{(k)}(x_0) = \varphi^{(k)}(x_0, a_1, a_2, a_3 \dots a_n) \end{cases}$$

(де x_0 значить точки дотикання)

Поставимо тепер задання протилежного характеру, а саме знайти лінії кривими родини (I) ту криву, що має з даною (II) дотикання $k^{го}$ порядку. Очевидно, що задача зводиться до визначення з системи (III) величостей змінників $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$ або шляхом до вилучення їх з рівняння (I) за допомогою вищезгаданої системи. Ми до системи (III) зможемо додати ще одно рівняння, а саме

$$y(x_0) = \varphi(x_0, a_1, a_2, a_3 \dots a_n) \quad \dots \text{(IV)}$$

й тепер маємо достатньо $k+1$ рівняння з n змінними. Очевидно, що коли $k < n-1$, то задача є неозначеною й у виразі вилучення змінників $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$ з рівняння (I) ми одержимо нову родину кривих, залежних від $n-k-1$ змінника, що задовольняють вимогам задачі. І лише в тому єдиному випадку коли $k = n-1$ ми матимемо лише одну (або кілько, залежно від числа розв'язків) цілком визначену криву з родини, що буде дотикальною до даної. Кривих же, щоб мали б дотикання до даної кривої вищє ніж $(n-1)$ порядку не може бути, бо тоді мали б систему з більшим числом рівнянь ніж самих змінних а тому загалом не спільно-розв'язну. Правда,

ми можемо не задовольняти певної точки дотикання $M(x_0, y_0)$, себто її шукати і тоді в системі (III) і (IV) мали б ще одно зайве x_0 і всіх зайвих тоді було б $n+1$; очевидно, це створило необхідність додати до даних:

$$f(x_0) = \varphi(x_0)$$
$$f'(x_0) = \varphi'(x_0)$$
$$\dots\dots\dots\dots\dots$$
$$f^{(n-1)}(x_0) = \varphi^{(n-1)}(x_0)$$

ще одно рівняння: $f^{(n)}(x_0) = \varphi^{(n)}(x_0)$ і з них ми найшли б точку (вартість x_0) в якій би до кривої (II) було дотикання вже $n^{го}$ порядку. Але це була б одна (або кілька, залежно від числа розв'язків) точка, що мала б цю властивість. Ці точки будемо звати особливими.

Таким чином, найвищим порядком дотикання, що матимуть криві з родини (I) і заданою кривою (II) може бути $(n-1)^{ий}$ (на одиницю нижчий числа зайвих, від яких залежить родина). Одна крива з цієї родини, що матиме заданий найвищого порядку дотикання до даної прості і зветься дотичною до неї

Приклад. З даної родини прямих $y = ax + b$ залежної від $2^{ох}$ незалежних a, b, знайти дотичну до кривої $y = f(x)$

Означимо точку дотикання $M(x_0 y_0)$. Тоді ми маємо два зайвих і тому можливе лише дотикання $1^{го}$ порядку. Складаємо систему:

$ax_0+b=f(x_0)$ або: $ax_0+b=y_0$

$(ax_0+b)'=a=f'(x_0)$ або: $f'(x_0)=y_0'$.

Отже маємо систему:

$$ax_0+b=y_0$$

$$a=y_0'$$

Звідси: 1) $a=y_0'$; 2) $b=y_0-x_0y_0'$

Вставляючи ці величини в рівняння родини прямих, одержимо:

$$y=xy_0'+y_0-x_0y_0'$$

або:

$$(y-y_0)=y_0'(x-x_0)$$

Це є відоме рівняння дотичної в точці $M(x_0,y_0)$

Таким чином, кожна пряма дотична до даної кривої є її дотичною.

§31. Дотичальне коло.

Розв'яжемо задачу: Із родини кол: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ знайти коло дотичальне до даної кривої $y=f(x)$.

Ми маємо знайти $a, b, i=$, тому найвищий можливий порядок дотичання є другий. Отже, опишемо точку дотику через $M(x_0,y_0)$ і складаємо систему:

$$1)\ \varphi(x_0)=y_0$$

або, виписавши з $\varphi(x)=(x-a)^2+(y-b)^2-r^2$, знайдемо y:

$$(y-b)^2=-(x-a)^2+r^2;\qquad y=b+\sqrt{r^2-(x-a)^2}$$

маємо:

$$b+\sqrt{r^2-(x_0-a)^2}=f(x_0)=y_0$$

або:

$$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2=r^2$$

(зрозуміло одержимо: коли $x=x_0$, то й $y=y_0$)

2) $\varphi'(x_0) = y'_0$

Визначимо y' і дорівнюємо її вартість до y'_0:

$(x-a) + (y-b)y' = 0$; $y' = -\frac{x-a}{y-b}$; $\frac{x_0-a}{y_0-b} = y'_0$ себто:

$$(x_0-a) + (y_0-b)y'_0 = 0$$

і 3) $\varphi''(x_0) = y''_0$

маємо

$$1 + (y'_0)^2 + (y_0-b)y''_0 = 0$$

А звідси, вилучивши a і b знайдемо:

$$r = \frac{(1+y'^2_0)^{3/2}}{y''_0}$$ вартість кола кривини.

Таким чином, дотичне коло є колом кривини. Це є дотикання другого порядку й тому дотичне коло перерецувати дану криву.

Доведемо тепер, що дотичне коло в точках максимум і мінімум кривини кривої мають дотикання 3го порядку (себто буде доминати кривої, а не перерецувати (рис 63)

Хай рівняння кривої буде:

$$y = f(x) \quad (\alpha)$$

а кола:

$$y = \varphi(x) \quad (\beta)$$




Рис 63.

Отже ми довели умови дотикання кола з точці $M(x_0, y_0)$

$$f(x_0) = \varphi(x_0)$$
$$f'(x_0) = \varphi'(x_0)$$
$$f''(x_0) = \varphi''(x_0)$$

Щоб дотичність була 3-го порядку необхідно також щоб:

$$f'''(x_0) = \varphi'''(x_0)$$

Доведемо, що це буде лише тоді, коли крива (d) матиме максимум або мінімум кривини в даній точці $M(x_0, y_0)$

Як знаємо, що кривина кривої має вигляд:

$$\frac{1}{r} = \frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

Умовою, щоб дана крива мала максимум або мінімум є рівність з нулем її першої похідної через x, себто:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{r}\right) = 0$$

Отже має бути:

$$\frac{(1+y'^2)^{3/2} y''' - \frac{3}{2}(1+y'^2)^{1/2} \cdot 2y'y''}{(1+y'^2)^3} = 0$$

або:

$$\frac{(1+y'^2)y''' - 3y'y''}{(1+y'^2)^{5/2}} = 0$$

А звідси:

$$(1+y'^2)y''' - 3y'y'' = 0 \quad \cdots \quad (8)$$

Але для даної кривої:

$$y_0 = f(x_0)$$

а тому:

$$[1 + f'(x_0)^2] f'''(x_0) - 3f'(x_0)f''(x_0) = 0$$

Але з другого боку дві кривини кола $y = \varphi(x)$ як дві сталості кола є const, а тому для кожної точки і рівні для точки (x_0, y_0)

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\rho}\right) = 0$$

Отже умова (8) задовольняється для всіх можливих значностей $y = \varphi(x)$, а також і для значності $y = \varphi(x_0)$. Тому:

$$\left[1 + \varphi'(x_0)^2\right]\varphi'''(x_0) - 3\varphi'(x_0)\varphi''(x_0) = 0$$

Звідси маємо:

$$\text{I)}\quad f'''(x_0) = \frac{3f'(x_0)f''(x_0)}{\left[1 + f'(x_0)^2\right]}$$

$$\text{II)}\quad \varphi'''(x_0) = \frac{3\varphi'(x_0)\varphi''(x_0)}{\left[1 + \varphi'(x_0)^2\right]}$$

Але $\varphi'(x_0) = f'(x_0)$; $\varphi''(x_0) = f''(x_0)$; тому: $\varphi'''(x_0) = f'''(x_0)$

§32. Асимптоти кривої.

I. Коли дана крива й пряма такі, що відстань між ними, що поміри віддалення якої будь точки кривої на безмежність, сама пряма безмежно наближається до неї, то ця пряма зветься асимптотою кривої.

II Означення: Асимптотою до кривої називають межове положення дотичної, точка дотику якої віддаляється на безмежність (від початку взятої системи координат)

III Асимптоту можна також розглядати і як межове положення січної (для алгебричних кривих) в яке вона приходить тоді, коли дві точки перетину цієї січної з даною кривою віддаляються на безмежність, рухаючись вздовж кривої в одному й тому самому напрямі.

В цілому дослідах ми ставимо умовою, що

асимптота, якщо з кривою якусь безмежна далеку точку в той час проходить, щодо координатних осей на обмеженому віддаленні від початку їх, а тому творить на осях координат або:

1) обидва обмежені відтинки, коли ця асимптота похила до осей координат (рис. 64), або




Рис. 64

2) один обмежений відтинок, коли ця асимптота паралельна до однієї з осей координат (рис. 65)




Рис. 65

Отже: Розглядаючи асимптоту як лінійове положення дотичної в точці $M_1(x_1, y_1)$ (коли ця точка віддаляється на безмежність) ми зможемо:

1) Взяти за рівняння асимптоти:

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1 \quad \cdots \quad (1)$$

як простої, що творить відтинки p і q на осях координат. Коли ми за допомогою рівняння кривої зможемо обчислити ці вартості p і q, то положення асимптоти буде визначене, або

2) Взявши за рівняння асимптоти загальне рівняння прямої

$$y = mx + n \quad \cdots \quad (2)$$

також обчислити при цих умовах вартості m (кутового зміщення дотичної) і n відтинку на осі y-ів.

Хай рівняння кривої буде:

$$y = f(x)$$

а точка дотику x, y. Моді дотична в цій точці матиме вигляд:

$$(Y - y) = \frac{dy}{dx}(X - x) \quad \text{- - - - (3)}$$

Обчислимо її відтинки на осях:

1) На осі x-ів: Беремо $Y = 0$, моді:

$$X = p_1 = x - y\frac{dx}{dy}$$

2) На осі y-ів: Беремо $X = 0$, моді.

$$Y = q_1 = y - x\frac{dy}{dx}$$

I Випадок. Асимптота не рівнобіжна до осей координат.

Моді $x \ldots \infty$; $y \ldots \infty$ і відтинки, що утворяться асимптота на осях будуть:

$$p = \lim_{\substack{x \ldots \infty \\ y \ldots \infty}} p_1 = \lim_{\substack{x \ldots \infty \\ y \ldots \infty}} \left(x - y\frac{dx}{dy}\right) = k$$

$$q = \lim_{\substack{x \ldots \infty \\ y \ldots \infty}} q_1 = \lim_{\substack{x \ldots \infty \\ y \ldots \infty}} \left(y - x\frac{dy}{dx}\right) = l$$

} Коли k і l мають скінчені значення, тоді асимптота існує.

Вставляючи знайдені величини k і l в рівняння (1) матимемо асимптоту:

$$\frac{x}{k} + \frac{y}{l} = 1.$$

Приклад. Дано гіперболу:

$$-b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

Звідси:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2x}{a^2y} \quad \text{або} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{a^2y}{b^2x}$$

$$\left(\text{бо } \frac{dy}{dx} = y' = \frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dx}{dx}}\right)$$

Тому: $p_1 = x - y\frac{a^2y}{b^2x} = \frac{b^2x^2 - a^2y^2}{b^2x} = \frac{a^2b^2}{b^2x} = \frac{a^2}{x}$

$$q_1 = y - x\frac{b^2x}{a^2y} = \frac{a^2y^2 - b^2x^2}{a^2y} = \frac{-a^2b^2}{a^2y} = -\frac{b^2}{y}$$

Коли взяти межу цих величин при $x \dots \infty$ і $y \dots \infty$, то матимемо: $p = 0$; $q = 0$ Це показує, що асимптота переходить через початок координатних осей. В цьому разі відтинкова рівняння (1) скористатися не можна і тому (і загалом) ліпше скористатися другим рівнянням (2), а саме:

$$y = mx + n$$

Відтинок $n = \lim\limits_{\substack{x \dots \infty \\ y \dots \infty}} q = \lim\limits_{\substack{x \dots \infty \\ y \dots \infty}} \left(y - x\frac{dy}{dx}\right)$, а відтинок m є межею величини кутового коефіцієнта дотичної (3), себто:

$$m = \lim \frac{dy}{dx}$$

Обчислимо його для нашої задачі:

$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2x}{a^2y}$, але $y = \pm b\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} = \pm b\sqrt{\frac{x^2 - a^2}{a^2}} = \pm \frac{bx}{a}\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}$

А тому:

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}}$$

Звідси:

$$\lim_{x \dots \infty} \frac{dy}{dx} = \pm \frac{b}{a}$$

Як довели вище $n = \lim q = 0$. Тепер шукане рівняння асимптоти:

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

З цих міркувань ми можемо дати висновки:

1) Конечного числового існування асимптоти до кривої $y = f(x)$; перпендикулярної до координатних осей, є обмежені вартості лівих виразів:

$$1)\ \lim_{x \to \infty}\left(y - x\frac{dy}{dx}\right) = \lim_{x \to \infty}\left[f(x) - x f'(x)\right]$$

(A)

$$2)\ \lim_{x \to \infty}\frac{dy}{dx}$$

[Першу умову, коли вимагати буде вістря-ки відпадає, бо вона цілковито заступається другою, тим більш, що для обмеження вартості відрізку p перед тим лише треба мати межу першої похідної.]

Розглянемо ще одно спрощення. Ми бачимо, що на випадок існування асимптоти до кривої $y=f(x)$ рівність [A(1)] має простувати до обмеженої вартості, приблизно n. Тому ми, наближаючись до цієї межі маємо рівність:

$$y - x\frac{dy}{dx} = n + \varepsilon$$

де ε прямує до нуля. Звідси поділивши обидві частини на x, маємо:

$$\frac{y}{x} - \frac{dy}{dx} = \frac{n+\varepsilon}{x}$$

Коли тепер взяти межу цього виразу, то матимемо:

$$\lim_{x \to \infty}\frac{y}{x} - \lim\frac{dy}{dx} = 0$$

(бо $n - $ обмежена величина, а $x \to \infty$.)

Звідси:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{dy}{dx}=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}$$

Ця границя показує, що відшукання другої границі $\lim_{x\to\infty}\frac{dy}{dx}$ завжди можна замінити відшуканням границі:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}$$

II Випадок. Асимптоти рівнобіжні до осей координат.

а) Коли асимптота рівнобіжна до осі x-ів, то очевидно, що в границі (A) вартість:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{dy}{dx}=0$$

і тоді наша границя рівняння асимптоти матиме вигляд:

$$y=n$$

де $n=\lim_{x\to\infty}[f(x)-xf'(x)]$

б) Коли асимптота рівнобіжна до осі y-ків, то очевидно, що в границі (A) вартість $\lim_{x\to\infty}\frac{dy}{dx}$ не має обмеженої границі, тоді нам треба буде рівняння асимптоти виражати через x, себто:

$$x=ky+l$$

В такому разі дотична, межовим положенням якої є дана асимптота, матиме рівняння:

$$X=(Y-y)\frac{dx}{dy}+x$$

[а справа: з рівняння $(Y-y)=\frac{dy}{dx}(X-x)$ маємо: $Ydx-ydx=Xdy-xdy$, а звідси:

$$X=\frac{Ydx-ydx+xdy}{dy}=\left[(Y-y)\frac{dx}{dy}+x\right]$$

З цього рівняння шляхом попередніх міркувань, одержимо:

$$1)\ \lim_{y\to\infty}\left(x - y\frac{dx}{dy}\right) = l$$

$$2)\ \lim_{y\to\infty}\frac{dx}{dy} = k$$

де l і k є обмеженні величини. У випадку асимптоти не $\parallel$ до осі y-ів $k \neq 0$, а коли асимптота є $\parallel$ до осі y-ів, то $k=0$ і ми маємо

$$x = l.$$

§33. Розглянемо ще випадок, коли рівняння кривої дано в параметровій формі:

$$x = \varphi(t)$$

$$y = \psi(t)$$

і припустимо, що коли вартість t наближається до якої будь певної вартости t_0 (в границях $-\infty \dots +\infty$) то вартости y і x, або одночасно, або хочаби одна з них наближається до ∞ (себто, крива має безмежно-далеку точку).

Очевидно, що при умові $\lim_{t\to t_0}\varphi(t) = \infty$ і $\lim_{t\to t_0}\psi(t) = \infty$ в разі існування асимптоти має бути обмежена вартість межі:

$$\lim_{t\to t_0}\frac{dy}{dx} = \lim_{t\to t_0}\frac{y}{x} = \lim_{t\to t_0}\frac{\psi(t)}{\varphi(t)} = m$$

(кутовий коефіцієнт асимптоти).

Коли відомо на кривій яку-будь точку x, y то рівняння дотичної в ній буде:

$$Y - y = (X - x)\frac{dy}{dx}$$

або:

$$y - y_\Delta = (x - x_\Delta)\frac{y'_\Delta}{x'_\Delta}$$

а звідси:

$$y'_\Delta x - x'_\Delta y = x_\Delta y' - x' y_\Delta \quad \cdots\cdots (\alpha)$$

Коли величина t буде наближатися до даної t_0, то точка дотику шуканої дотичної буде простувати на безконечність і при $t = t_0$, ця дотична стане асимптотою. Отже, щоб мала асимптота існувала, необхідно, щоб лінійні вартості коефіцієнтів її рівняння: y'_Δ, $-x'_\Delta$, і $(x_\Delta y' - x' y_\Delta)$ при $t = t_0$ були обмеженими величинами. Доведемо, щоб відношення:

$$y'_\Delta : (-x'_\Delta) : (x_\Delta y' - x' y_\Delta)$$

простувало при тім же умові до певної межі. Тоді рівняння (α) виражатиме потрібну асимптоту.

Розглянемо звичайний для нього випадок приклад, а саме гіперболічну спіраль. Як відомо її рівняння буде:

$$r = \frac{a}{\varphi}$$

Перейдемо від цього рівняння до рівняння в декартових координатах за допомогою взорів перетворення:

$$x = r\cos\varphi \qquad y = r\sin\varphi$$

а саме, вставляючи в них з рівняння спіралі вартість r матимемо шукані залежникові рівняння спіралі:

$$x = \frac{a\cos\varphi}{\varphi} \quad ; \quad y = \frac{a\sin\varphi}{\varphi}$$

де залежною є φ.

Очевидно, що коли φ наближається до нуля величини x і y зростають до безмежності. Отже, при $\varphi=0$ гіперболічна спіраль має безмежно далеку точку. Дотична до цієї кривої матиме вигляд:

$$xy' - yx' = xy' - yx'$$

Але:

$$x' = a\frac{-\varphi\sin\varphi - \cos\varphi}{\varphi^2} = -\frac{a}{\varphi^2}(\varphi\sin\varphi + \cos\varphi)$$

$$y' = \frac{a}{\varphi^2}(\varphi\cos\varphi - \sin\varphi) \quad \text{і}$$

$$xy' - x'y = \frac{a^2}{\varphi}\left(\varphi\cos^2\varphi - \sin\varphi\cos\varphi + \sin\varphi\cos\varphi + \varphi\sin^2\varphi\right) = \frac{a^2}{\varphi^2}$$

Таким чином рівняння дотичної буде:

$$(\varphi\cos\varphi - \sin\varphi)x + (\varphi\sin\varphi + \cos\varphi)y = a$$

Коли ми візьмемо $\varphi = 0$, то одержимо рівняння асимптоти:

$$y = a.$$

§34. Перейдемо тепер до <u>відшукання асимптот до кривих заданих алгебричними рівняннями в невизначеній формі:</u>

$$\underline{f(x,y) = 0 \quad \ldots \quad (1)}$$

Після спрощень таке рівняння можна розкласти в многочлен $n^{\text{го}}$ виміру (ступінь кривої), згідно зміної x або y. Напр.

$$f(x,y) = a_0y^n + a_1y^{n-1} + a_2y^{n-2} + \ldots = 0$$

де $a_0, a_1, a_2, a_3 \ldots a_n$ є функції від x.

Візьмімо якусь січну кривої, напр.

$$y = mx + p \quad \ldots \quad (2)$$

дотична матиме з кривою. Справді, розв'язуючи разом рівняння (1) і (2); вставивши з 2-го рівняння в 1-ше вартість y, ми одержимо:

$$f(x, mx+p) = 0 \quad \ldots\ldots (3)$$

Очевидно, коли змінної x це рівняння буде мати n-ю степінь, а тому дасть n розв'язків, себто існуватиме n точок перетину. На підставі висновків (III) §31 дві сіючі стане суміщеною лише тоді, коли дві з цих точок для одної й тої самої кривої будуть на безмежності (дотикання 1-го порядку). Але це є можливим, коли рівняння (3) матиме два безмежно-великих розв'язки.

Рівняння (3) як алгебричному завжди можна дати вигляд:

$$A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + A_2 x^{n-2} + \ldots A_{n-1} x + A_n = 0 \quad \ldots (4)$$

де $A_0, A_1, A_2 \ldots A_n$ є функції m і p. З алгебричної аналізи ми знаємо, що коли сотність найвищого члену рівняння наближається до нуля, то один із розв'язків рівняння прямує до ∞. Коли ж до нуля наближаються сотності обох найвищих членів, то два з розв'язків рівняння прямують до нуля і т. д. Отже, щоб рівняння (4) мало два безмежно-великих розв'язки є конечним, щоб:

$$A_0 = 0 \; ; \quad A_1 = 0$$

(А те рівняння, що залишиться, буде n-2 ступеня й дасть n-2 обмежених розв'язків). A_0 і A_1 є функції m і p, а тому можемо систему рівнянь

загалі визначимо потрібні вартості m і p.

Приклад 1. Візьмімо криву, що зветься декартовим листом (рис. 66). Її рівняння буде:

$$x^3 + y^3 = 3axy.$$




Рис. 66.

Означивши рівняння січної: $y = mx + p$ і вставляючи з нього вартість y в рівняння кривої матимемо:

$$x^3 + (mx+p)^3 = 3ax(mx+p) \quad \text{або:}$$

$$x^3 + m^3x^3 + 3m^2nx^2 + 3mn^2x + n^3 - 3amx^2 - 3anx = 0$$

звідки:

$$(1+m^3)x^3 + (3m^2n - 3am)x^2 + \ldots = 0$$

Дорівнюючи з нулем сполучники при x^3 і x^2, одержимо систему:

$$1 + m^3 = 0$$

$$3m^2n - 3an = 0$$

Тому:

$$m = -1 \text{ (одна реальна вартість)}$$

$$\text{і } n = -a$$

Таким чином рівняння асимптоти матиме вигляд:

$$y = -x - a$$

або:

$$x + y + a = 0$$

Приклад 2. Знайти асимптоту Вересіри Аньєзі, що має рівняння (рис. 67)

$$x^2y = 4a^2(2a - y)$$




Рис. 67.

Означаючи рівняння січної $y = mx + n$, після вставки з

ного вартости y в рівняння кривої маємо:

$$x^2(mx+n) = 4a^2(2a - mx - n)$$

звідки:

$$mx^3 + nx^2 = 8a^3 - 4amx - 4a^2n$$

або:

$$mx^3 + nx^2 + 4amx + 4a^2(n-2a) = 0$$

Звідки $m=0$; $n=0$. Тому рівняння асимптоти $y=0$, себто, асимптотою служить сама вісь x-ів.

Приклад 3. Дано циссоїду Діокля рівнянням (рис. 68):

$$y = \frac{x^3}{2a-x} \quad \cdots (a)$$

Знайти асимптоти.




Рис. 68

Коли ми візьмемо рівняння січної: $y = mx + n$ (б), то розв'язання системи (а) і (в) дасть рівняння $m^2+1=0$, що показує, що асимптот не рівнобіжних до осей; або рівнобіжних до осі x-ів немає.

Очевидно може виникнути думка, що існує асимптота рівнобіжна до осі y-ів. Тоді типове рівняння січної: $x = ky + p$ (в) і шукаємо реальні вартости k і p. Для цього розв'язуємо систему (а) і (в) і маємо:

$$y^2 = \frac{(ky+p)^3}{2a-ky-p} \quad \text{або:} \quad y^2 = \frac{(ky+p)^3}{(2a-p)-ky}$$

Звідки:

$$-ky^3 + (2a-p)y^2 - k^3y^3 - 3k^2py^2 - 3kp^2y - p^3 = 0$$

Зрівнюючи з нулем сполучники найвищих ступенів у одержаному системі:

$$k(k^2+1) = 0$$

$$2a - p - 3k^2 p = 0$$

Розв'язуючи цю систему, ми з 1-го рівняння маємо лише один реальний розв'язок: $k=0$, а тоді з другого рівняння одержуємо:

$$2p - p = 0 \quad \text{або} \quad p = 2a$$

Отже існує лише одна асимптота рівнобіжна до осі y-ів, що визначається рівнянням:

$$x = 2a.$$

Можна також, для визначення асимптот (не рівнобіжних до осі y-ів) ми:

1) У рівняння кривої замість y вставляємо вартість $(mx+n)$ і розкриваємо многочлен через степені x.

2) Зрівнюємо знайдені сполучники двох найстарших членів і розв'язуємо одержане при цьому рівняння як систему, знайдемо m і n;

3) Коли виявиться розв'язання є реальні й обмежені то асимптота існує і визначається рівнянням, що одержується, коли в рівність $y = mx+n$ вставити знайдені вартости m і n

[Для відшукання асимптоти, рівнобіжної до осі y-ів, пробуємо тепер, вставляючи у рівняння кривої замість x вартість $(ky+l)$]

§35. Розглянемо тепер де-які спрощення на випадок відшукання асимптот рівнобіжних до координатних осей.

Хай рівняння кривої: $f(x,y) = 0 \cdots (1)$

Розглянемо це рівняння по степенях x:

$$\varphi_0(y)x^n + \varphi_1(y)x^{n-1} + \varphi_2(y)x^{n-2} + \cdots + \varphi_{n-1}(y)x + \varphi_n(y) = 0$$

і поділимо всі члени рівняння на вищу степінь x. Тоді:

$$\varphi_0(y) + \varphi_1(y)\frac{1}{x} + \varphi_2(y)\frac{1}{x^2} + \cdots + \varphi_n(y)\frac{1}{x^n} = 0$$

Коли б для цієї кривої існувала асимптота рівнобіжна до осі x-ів, то мусіла б існувати якесь обмежена вартість y, напр. $y = a$ для якої x зростало б до ∞ (рис. 69). Тоді для цієї вартости $y = a$ будемо мати:




Рис. 69.

$$\varphi_0(a) + \varphi_1(a)\frac{1}{\infty} + \varphi_2(a)\frac{1}{\infty^2} + \cdots + \varphi_n(a)\frac{1}{\infty^n} = 0$$

а звідси:

$$\varphi_0(a) = 0$$

Це показує, що потрібна вартість (a) є розв'язком $\varphi_0(y)$, себто розв'язком співчинника при найстаршому степені x в рівнянні (1).

Аналогічно, (розглядаючи $f(x,y) = 0$ через степінчасті y і діливши всі члени рівняння на найвищий степінь y^n і т. д.) ми переконуємося, що коли існує асимптота рівнобіжна до осі y-ів, то відповідна їй обмежена вартість змінника x, буде завжди розв'язком співчинника найстаршого степеня y в рівнянні (1).

З цього маємо висновок:

Щоб знайти рівняння асимптоти:

1) рівнобіжної до осі x-ів прирівнюємо до нуля

коефіцієнта, при найвищому степені x і розв'язуємо його через y.

2) рівнобіжної до осі y-ів прирівнюємо до нуля коефіцієнта при найвищому степені y і розв'язуємо його через x.

Очевидно, що коли ці коефіцієнти або не містять відповідних змінних, або мають удавні розв'язки, то асимптот, рівнобіжних до відповідних осей координат немає. Коли ж розв'язки цих рівнянь є дійсні й різні, то в першому разі:

$$y = \alpha$$

а в другому разі:

$$x = \beta$$

є рівняннями відповідних асимптот. Коли ж одержані з коефіцієнтів рівняння є вищих степенів і дають по кілька розв'язків різних, то й асимптот існує кілька.

Приклад 1. Конч., крива:

$$y(y^2-1)x^2 - y^2(6y-1)x + 8y^3 = 0$$

має: 1) 3 асимптоти рівнобіжні до осі x-ів а саме:

$$y(y^2-1) = 0; \quad 1)\ y = 0; \quad 2)\ y-1 = 0; \quad 3)\ y+1 = 0$$

і II 2 асимптоти рівнобіжні до осі y-ів, а саме: розкладуючи рівняння по степенях y:

$$(x^2 - 6x + 8)y^3 + y^2x - yx^2 = 0$$

одержимо:

$$x^2 - 6x + 8 = 0, \text{ а звідси: } 1)\ x = 4; \quad 2)\ x = 2$$

Приклад 2. Визначити уже розширені напів-

црівняння циссоїди:

$$y^2 = \frac{x^3}{2a-x}$$

Маємо:

$$(2a-x)y^2 - x^3 = 0$$

1) Асимптоти рівнобічної до осі x-ів немає, бо сполучник при старшому степені x'а є (-1) = стала величина.

2) Асимптота не рівнобічна до осі y-ів визначається з рівняння:

$$2a - x = 0 \quad \text{або} \quad x = 2a$$

§36 Асимптоти в бігульових координатах.

Припустімо, що криву задано в бігульових координатах рівнянням: $\varphi(r, \theta) = 0$. Хай ця крива має якусь безмежно далеку точку і в ній асимптоту. Очевидно, що в цій точці зустрінуться луч-вектор цієї точки й асимптота. Зустріч їх буде на безмежному відсталенні, а тому на близькому до бігуна відсталенні і луч вектор і асимптота будуть рівнобічними (як дві прості, що перерізуються на безмежності) (рис. 70)




Рис. 70

Через бігун поведемо просту прямову до заданого луча вектора. Ця проста є вісь полів, а тому відсталення ок від бігуна до асимптоти (дотичної до кривої на безмежності) буде підготовною $\tilde{n}$. Ми умовляємося, що асимптота проходить на обмеженому відсталенні від початку координат

а тому задача підготовка полягає знайти обмежену величину (бо асимптота рівнобіжна до ρ), а підготовка прямолінійна до ρ, через те вона прямолінійна асимптоти, себто підготовка буде відстанням асимптоти від бінуса).

Ці міркування дають такий висновок:

1) Кут спаду асимптоти на бінусову вісь, як рівний орасі вектора, поведеного в безмежену точку, легко визначити з рівняння кривої, зробивши в ньому $\rho = \infty$ (себто, шукаючи ту величину θ в рівнянні кривої, що дає $\rho = \infty$)

2) Відстань асимптоти від бінуса визначається межею величини підготовки, коли в ній θ прямує до величини, визначеної в 1). Себто:

$$d = \lim_{\theta \to \alpha} S_t = \lim_{\theta \to \alpha} \rho^2 \frac{d\theta}{d\rho}$$

Або визначаючи ρ із рівняння $\varphi(\rho, \theta) = 0$, а саме: $\rho = \psi(\theta)$, маємо:

$$d = \lim_{\theta \to \alpha} [\psi(\theta)]^2 \frac{d\theta}{d\rho}$$

Примітка. Коли величина d є додатна, то асимптота лежить з правого боку якраз напрямку луча вектора, а коли d від'ємне, то з лівого

Приклад 1. Знайти асимптоти гіперболічної спіралі, рівняння: $\rho\theta = a$

Звідси:

$$\theta = \frac{a}{\rho}$$

Отже:

1) коли $\rho = \infty$; $\theta = 0$

себто асимптота рівнобіжна до бінормалі осі (або прямує до неї).

2) $\frac{d\theta}{dr} = -\frac{a}{r^2}$; а тому $\lim\limits_{\theta \to 0} r^2 \frac{d\theta}{dr} = -a$,

себто асимптота проходить з лівого боку бінормалі осі на відстані a, а саме: (див. рис. 71)




Рис. 71

Приклад 2. Знайти асимптоти кардіоїди (Listus) рівняння: $r^2\theta = a^2$

1) $\theta = \frac{a^2}{r^2}$; $r = \infty$; $\theta = 0$

Асимптота рівнобіжна до бінормалі осі (або прямує до неї).


2) $\theta = \frac{a^2}{r^2}$; $\frac{d\theta}{dr} = -\frac{2a^2}{r^3}$

$\lim\limits_{\theta \to 0} r^2 \frac{d\theta}{dr} = \lim\limits_{\theta \to 0} \left(-\frac{2a^2}{r}\right)$ але $r = \frac{a}{\theta^{1/2}}$, тому:

$$d = \lim_{\theta \to \infty} \left(-2a\theta^{1/2}\right) = 0$$

Рис. 72.

Отже асимптотою є сама бінормаль осі (рис 71)



Приклад 3. Знайти асимптоти до квадратової розети рівняння: $r = a\sin 2\theta$.

1) $\sin 2\theta = \frac{r}{a}$ кут θ, щоб луч вектор був би рівний ∞ менше ($\sin$ не може бути рівний ∞), а тому асимптот немає (рис. 73).




Рис. 73.

Приклад 4. Знайти асимптоти до циклоїди, визначеної рівнянням: $r = 2a\sin\theta\operatorname{tg}\theta$.

1) $\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta} = \frac{2a}{r}$; при $r = \infty$ $\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta} = 0$

Звідси, або $\cos\theta = 0$, або $\sin^2\theta = \infty$, але $\sin^2\theta$ не може прямувати ∞, а тому лишається $\cos\theta = 0$; $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Асимптота є пряма до бінормалі осі (себто під-дотична лежить на ній)

2) $\frac{dr}{d\theta} = 2a\underset{\sin\theta}{\cos\theta}\operatorname{tg}\theta + 2a\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = 2a\sin\theta\left(1 + \frac{1}{\cos^2\theta}\right)$

Звідси:

$$\frac{d\theta}{dr} = \frac{\cos^2\theta}{2a\sin\theta(1+\cos^2\theta)}$$

Отже:

$$d = \lim_{\theta\to\frac{\pi}{2}} r^2\frac{d\theta}{dr} = \lim_{\theta\to\frac{\pi}{2}} \frac{4a^2\sin^2\theta\operatorname{tg}^2\theta\cdot\cos^2\theta}{2a\sin\theta(1+\cos^2\theta)} = \lim_{\theta\to\frac{\pi}{2}} \frac{2a\sin^3\theta}{1+\cos^2\theta} = 2a$$

Асимптота віддалена від бінуса на $2a$ (рис 74) і прямує до бінормалі осі




Рис 74.

Приклад 5. Знайти асимптоти кохлоїди Нікомеда, що має рівняння: $r = a\sec\theta \pm b$.

1) $r = a\sec\theta \pm b$; $\sec\theta = \frac{r\mp b}{a}$

при $r = \infty$ $\sec\theta = \infty$; $\theta = \frac{\pi}{2}$

Тому асимптота прямує до бінормалі осі

2) $\frac{dr}{d\theta} = a\sec x\operatorname{tg}x$; $\frac{d\theta}{dr} = \frac{\operatorname{ctg}x}{a\sec x}$




Рис. 75

Тому:

$$\lim_{\theta\to\frac{\pi}{2}} r^2\frac{d\theta}{dr} = a(a\sec\theta \pm b)^2\frac{\operatorname{ctg}x}{a\sec x} =$$

$$\lim_{\theta\to\frac{\pi}{2}} \frac{a}{\sin x} \pm 2b\operatorname{ctg}x + \frac{b^2\operatorname{ctg}x}{a\sec x} = a$$

Асимптота віддалена від бічних на a (рис. 75).

§37. Особливі точки.

Визначення. Хай дано деяку алгебраїчну криву $f(x, y) = 0$ (рис. 76). Візьмемо на ній точку P і навколо неї опишемо коло, як завгодно малого радіуса. Звичайно таке коло перерізатиме дану криву у двох точках M і N.




Рис. 76

В ці точки перерізу з точки P поведемо промені PM і PN. Хай кут між ними буде φ. Цей кут буде звичайно тупий і чим менше буде коло, тим більше буде наближатися до π, тобто, що можна сказати, що кут φ прямує до величини π при зменшенні радіуса кола r до нуля.

Така точка, що для неї виконуються згадані умови, а саме:

1) Коли коло, як завгодно малого радіуса, описане навколо даної точки P перерізує дану криву неодмінно в двох точках і коли

2) <u>кут скривлення точок кривої</u> ($\text{кут}\varphi$) завжди прямує до величини π при зменшенні радіуса цього <u>прилеглого кола даної точки</u> до нуля зветься <u>звичайною</u> точкою.

Кожна точка для якої не виконується хоч одна із згаданих умов зветься <u>особливою.</u>

Розглянемо по черзі можливі порушення цих умов.

А) Порушення першої умови.

1) Коли прилягне коло даної точки кривої, якими би воно малим не було зустрічає цю криву в точках більш ніж двох. Така точка зветься кратною. (рис. 77).




Рис. 77.

2) Коли можна взяти прилягне коло точки кривої настільки малим, що воно зустріне цю криву лише в одній точці. Така точка точка точкового зчеплення або ущерб кривої (рис. 78)




Рис. 78

3) Коли прилягне коло даної точки можна взяти таким малим, що воно не зустріне кривої, хоч значення цієї точки й задовольняють рівняння її, себто ця точка є належною до кривої. Така точка зветься відокремленою або ізольованою (рис. 79). Далі:


Рис. 78

В) Порушення другої умови.

Крім випадку не існування зовсім лінії кут скривлення точок кривої (випадок, що ми його не будемо розглядати) можуть бути ще два випадки:

а) Кут скривлення прямує до лінії рівній з нулем.

б) Кут скривлення прямує до лінії відмінної від нуля й т.

В першому випадку:

4) Точка зветься точкою повернення або

<u>типами повороту.</u> Очевидно, що коли кут скривлення прямує до нуля по дотичній до обох гілок кривої будуть зливатися в спільну дотичну що й в останнього типу повороту. При цьому тип повороту може бути, або 1-го роду, коли гілки кривої лежать з обох боків дотичної (рис.80-а), або другого роду, коли обидві гілки лежать по одну бік дотичної (рис.80-б). В другому випадку, коли межа кута скривлення буде відмінна від 0 і π ми матимемо:

Рис.80а



Рис.80б

5) <u>Кутову точку або точку злому кривої.</u> В цьому разі через точку P переходить дві окремі дотичні до обох гілок кривої (рис.81, а, б, в) Точки 1, 3, 4 - зустрічаються переважно в алгебричних кривих, а точки 2 і 5 виключно у трансцендентних кривих.




Рис.81

§8. <u>Визначення дотичної до алгебричної кривої в даній особливій точці й дослідження останніх.</u>

Припустимо, що дана алгебрична крива виражається рівнянням $F(x,y)=0$ і припустимо, що

в процесі дослідження ця крива є тільки й лише нагідні, себто розкладається в ряд Тейлора. Візьмімо для дослідження якусь точку $M(x_1, y_1)$, що має обмежені значення (не безмежно-далеку точку) і в ній, як у початку збудуємо нові координатні осі $\xi\eta$ рівнобіжні до попередніх (рис.82). Координати цього початку будуть x_1, y_1 а тому вздовж перетворення є: $x = x_1 + \xi$ $y = y_1 + \eta$. Чим ближче буде якась точка кривої P до точки M, тим менше будуть вартості ξ і η і для точки M вони обертаються в 0, 0; таким чином ми можемо їх розглядати як певні приростання до x_1 і y_1, а тому:




Рис.82

$$F(x,y) = F(x_1+\xi,\ y_1+\eta)$$

можемо розкласти в ряд Тейлора, а саме:

$$F(x,y) = F(x_1,y_1) + \frac{\partial F}{\partial x_1}\xi + \frac{\partial F}{\partial y_1}\eta + \frac{1}{1\cdot 2}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2}\xi^2 + 2\frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial y_1}\xi\eta + \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2}\eta^2\right) +$$

$$+ \frac{1}{3!}\left(\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^3}\xi^3 + 3\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^2 \partial y_1}\xi^2\eta + 3\frac{\partial^3 F}{\partial x_1 \partial y_1^2}\xi\eta^2 + \frac{\partial^3 F}{\partial y_1^3}\eta^3\right) + \dots = 0$$

Але точка (x_1, y_1) належить до кривої, а тому $F(x_1, y_1) = 0$ і ми маємо рівняння:

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}\xi + \frac{\partial F}{\partial y_1}\eta + \frac{1}{2!}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2}\xi^2 + 2\frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial y_1}\xi\eta + \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2}\eta^2\right) +$$

$$+ \frac{1}{3!}\left(\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^3}\xi^3 + 3\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^2 \partial y_1}\xi^2\eta + 3\frac{\partial^3 F}{\partial x_1 \partial y_1^2}\xi\eta^2 + \frac{\partial^3 F}{\partial y_1^3}\eta^3\right) + \dots = 0 \quad \cdots (A)$$

Поведемо через точку M (як початок координат) пряму:

$$\eta = m\xi \quad \ldots \quad (B)$$

де m є довільний кутовий коефіцієнт. Даючи йому всі можливі величини ми одержимо всілякі січні до кривої, що проходять через точку M. Щоб знайти точку перетину цих січних з кривою, нам треба розв'язати рівняння (A) і (B) як систему і ми матимемо:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x_1} + m\frac{\partial F}{\partial y_1}\right)\xi + \frac{1}{2!}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + 2m\frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial y_1} + m^2\frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2}\right)\xi^2 +$$

$$\frac{1}{3!}\left(\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^3} + 3m\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^2 \partial y_1} + 3m^2\frac{\partial^3 F}{\partial x_1 \partial y_1^2} + m^3\frac{\partial^3 F}{\partial y_1^3}\right)\xi^3 + \ldots = 0 \quad (C)$$

Ми бачимо, що ξ входить у всі члени рівняння, а тому перший розв'язок є $\xi = 0$ [а також і рівняння (B) і $\eta = 0$], себто перша точка перетину прямої з кривою є M. Решта розв'язків ξ (а тому й η) є не рівні з нулем, себто пряма зустрічає далі криву поза точкою M.

Для того, щоб пряма (B) була дотичною до кривої, треба (зважаючи з визначення розуміння дотичної) щоб і друга яка будь точка перетину січної з кривою зливалася з M. Це можливе, коли б рівняння (C) був би двократний розв'язок $\xi = 0$, себто, щоб у всі члени нового рівняння (C) ξ входило в квадраті. Очевидно, що це є можливим, коли ми доберемо величину m таке, щоб сталий член при ξ в першому ступіню був нулем, а саме, коли:

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} + m\frac{\partial F}{\partial y_1} = 0$$

А звідси маємо:

$$m = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_1}}{\frac{\partial F}{\partial y_1}}$$

А тому рівняння даної прямої матиме вид:

$$\eta = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_1}}{\frac{\partial F}{\partial y_1}}\xi$$

або(див. вгорі перетворення координат)

$$(X - x_1)\frac{\partial F}{\partial x_1} + (Y - y_1)\frac{\partial F}{\partial y_1} = 0$$

Це, як бачимо, є рівняння дотичної до кривої в точці $M(x_1, y_1)$ і тепер лишається довести, що ця пряма дотикається до кривої в точці M лише в одній точці.

Для того, щоб одержати задану дотичну, ми добирали m так, щоб рівність:

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} + m\frac{\partial F}{\partial y_1} = 0$$

Але можна бути, що зокрема й $\frac{\partial F}{\partial x_1} = 0$ і $\frac{\partial F}{\partial y_1} = 0$ тоді очевидно при всякому m задана рівність буде рівна з нуля, а тому кожна пряма, що проходитиме через точку M уявлятиме з певного погляду дотичну, але без зазначеного її напрямку. Це дає нам право вважати точку M за сукупність двох безмежно-близьких точок, як ми це практикували для дотичної, а просто подвійною точкою (ніби накладеної одна на одну). Така точка зветься кратною й є особливою точкою. Очевидно, щоб зі всіх цих прямих, що проходять через точку M вибрати справжню дотичну, таку

що має власний напрям, треба взяти ще одну точку безмежно-близьку M (зв'язану з нею). Ми знаємо, що кожна з прямих, що проходить через точку M зустрічає криву ще в кількох $(n-2)$ точках, а тому за прикладом попередніх міркувань доберемо вартість m так, щоб ще одна з точок поза M злилася з M. Це може бути тоді, коли z буде приймати нульовий розв'язок, себто всі члени рівняння (C) поділяться на z^3. Очевидно, що при умові $\frac{\partial f}{\partial x_1}=0$ і $\frac{\partial f}{\partial y_1}=0$ нам треба буде дібрати вартість m так, щоб і сочинник при z^2 був рівний з нулем, себто

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}+2m\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial y_1}+m^2\frac{\partial^2 f}{\partial y_1^2}=0 \cdots (\mathfrak{D})$$

Це рівняння квадратове, а тому дає два розв'язки для m. Отже через подвійну точку кривої можемо провести загалом дві дотичні (різні, злиті в одну, або уявні).

Проаналізуємо це:

Вираз $\mathfrak{D}$ (дискримінант) рівняння буде:

$$\mathfrak{D}=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial y_1}\right)^2-\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}\cdot\frac{\partial^2 f}{\partial y_1^2}$$

I) Коли $\mathfrak{D}>0$, то m має два різних дійсних розв'язки, а тому через подвійну точку M проходять дві дотичні. Така подвійна точка зветься вузлом. Отже ознакою того, що точка M є вузол буде:

1) $\frac{\partial f}{\partial x_1}=0$; 2) $\frac{\partial f}{\partial y_1}=0$ і 3) $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial y_1}\right)^2-\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}\cdot\frac{\partial^2 f}{\partial y_1^2}>0 \cdots (54)$

II) Коли $\mathfrak{D}=0$, то m має два однакових дійсних

розв'язки, себто обидві гілки кривої знаходяться в одній
Тут може бути два випадки: 1) коли обидві гілки-
ні кривої відділяються від дотичної з обох боків точ-
ки дотику, то точка звється точкою самодотор-
кання кривої (рис. 83) і 2) коли
обидві гілки кривої відділяють-
ся від дотичної з одного боку
точки дотику. Це є точка по-




Рис. 83

вернення (або точка повороту) (рис. 83а, б).
Як ми казали, точка повороту є двох родів, ось
про це можна в кожному окремому випадку
дізнатися за допомогою дотичного дослідження
тієї ділянки кривої, яка близько до вершини
дотику.
Отже, ознакою існування точки самодотикання
або точки повороту є:

$$1)\ \frac{\partial F}{\partial x_1}=0;\quad 2)\ \frac{\partial F}{\partial y_1}=0\ \text{ і }\ 3)\ \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial y_1}\right)^2-\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2}\cdot\frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2}=0 \quad\ldots\ (55)$$

III) Коли $D<0$, то розв'язки m є уявні і точки дотику
в точці M не існує (вони є також уявні). Коли б
ми ветвевого дослідження взяли достатньо близькі
точки до M, то переконалися б, що вони не за-
довольняють рівняння кривої, себто точка M є
відокремленого або ізольованого й описаного її буде:

$$1)\ \frac{\partial F}{\partial x_1}=0;\ \frac{\partial F}{\partial y_1}=0\ \text{ і }\ 3)\ \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial y_1}\right)^2-\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2}\cdot\frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2}<0 \quad\ldots\ (56)$$

Коли б другі похідні $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$ і $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ одночасно
самі по собі обертались б в нуля, то ми мали
б справу уже з потрійною кратною точкою.

В цьому випадку ми можемо мало довільну вершину і кожна пряма, що проходила через цю точку була свого роду "дотичною". Щоб і в цьому випадку мати „справжню" дотичну, ми на підставі попередніх доводів зрівнюємо з нулем сумму членів при ξ^3 в рівнянні (C), а саме:

$$\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^3} + 3m\frac{\partial^3 F}{\partial x_1^2 \partial y} + 3m^2\frac{\partial^3 F}{\partial x_1 \partial y^2} + m^3\frac{\partial^3 F}{\partial y^3} = 0$$

і виключаємо з цього рівняння m. В остаточному випадку ми маємо або 3 окремих дійсних дотичних, або 2 з них злитих в одну й окрему або всі три злиті в одну, або одну дійсну а дві уявних.

Продовжуючи свою спеціальну дослідження, ми можемо одержати точку якої бажаємо кратності p.

Очевидно, що це буде тоді, коли всі $p-1$ окремих перших похідних обернеться одночасно в нуля (для даних значень точки M). Але над детальним розв'язком цих кратних точок ми не будемо зупинятися.

З цілої нашої аналізи ми можемо зробити такий висновок: <u>конечною умовою існування всіх особливих точок є обернення в нуля (для значень цих точок) перших окремих похідних:</u>

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = 0 \quad \text{і} \quad \frac{\partial F}{\partial y_1} = 0 \quad \cdots \quad (57)$$

Але це не є ще достатньою умовою, бо значення x і y знайдені із наведених рівнянь можуть і не задовольняти рівняння самої кривої, себто

знайдеться точка, значення якої в диференціюванні (57) не належатиме до кривої, а тому не буде її особливою.

З цих міркувань очевидно, що достатньою умовою того, щоб деяка крива мала особливу точку є сумісність всіх трьох рівнянь:

$$\frac{\partial F}{\partial x}=0 \;;\; \frac{\partial F}{\partial y}=0 \;\text{ і }\; F(x,y)=0 \quad \cdots\cdots (58)$$

Крім того, щоб ми могли диференціювати знайдену особливу точку відносно обох її окремих похідних і коли хоч одна з них не рівна нулеві - то ця точка є другої кратності, коли й другі похідні є рівні з нулями а деякі вищого порядку окремими похідними є хоч одна не рівна нулеві - то точка є третьої кратності й т. д.

§39. Спрощений спосіб аналізу особливих точок.

Візьмімо рівняння (A) й описано сполучимо в нього через A, B, C і т. д., себто:

$$Az+B\eta+(Cz^2+Dz\eta+E\eta^2)+(Kz^3-Lz^2\eta+Mz\eta^2+N\eta^3)\cdots=0 \quad (J)$$

Коли в це рівняння вставимо замість $\eta = mz$ то рівняння (C) прийме такий вигляд:

$$(A+mB)z+(C+mD+m^2E)z^2+(K+mL+m^2M+m^3N)z^3+\cdots=0$$

З цього міркувань знаємо, що коли існує особлива точка то $A=0$, $B=0$ дістанемо рівняння, що задовольняють цілі рівняння. Далі, коли точка

є другої кратності, то хоч один із коефіцієнтів C або D або E не рівні з нулем, також що рівняння починається з членів другого виміру; коли точка третьої кратності, то C, D і E є рівні з нулем але хоч один із коефіцієнтів K, L, M або $N \neq 0$, себто рівняння починається з членів 3го виміру (як найнижчого) і т. д.

Отже при існуванні особливої точки $k^{ої}$ кратності рівняння перше починається з членів $k^{го}$ виміру, як найнижчого.

Коли, припустім, існує точка 2ої кратності то рівняння:

$$C + m\mathfrak{D} + m^2 E = 0 \quad \cdots \quad (\alpha)$$

дає можливість визначити кутовий коефіцієнт m для дотичної:

$$\eta = m\xi \quad \cdots \quad (\beta)$$

Очевидно, що визначивши m з рівнянь (α) і (β) ми одержимо рівняння системи дотичних (обох разом), а саме:

$$C\xi^2 + \mathfrak{D}\xi\eta + E\eta^2 = 0$$

Беручи на увагу рівняння (I) ми бачимо, що рівняння системи дотичних одержимо, коли в цьому рівнянні (I) зрівняємо з нулем сукупність членів найнижчого виміру (бо $A = 0$ і $B = 0$). Наприклад для точки 3ої кратності маємо: $A = B = C = \mathfrak{D} = E = 0$ і для визначення m маємо рівняння:

$$K + mL + m^2 M + m^3 N = 0$$

(З розвязки) Але виключивши x з цього рівняння і рівняння простої $\eta = \xi x$, одержимо рівняння системи системи 3^x дотичних:

$$K\xi^3 + d\xi^2\eta + M\xi\eta^2 + N\eta^3 = 0$$

І знов спостерігаємо, що рівняння цієї системи дотичних одержимо прирівнюючи до нуля алгебраїчну суму членів найнижчого в даному рази виміру (бо $A = B = C = D = E = 0$)

Таким міркуванням ми переконуємося, що на випадок $k^{го}$ кратності точки ми одержимо систему k дотичних, прирівнявши до нуля алгебраїчну суму всіх членів $k^{го}$ виміру, що буде найнижчим виміром членів даного рівняння (бо всі попередні коефіцієнти обернуться в нуля.)

Такий шлях, для практики ми одержимо значно простіший спосіб визначення рівнянь дотичних, поведених через особливу точку, а саме:

1) Коли точка, що ми досліджуємо, не є початком координат, то систему координат перетворюємо рівнобіжним перенесенням до цієї точки, як початку.

2) Коли після перетворення існують члени $1^{го}$ виміру, то початок координат (дана точка) не є особливою.

3) Коли ж членів $1^{го}$ (а тоже й $2^{го}$, $3^{го}$ і т. д.) виміру не існує, то початок координат є особливою точкою $k^{ої}$ кратності, якщо найнижчий вимір членів рівняння.

4) Прирівнюючи до нуля алгебраїчну суму членів

рівняння найнижчого виміру, яке одержимо рівняння системи дотичних, проведених через цю точку. Після розкладання цього рівняння на рівняння 1го ступеня, матимемо рівняння окремих дотичних.

Приклад. Проаналізувати криву: $x^3-y^3+3y^2-xy-2x^2=0$

Крива не має вільного члену, тому початок координат належить до кривої. Далі це рівняння має найнижчий вимір членів - другий. Тому початок координат може бути точкою 2ої кратності. Рівняння системи дотичних буде:


$$3y^2-xy-2x^2=0$$

Звідси:

$$(y-x)(2x+3y)=0 \quad \text{або} \quad y-x=0 \quad 2x+3y=0$$

Отже початок осей є точкою другої кратності. через яку переходять дві дотичні. (Рис 84)

Рис. 84



§40. Дослідження окремих випадків особливих точок.

Приклад 1. Дослідити точку 0(початок координат) Декартового листа визначеного рівнянням:

$$x^3+y^3-3axy=0$$




Рис. 85

1) Теоретичний спосіб:

$$\text{I)}\ \frac{\partial F}{\partial x}=3x^2-3ay;\quad \left[\frac{\partial F}{\partial x}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}=3y^2-3ax;\quad \left[\frac{\partial F}{\partial y}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=0$$

Значення $x=0$; $y=0$ задовольняють рівняння кри-

вої і не більше обертаються $\frac{\partial f}{\partial x}$ і $\frac{\partial f}{\partial y}$ в нуля. Тому точка 0 є особливою.

II) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$; $\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right]_{x=0} = 0$ | $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -3a$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$; $\left[\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right]_{y=0} = 0$ | тому: $\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right]_{\substack{x=0 \\ y=0}} \neq 0$

Нерівність з нулем $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ показує, що точка є <u>подвійною.</u>

III) $\Delta = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 9a^2 > 0$

Таким чином точка 0 (початок осей) є <u>вузлом</u> і має дві дотичні (рис. 85)

Для визначення т маємо:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2m\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + m^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$$

Отже:

1) $-2m \cdot 3a = 0$ або $6am = 0$; тому $m = 0$

2) $m = \infty$ (бо обертається в нуль сумніше при m^2.

Перший вислід показує, що дотична є вісю x-ів і має рівняння $y = 0$

А другий вислід показує, що друга дотична є вісь y-ів, себто $x = 0$

<u>2 спосіб (практичний)</u>

I) Найнижчий вимір членів рівняння є другий а тому точка може бути подвійною.

II) Рівняння дотичних одержуємо прирівнюючи до нуля члени $2^{го}$ (низького) виміру, а саме:

$3axy = 0$, або $xy = 0$, а звідси: $x = 0$; $y = 0$

Точка 0 має дві дотичні (осі координат).

тому є подвійного, а саме вузлом.

Приклад 2. Дано лемніскату: $(x^2+y)^2-2a^2(x^2-y^2)=0$

Дослідити точку 0 (пох. осей)

I) 1) $\frac{\partial F}{\partial x}=2(x^2+y^2)2x-4a^2x;\ \left[\frac{\partial F}{\partial x}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=0$

2) $\frac{\partial F}{\partial y}=4y(x^2+y^2)+4a^2x;\ \left[\frac{\partial F}{\partial y}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=0$

Початок осей є особливою точкою, бо $x=0;\ y=0$ задовольняють рівняння кривої

II) 1) $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=4(x^2+y^2)+8x^2-4a^2;\ \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=-4a^2$

2) $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=4(x^2+y^2)+8y^2+4a^2;\ \left[\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=4a^2$

3) $\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}=8xy;\ \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=0$

Отже точка 0 є подвійною.

III) $D=16a^2>0$

Точка 0 є вузлом. (рис.86)

Далі підставляємо кутовий коефіцієнт дотичної.




Рис.86

IV) $-4a^2+4a^2m^2=0$

$m^2=1;\quad m=\pm 1$

Тому рівняння дотичних: $x\pm y=0$

2° спосіб.

Упорядкуємо рівняння лемніскати і матимемо:

$$x^4+y^4+2x^2y^2-2a^2x^2+2a^2y^2=0$$

Найнижчі члени другого виміру, а тому початок осей має бути подвійною точкою.

Прирівнюючи до нуля ці члени $2^{го}$ виміру, маємо:

$$2a^3x^2 - 2a^2y^2 = 0 \quad \text{або} \quad x^2 - y^2 = 0$$

Звідси рівняння дотичних: $x \pm y = 0$. Точка є вузлом.

Приклад 3. Дослідити точку O (початок координат) параболи Нейля (півкубічної) з рівнянням:

$$x^3 - ay^2 = 0$$

I) 1) $\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2$; $\left[\frac{\partial F}{\partial x}\right]_{x=0} = 0$; 2) $\frac{\partial F}{\partial y} = -2ay$ $\left[\frac{\partial F}{\partial y}\right]_{y=0} = 0$

Отже початок осей є особливою точкою.

II) 1) $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 6x$ $\left[\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right]_{x=0} = 0$; 2) $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = -2a$ $\left[\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0 \\ y=0}} = -2a$ 3) $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 0$

Отже точка є подвійною

III) $$\left[\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right]^2_{\substack{x=0 \\ y=0}} - \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$$

Дві дотичні, що зливаються в одну.

IV) Рівняння дотичної: $2amx^2 = 0$; $m = 0$; тому дотична має рівняння: $y = 0$ (вісь x-ів).

Досліджуємо положення гілок кривої. З рівняння параболи маємо:

$$y^2 = \frac{x^3}{a} \; ; \quad y = \pm\sqrt{\frac{x^3}{a}}$$

При $x > 0$ y має дві однакові величини різних знаків. Тому крива положена симетрично щодо осі x-ів. При $x < 0$, величини y є уявні. Отже крива лежить з обох боків дотичної, але з одного боку вісі y-ів. Тому є точкою повернення $1^{го}$ роду (рис. 87)




Рис. 87

2 спосіб. Найпростіший вигляд рівняння є другий, а

тому дотична є подвійною.

Прирівнюючи до нуля члени $2^{го}$ виміру, маємо:

$$ay^2 = 0$$

Отже одержуємо дві злиті дотичні рівняння:

$$y = 0 \quad (\text{вісь } x\text{-ів})$$

Вище наведені дослідження гілок кривої свідчать, що початок осей є точкою повернення $1^{го}$ роду.

Приклад 4. Дано криву: $x^5 - x^4 + 2x^2(y-2) + 4y - y^2 = 4$. Знайти особливі точки.

Умовою існування такої точки є: $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$ і $\frac{\partial F}{\partial y} = 0$. Отже:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 5x^4 - 4x^3 + 4x(y-2) = 0 \cdots (a)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2x^2 + 4 - 2y; \quad y = x^2 + 2 \cdots (б)$$

З першого рівняння $x = 0$; $5x^3 - 4x^2 - 4(y-2) = 0 \cdots (в)$

А з другого рівняння вставка $x = 0$ дає: $y = 2$. Крім того, вставляючи вартість y з (б) у рівняння (с) маємо:

$$5x^3 - 4x^2 + 4x^2 = 0; \quad 5x^3 = 0; \quad x = 0$$

Отже маємо єдиний розв'язок: $x = 0$; $y = 2$. Вставляємо їх в рівняння кривої і маємо тотожність. Тому точка $M(0,2)$ є особливою.

Тепер перетворимо криву до нових, рівнобіжних до старих координат з початком в точці M. Взори перетворення будуть:




Рис. 88

$$x = \xi; \quad y = \eta + 2$$

тому:

$$\xi^5 - \xi^4 + 2\xi^2\eta + 4(\eta+2) - (\eta+2)^2 = 4$$

або

$$\xi^5 - \xi^4 - 2\xi^2\eta - \eta^2 = 0$$

Прирівнюючи до нуля член найнижчого (себто другого) виміру, маємо:

$$\eta^2 = 0 \quad \text{або:} \quad \eta = 0$$

Отже маємо в цій точці дві дотичні $\eta = 0$ і $\eta = 0$, що злилися. Тому точка є подвійною, що має за дотичну вісь ξ-ів.

Досліджуємо положення гілок кривої:

$$\xi^5 = (\xi^2 - \eta)^2 \text{ або } \xi^2 - \eta = \pm\xi^{5/2}; \text{ або: } \eta = \xi^2(1 \pm \xi^{1/2})$$

Ми бачимо що:

1) Реальні вартості η існують лише для $\xi > 0$ (бо при $\xi < 0$ $\sqrt{\xi} = \xi^{\frac{1}{2}}$ має уявну вартість). Отже крива має свої гілки від точки O в бік додатніх x-ів.

2) η має дві вартості (дві гілки). При тому для вартостей (рис. 88) $\xi < 1$, обидві вартості η додатні, а тому обидві гілки кривої лежать вгорі над віссю ξ-ів, себто вгорі спільної дотичної. При $\xi = 1$; $\eta = 0$: одна гілка перетинає в точці P свою дотичну і при $\xi > 1$ - ця гілка лежить під дотичною.

Отже, ці міркування дають зрозуміти, що особлива точка $M(0,2)$ є точкою повернення (типом повороту) $2^{го}$ роду.

Приклад 5. Дослідити особливі точки кривої:

$$a^4y^2 = x^4(a^2 - x^2)$$

$$1) \quad \frac{\partial F}{\partial x} = -4x^3(a^2 - x^2) + 2x^5 = 0$$

$$2) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2a^4y = 0$$

Розв'язуючи ці рівняння маємо: $y = 0$; $x = 0$; $x = \pm a\sqrt{\frac{2}{3}}$

Вставляючи ці вартості в рівняння кривої, пере-

кощелюся, що їхнім задовольняють вартості:

$$x=0;\quad y=0$$

Отже точка $O(0,0)$ є особливою (початок координат). Прирівнюючи до нуля член найнижчого виміру маємо:

$$a^4y^2=0,\ \text{звідки:}\ y^2=0$$

Маємо дві дотичні злиті в одну рівняння (рис.89)

$$y=0$$

[Співпала дотична з віссю x-ів]




Рис. 89

<u>Перевірка.</u> Беремо другі похідні й маємо:

1) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=-12x^2(a^2-x^2)+8x^4+10x^4=$

$=30x^4-12a^2x^2$. Отже: $\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=0$

2) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2a^4\neq 0$ 3) $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0$

Таким чином підтверджується, що точка є подвійною і має спільну дотичну, бо:

$$\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0\\y=0}}=0$$

Досліджуємо частині криві:

$$y=\pm\frac{x^2}{a^2}\sqrt{a^2-x^2}$$

Для всіх вартостей $|x|<a$ ми маємо дійсні вартості y, себто крива лежить з обох боків віссі y-ів. Отже <u>не повертається</u> в точці 0, а тому ми маємо точку <u>самодотикання.</u> (Рис 89)

<u>Приклад 6.</u> Дослідити особливі точки кривої „Капка"

що визначається рівнянням: (рис. 90)

$$y^4 = x^2(a^2 - y^2)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -2x(a^2 - y^2); \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 4y^3 + 2x^2 y$$

Звідси маємо систему:

$$2x(a^2 - y^2) = 0$$
$$2y(y^2 + x^2) = 0$$

Розв'язки її 1) $x = 0$; $y = 0$ 2) $y = \pm a$; $x = \pm ai$. Розв'язки 2) - відпадають, як уявні, а вставивши 1° розв'язків в рівняння кривої дає тотожність. Отже початок координат $O(0,0)$ є особливою точкою.

$$1) \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -2(a^2 - y^2); \quad \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right]_{\substack{x=0 \\ y=0}} = -2a^2$$

$$2) \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 12y^2 + 2x^2; \quad \left[\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$$

$$3) \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 4xy; \quad \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right]_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$$

Тому:

$$\left[\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right)^2 - \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$$

Маємо дві злиті дотичні, а сама криві до нуля чекти найпростішого вигляду маємо:

$$x^2 a^2 = 0$$

Звідси: $x = 0$ (два однакових розв'язки). Отже вісь y-ів є дотичною.




Рис. 90

Досліджуємо кривої

$$x = \pm \frac{y^2}{\sqrt{a^2 - y^2}}$$

Ми бачимо, що для величин $|y| < a$ (додатних і

і відємні) x має реальні значення. Отже галузі кривої лежать з обох боків дотичної цієї точки O тому це є точкою самодотикання.

[Зауважимо ми бачимо, що при $|y| = a$, значення $x = \infty$, отже прості $y = a$ і $y = -a$ є асимптотами кривої]

Приклад 7. Дослідити особливі точки кривої:

$$(y-2)^2 = x(x+1)^2$$




Рис. 91

Шукаємо значення особливої точки:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -(x+1)^2 - 2x(x+1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y-2)$$

Отже маємо систему:

1) $(x+1)^2 + 2x(x+1) = 0$ або $(x+1)(3x+1) = 0$

2) $y - 2 = 0$

Звідси: $y = 2$; $x = -1$; $x = -\frac{1}{3}$. Вставивши ці розв'язків у рівняння кривої показуємо, що цьому рівнянню задовольняють значення точки $M(-1, 2)$ Отже вона є особливою.

Перенесім координати рівнобіжно собі до точки M, як початку. Візьмемо перетворення: $x = \xi - 1$ $y = \eta + 2$. Тому рівняння кривої в нових координатах має вигляд:

$$(\xi - 1)\xi^2 = \eta^2$$

і має особливу точку $M(\xi = 0, \eta = 0)$

1-ий спосіб.

1) $\frac{\partial F}{\partial \xi} = 2\xi(\xi-1) + \xi^2$; $\left[\frac{\partial F}{\partial \xi}\right]_{\substack{\xi=0\\ \eta=0}} = 0$ $\frac{\partial F}{\partial \eta} = -2\eta$; $\left[\frac{\partial F}{\partial \eta}\right]_{\substack{\xi=0\\ \eta=0}} = 0$

2) $\frac{\partial^2 F}{\partial \xi^2} = 6\xi - 2$; $\left[\frac{\partial^2 F}{\partial \xi^2}\right]_{\substack{\xi=0\\ \eta=0}} = -2$

$\frac{\partial^2 F}{\partial \eta^2} = -2$. $\left[\frac{\partial^2 F}{\partial \eta^2}\right]_{\substack{\xi=0\\ \eta=0}} = -2$; $\frac{\partial^2 F}{\partial \xi^2 \partial \eta} = 0$. Тому:

$$\left[\frac{\partial^2 F}{\partial \xi^2}\right]_0 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial \eta^2} - \left[\frac{\partial^2 F}{\partial \xi \partial \eta}\right]^2_{\substack{\xi=0\\ \eta=0}} = -4 < 0$$

Точка є ізольованою (відокремленою). (рис 31).

2й спосіб.

Рівняння: $\xi^3 - \xi^2 - \eta^2 = 0$

не має членів нижче 2го виміру й тому має подвійну точку. Рівняння дотичних буде:

$$\xi^2 + \eta^2 = 0 \text{ ; або } \xi = \pm \eta i$$

Дотичні є уявні, а тому точка є ізольованою. Справді, з рівняння кривої маємо:

$$\eta = \pm \xi \sqrt{\xi - 1}$$

Ми бачимо, що для вартостей $\xi < 1$, вартості η є уявні, а тому крива не переходить через початок координат (цей початок уявляє ізольовану точку) Коли $\xi = 1$, то крива перетинає вісь ξ-ів, бо $\eta = 0$

Приклад 8. Знайти особливі точки кривої:

$$(x^2 - y^2)^2 = a^2(x^2 + y^2)$$

2й спосіб. Рівняння має членів найнижчого 2го виміру, тому існує подвійна точка в початку координат: $O(0,0)$.

Рівняння дотичних:

$$x^2 + y^2 = 0 \text{ або } x = \pm yi$$

Отже точка має бути ізольованою. Справді:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 4x(x^2 - y^2) - 2a^2 x$$

$$\frac{\partial F}{\partial x^2} = 4(x^2 - y^2) + 8x^2 - 2a^2 ; \left[\frac{\partial F}{\partial x^2}\right]_{\substack{x=0\\ y=0}} = -2a^2$$




Рис. 32

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -4y(x^2-y^2) - 2a^2y$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = -4(x^2-y^2) + 8y^2 - 2a^2; \quad \left[\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0\\y=0}} = -2a^2$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = -8xy; \quad \left[\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right]_{\substack{x=0\\y=0}} = 0$$

Отже:
$$\left[\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right)^2 - \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right]_{\substack{x=0\\y=0}} = -4a^2 < 0$$

§41. Особливі точки трансцендентних кривих.

Ми розглядали особливі точки, що належать до алгебричних кривих і для дослідження їх характера розкладення функцій в ряди Тейлора. Але існує безліч і таких трансцендентних кривих, що мають також особливі точки, напр., точки зламання, або кутові точки. Щоб ознайомитися з цими ми розглянемо де-кілька прикладів.

Приклад 1. Хай крива має рівняння: $y = e^{\frac{1}{x}}$

Коли візьмемо для x вартість 0, то y одержує невиразну вартість, а саме:

До вартости нуль x може простувати або 1) через додатні свої вартости й тоді $\lim y = \lim e^{\frac{1}{x}} = e^{\infty} = \infty$, або 2) через від'ємні вартости й тоді $\lim y = \lim e^{-\frac{1}{|x|}} = e^{-\infty} = 0$. Таким чином крива складається з 2^x окремих галузів, що підходять до осі y-ів ($x \dots 0$), перша галузь асимптотично (бо при $x \dots 0$, $y \dots \infty$) а друга переходить через початок осей ($x \dots 0$, $y \dots 0$). Перша галузь існує лише для додатніх вартостей x,

а друга лише для від'ємних. Далі, виражаючи x з рівняння маємо: $\frac{1}{x} = \lg y$; $x = \frac{1}{\lg y}$. Це показує, що коли y наближається до вартості 1, тоді вартість x простує на безмежність, себто пряма $y=1$ є асимптотою кривої для обох гілок. З цих міркувань робимо висновки:





Рис. 93

1) **Перша** (додатна) гілка кривої обмежена прямими $x=0$ (віссю y-ів) і $y=1$ і йдучи своїми кінцями на безмежність, асимптотично наближуються до даних прямих (рис. 93).

2) Друга (від'ємна) гілка кривої одним кінцем йде на $-\infty$, асимптотично наближаючись до прямої $y=1$, а другим кінцем вирастає в точку $0(x=0; y=0)$ і далі не продовжується. Отже точка 0 є особливою точкою, а саме точкою зачіпання (або дотику) кривої.

Приклад 2. Дано криву рівнянням: $y = x \lg x$

Змінна x входить у рівняння під знаком $\lg$, а тому x не може бути від'ємним, себто $x \geq 0$. Отже наша крива лежить з боку додатніх x-ів. Коли $x=0$, то і $y=0$. Отже крива вирастає в початку осей і складається з одної гілки (бо кожній вартості x відповідає лише одна вартість y). Таким чином точка $0(0,0)$ є точкою зачіпання кривої (рис. 94). [Ця крива для вартостей $x<1$ буде під віссю x-ів



со 2-ї правдивих дробів <0; для вартостей $x=1$ й $y=0$ крива переходить через вісь x-ів і для вартости $x>1$ і $y>0$, себто крива йде над віссю x-ів]

Приклад 3. Дослідити особливі точки кривої:

$$y = \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}$$

Коли віємлемо вартість $x=0$, то й $y=0$, незалежно від того як x простує до нуля чи через від'ємні, чи через додатні свої вартости [бо при переході x до нуля через вартости <0, частинник буде 0, а знаменник 1 (знак вартости y буде залежувати від -), а при переході до нуля x через додатні вартости, частинник буде одиново нуль, а знаменник ∞] Отже крива лежить з обох боків початку координат, що-до осі y-ів, причому додатня галузь лежить в 1 чверті, а від'ємна в 3-ій чверті координат

Далі розглядаємо дотичну в точці $(0,0)$. Очевидно її рівняння буде:

$$y = \left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=0} \cdot x$$

Знайдемо вартість $\left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=0}$:

$$y = \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, \text{ тому } \frac{dy}{dx} = \frac{x\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)+e^{\frac{1}{x}}}{x\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)^2} = \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} + \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x\left(1+e^{\frac{1}{x}}\right)^2}$$

Але беручи межу $\left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=0}$ ми цього зауважити що вартість її буде подвійна, залежно від способу прямування до 0 вартости x. Справді, коли x буде прямувати до 0 лишаючись >0, то матимемо:

$$\left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=0} = 0$$

а коли x буде прямувати до 0 лишаючись $\neq 0$, то:

$$\left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=0} = 1$$

Таким чином, до кривої в точці O буде 2 дотичні:

$$y = 0 \quad \text{і} \quad y - x = 0$$

Ця точка не є крайньою, а тому зветься кутового точкою або точкою злому кривої. (рис. 95). В цій точці одна дотична для додатньої частини є вісь x-ів, а друга для від'ємної частини є симетральною 3-ої четвертини координат.




Рис. 95

Приклад 4. Довести, що крива: $y = x \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ має кутову точку в початку координат.

При $x = 0$ (незалежно від способу прямування до цієї вартості) $y = 0$ (бо $\operatorname{arctg} \pm\infty$ буде здвоєне непарне число $\frac{\pi}{2}$ - себто число обмежене). Також з цього очевидно, що крива буде з обох боків вісі y-ів. Пучок прямих через точку 0, як початок осей; рівняння їх загалом буде: $y = mx$. Коли візьмемо на кривій яку-будь точку (x_1, y_1), то одна з цих січних, що переходитиме через дану точку матиме рівняння:

$$y = \frac{y_1}{x_1} x$$

Щоб одержати дотичну в точці 0, припустимо вартості x_1, y_1 прямувати до нуля [до злиття точки $M(x_1, y_1)$ з точкою $O(0,0)$]. Тоді кутовий коефіцієнт дотичної:

$$m = \lim \left[\frac{y_1}{x_1}\right]_{x_1 \to 0}$$

точки y_1 і x_1 належать до кривої, а тому задовольняють її рівняння й ми маємо тотожність:

$$y_1 = x_1 \operatorname{arctg} \frac{1}{x_1}$$

а звідси:

$$\frac{y_1}{x_1} = \operatorname{arctg} \frac{1}{x_1}$$

тому:

$$\lim_{x_1 \to 0} \left[\frac{y_1}{x_1}\right] = \left[\operatorname{arctg} \frac{1}{x_1}\right]_{x_1 \to 0}$$

Ми знов переконуємося, що ця межа має дві варіанти, а саме:

1) Коли x_1 прямує до нуля через додатні величини то $\operatorname{arctg} \infty = \frac{\pi}{2}$;

2) Коли x_1 прямує до нуля через від'ємні величини, то $\operatorname{arctg} -\infty = -\frac{\pi}{2}$

Отже точка 0 - є кутовою точкою.

§42 Про точки перегину.

Для більшої повноти дослідження точок перегину зладаємо ще умови існування максимум'а й мінімум'а функцій, а також існування точок перегину. Як ми вже розглядали теоретично, крива має мінімум максимум або minimum щодо осі X-ів в тих точках, для яких дотична до кривої є рівнобіжна до осі X-ів, себто, коли її кутовий коефіцієнт $f'(x) = 0$. Після переходу через maximum, ...




Рис. 96

радна кривої буде спадати й тому наступна похідна $f''(x)$ буде від'ємною. Навпаки

після переходу через minimum радіус кривої буде зростати, а тому $f''(x)$ буде додатнім.

Більш докладно ми досліджуємо це питання розглядаючи функцію $y=f(x)$ в ряді Тейлора. В цьому ряді ми можемо зустрінути випадки, коли й $f''(x)$ і $f'''(x)$ обертаються в нуля, а $f^{IV} \neq 0$ і т. д. Загалом коли першого рівного з нулем буде парного порядку

Послідовно переходячи від відповідних міркувань ми робимо такі висновки:

<u>Коли криву задано рівнянням $y=f(x)$ у явній формі, то дана точка буде **maximum'ом** або **minimum'ом** цієї кривої, коли її значення обертатиме першу похідну функцію в нуля й першого рівного з нуля похідного є парного.</u>

Коли ця рівна з нуля парного порядку є:

1) <u>від'ємна</u> [себто, коли $f^{(2k)}_{k=1,2\ldots n}(x) < 0$], то дана точка є maximum кривої і

2) <u>додатня</u> [себто, коли $f^{(2k)}_{k=1,2\ldots n}(x) > 0$] то дана точка є minimum кривої.

Очевидно, відшукуючи точки maximum'а або minimum'а кривої ми:

1) Беремо першу похідну й дорівнюємо її до нуля

2) Беремо другу похідну і вставляємо розв'язки рівняння, що одержали з першої похідної.

3) Коли 2-га похідна у вислідні цієї вставки $\neq 0$, то якщо при $f''(x) < 0$ maximum, а при $f''(x) > 0$ minimum

4) Коли не 2^{ga}, а за неї й третя похідні $=0$, то досліджуємо $4^{ту}$ і т.д. Коли б першої не рівної з нуля були неперервні похідні, то ні максимуму ні мінімуму немає.

Коли рівняння кривої дається в невизначеній формі, себто: $f(x,y)=0$, то тоді:

$$y' = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = 0$$

де $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$, а тому має бути:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

Для визначення значників x і y критичної точки (точки дослідження) маємо систему:

$$f(x,y) = 0$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

[Примітка. Коли й $\frac{\partial f}{\partial y}=0$, то як відомо з попереднього - ми будемо мати особливу точку)

З диференціювання невизначеної функції, маємо:

$$y'' = -\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} : \frac{\partial f}{\partial y} \quad (\text{при } y'=0)$$

а тому, коли:

$$-\frac{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

1) відємна - maximum

2) додатня - minimum

Очевидно, що коли $y''=0$; $y'''=0$ то досліджуємо y^{IV} і т. д.

Тепер вернемося до випадку, коли $y''=0$ й першого не рівного з нуля є неперша похідна. В цьому випадку перша похідна переходить через нуля і крива в даній точці змінює форму (відбувається зміна випуклості кривої що до осі x-ів на вгнуту, або навпаки, в залежності від знаку першої $\neq$ з нуля непарної похідної). Ми вже знаємо, що ці точки, де крива змінює випуклість на вгнутість або навпаки звуться точками перегину. Очевидно, що знайти точки перегину випливає з рівняння:

$$y''=0$$


А встановлюючи розв'язки цього рівняння в першу похідну y', ми одержимо величину кутового коефіцієнта відповідної дотичної перегину.

Приклад 1. $x^3-3bx^2+a^2y=0$

$$y=\frac{1}{a^2}(3bx^2-x^3)\ ;\quad y'=\frac{1}{a^2}(6bx-3x^2)\ ;\quad y''=\frac{1}{a^2}(6b-6x)=\frac{6}{a^2}(b-x)$$

Коли існує точка перегину, то $\frac{6}{a^2}(b-x)=0$, або $x=b$. звідси $y=2\frac{b^3}{a^2}$. Беремо: $y'''=-\frac{6}{a^2}$. Незалежно від величини x і y. ~~похідна~~ не рівного з нуля є непарним (3-я похідна), а тому точка $M\left(b, \frac{2b^3}{a^2}\right)$ є точкою перегину. Далі y''' є від'ємна, а тому крива переходить що-до осі x-ів від випуклості до вгнутості. Кутовий коефіцієнт дотичної буде:

$$y'_{(x_0,y_0)}=\frac{1}{a^2}(6b^2-3b^2)=\frac{3b^2}{a^2}$$ (рис. 97)



~~об-то:~~ $tg\alpha=\frac{3b^2}{a^2}$

Приклад 2. $y=(x-3)^5+2x$

$y' = 5(x-3)^4 + 2$; $y'' = 20(x-3)^3$; $y''' = 60(x-3)^2$; $y^{IV} = 120(x-3)$

$y^V = 120$; Отже: $20(x-3)^3 = 0$; $x = 3$; $y = 6$; $(y''')_{x=3} = 0$;

$(y^{IV})_{x=3} = 0$; $y^V \neq 0$. Тому $M(3,6)$ є точкою перегину; $y' = 2$, себто $\operatorname{tg}\alpha = 2$; далі $y^V > 0$. Отже при точці M крива має вигляд: (рис. 98).




Рис. 98

Дано нами вище загальну геометричну інтерпретацію. Хай рівняння кривої буде:

$$y = f(x) \quad \ldots \quad (\alpha)$$

Поведемо до неї дотичну в точці $M(x_0, y_0)$ й подивимось рівняння цієї дотичної виходу:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

де ми відомо $f'(x_0)$ є вислід вставлення в $f'(x)$ вартости x_0 значника точки M. Перетворене одержане рівняння має:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0 = \varphi(x) \quad \ldots \quad (\beta)$$

Досліджуємо тепер порядок дотикання даної кривої (α) і її дотичної в точці $M(\beta)$ і для цього розглянемо вираз (б) §28 а саме:

$$\Delta = f(x_0+h) - \varphi(x_0+h) = h[f'(x_0) - \varphi'(x_0)] + \frac{h^2}{2}[f''(x_0) - \varphi''(x_0)] +$$

$$+ \frac{h^3}{3!}[f'''(x_0) - \varphi'''(x_0)] + \ldots \qquad (\gamma)$$

В цьому випадку, диференціюючи рівняння (β), маємо:

$$\varphi'(x_0) = f'(x_0)$$

I) Друге не диференціювання дає: $\varphi''(x) = 0$, бо при даній x_0, значника даної точки M, вартість $f'(x_0)$

є сталого. Тому, коли друга похідна функції (α) а саме $y'' = f''(x)$ при вставці в неї вартості x_0 не обертається в нуля, себто: $f''(x)_{x_0} = f''(x_0) \neq 0$, то ми маємо:

$$\Delta = \frac{h^2}{2!}\left[f''(x_0) - \varphi''(x_0)\right] + \dots = \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \dots$$

що є доторканням першого порядку й тому тут існує дві безмежно-близькі точки, взяті в дузі M (рис. 99).




Рис. 99

II) Очевидно, що й третя диференціювання функції (β) дасть:

$$\varphi'''(x) = 0 \text{ а тому й } \varphi'''(x_0) = 0$$

тому коли при умові I) друга похідна функції (α) обертається в нуля, себто $f''(x)_{x_0} = f''(x_0) = 0$, а саме третя похідна тієї ж функції, а саме: $f'''(x)_{x_0} = f'''(x_0)$ не буде рівна з нулем, себто $f'''(x_0) \neq 0$, то ми маємо:

$$\Delta = \frac{h^3}{3!}\left[f'''(x_0) - \varphi'''(x_0)\right] + \dots = \frac{h^3}{3!} f'''(x_0) + \frac{h^4}{4!}\left[f^{IV}(x_0) - \varphi^{IV}(x_0)\right] + \dots$$

Це є доторкання 2го порядку: три безмежно близьких точки взяті в точці M (рис. 100)




Рис. 100

Будемо цей випадок звати перетинанням 1го порядку. Ми бачимо, що починаючи з другої всі похідні

$\varphi(x)$ обертається в нуль, а тому взорцю (8) можна дати вигляд:

$$\Delta = \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \frac{h^3}{3!} f'''(x_0) + \frac{h^4}{4!} f^{IV}(x_0) + \frac{h^5}{5!} f^{V}(x_0) + \dots \qquad (\delta)$$

бо $\varphi'(x_0) = f'(x_0)$. Звідси буде на підставі попередніх міркувань ясно, що:

III) Коли $f'''(x)_{x_0} = f'''(x_0) = 0$, а $f^{IV}(x_0) \neq 0$, то маємо дотикання 3-го порядку (4 безмежно-близькі точки злиті в M), що дає такий геометричний образ (рис. 101)

1) Процес злиття





Рис. 101


2) Вигляд.



Очевидно, що в цьому разі маємо справу з дотиком простої (β) до кривої (α)

IV) Коли $f^{IV}(x_0) = 0$, а $f^{V}(x_0) \neq 0$, то $\Delta = \frac{h^5}{5!} f^{V}(x_0) + \frac{h^6}{6!} f^{VI}(x_0) + \dots$

Це є дотикання 4-го порядку, себто 5 безмежно-близьких точок злитих в точці M. Маємо такий геометричний образ (рис. 102).



1) процес злиття

Рис. 102

2) Вигляд.

Ми маємо знову перетинання (2-го порядку) прогресивному міркуванню свої межі, ми дійшли до висновку, що 1) коли для даної точки M першого (крім $f'(x_0)$) похідного кривої (α) перівного з нулем буде парним, то матимемо дотик до простої (β), а у випадку, коли (при цьому) $f'(x_0) = 0$, то матимемо або

мінімум, щодо осі x-ів. 2) Коли при тих же умовах першого нерівного з нулем буде непарніста похідна, то маємо справу з перетинанням кривої в даній точці M. Порядок цього перетинання завжди рівний $k=\frac{n-1}{2}$ де n є порядок першої нерівної з нулем похідної. [Це дає практично таку ознаку: коли $k=\frac{n-1}{2}$ є ціле число, то маємо перетинання, а коли k дробове, то дотик.]

§43. Дослідження рівняння кривих.

На протязі пройденого курсу ми досліджували окремі властивості аналітичних функцій й тепер експлетуючи придбаними досвідом і методом для всебічної і загальної аналізи рівнянь кривих. Це дасть нам змогу уявити їх геометричний образ, себто їх вималювати графічно.

I) Першим нашим завданням буде через дослідження даного рівняння вималювати ту частину поля нашого функції, де ця крива міститься. Для цього треба:

1) Визначити положення початку координатних осей, щодо самої кривої. [Встановляємо в рівняння кривої значення $x=0$; $y=0$; цим досліджуємо, чи переходить крива через початок координат чи ні]

2) Знайти точки перетину кривої з осями координат, себто визначити відтинки на осях, що творить крива. [Для цього по черзі беремо або $x=0$, або $y=0$, і визначаємо ту змінну, що лишається.]

3) Дослідити криву на симетричність [роби-

но по черзі заміну 1) x на $-x$ і 2) y на $-y$. Коли при першій заміні рівняння лишається незмінним - то крива симетрична щодо осі y-ів. Коли ж можемо переконатися (2-ю підставою), що симетрична кривої щодо осі x-ів. Коли вона симетрична до обох осей, то початок є центром симетрії, або центром кривої]

4) Дослідити всякому змінного x і y, а для того визначаємо або 1) x через y, або 2) y через x і аналізуємо вартості одної в звязку зі зміною другої.

Непр. рівняння: $x^3 - x^2y + 4y = 0$

1) Крива переходить через початок осей, бо задовольняється вартостями $x=0$; $y=0$

2) Крива в нескінченій точці, крім початку осей, координат не перетинає, бо:

1) коли $x=0$, то $y=0$

і 2) коли $y=0$, то й $x=0$

3) Зміни x на $-x$ і y на $-y$, показують, що рівняння при цьому змінюється, а тому крива не є симетричною щодо осей координат

4) Визначаємо y: $y = \frac{x^3}{x^2-4}$

а) для вартостей $0<x<2$ — y має від'ємні вартості, крива лежить під віссю x-ів (в 4-ій четверті)

б) для $0>x>-2$ — y має додатні вартості (лежить в 2-ій четверті.

в) при $|x|=2$ $y=\infty$, себто прості $x=2$ і $x=-2$ — асимптоти кривої;

г) при $x>2$ і y є додатне й при простенні x ... y теж простує до ∞ бо $y = \frac{x^3}{x^2-4} = \frac{x}{1-\frac{4}{x^2}}$

в) при $x < -2$ y є від'ємне й також при зростанні x ... $-\infty$ й y зростає до ∞. Крива войти нагадує нам безмежність.

II) Аналізуємо криву щодо окремих її властивостей.

1) Визначаємо першу похідну $y' = \frac{dy}{dx}$ [це дає дослідити положення кривої в кожній окремій точці]:

а) Коли $f'(x) > 0$, то $f(x)$ зростає, а тому крива віддаляється від вісі x-ів, а коли $f'(x) < 0$ - то наближається.

б) Коли $f'(x) = 0$, то це є моменти повороту кривої (дотичні $\parallel$ до осі x-ів); або коли $f'(x) = \infty$ тоді [дотичні $\parallel$ до осі y-ів]

Отже А) Шукаємо максимум або мінімум кривої. Тоді: а) згідно 1), б) прирівнюємо до нуля 1ну похідну y' і з цього рівняння за допомогою рівняння самої кривої знаходимо значення точок, що лиш дотичні $\parallel$ до осі x-ів. б) Беремо від функції рівняння кривої 2гу похідну $\frac{d^2y}{dx^2} = y''$ і вставляємо в неї значення знайдених точок:

коли $y''_0 \neq 0$, то, коли $y''_0 < 0$, крива в цій точці має максимум, а коли $y''_0 > 0$, то мінімум;

коли $y''_0 = 0$ то досліджуємо 3ю похідну і т. д.



В). Знайти точки перегинання.

1) Для цього прирівнюємо до нуля другу похідну й знаходимо значення тих точок (за допомогою рівняння самої кривої) для яких можливі перегинання.

2) Беремо 3ю похідну й вставляємо знайдені вартості значків; коли для них $y''' \neq 0$, то маємо

точку перегину

3) Вставляємо знайдені точки перегину у вираз y' і одержуємо кутовий коефіцієнт дотичної перегину.

4) Беремо вартості одну праву лівіше, а другу праву більшу деяких значень точки перегину і вставляємо їх у вартість другої похідної y''. Коли ці вставки дадуть зміну знаків „+" на „−"; то ми маємо перехід від випуклості до вгнутості:  і при зміні знаків „−" на „+" навпаки: 

III) <u>Дослідження кривої на асимптоти.</u> Спосіб цього дослідження указаний **раніше в окремому §.**

IV) Дослідження кривої на особливі точки. Способи – в §§ 39, 40; 41.

V) Коли знайдених прикмет ще не досить для вимальовання кривої приблизно, ми беремо ще довільних вартостей x (відємних) і, обчисливши відповідні ряди з розв'язання рівняння кривої, наносимо кілька нових точок. Візьмімо для з'ясування кількох прикладів.

<u>Приклад 1.</u> Дослідити й накреслити криву:

$$x^3 - x^2 y + 4y = 0$$

Ми вже дослідили для цієї кривої:

1) Крива переходить через 0, початок координат

2) Криві більш не перетинає осей

3) Крива не є симетричною

4) Для вартостей $0 < x < 2$ крива лежить під дотичною паралельною вісі x-ів (4-а „ вертикальна)

5) Для вартостей $0>x>-2$ має додатні вартості y, себто лежить в 2 чверті.

6) При $|x|=2$, вартість $y=\infty$, себто $x=2$; $x=-2$ асимптоти

7) При $x>2$ - крива при зростанні x має завжди додатні вартості y (крива в 1-й чверті)

8) При $x<-2$ має завжди $y<0$ (в 3-й чверті)

9) При зростанні абсолютних вартостей x в (7) і (8) дося й y зростає до безмежності. Тому крива має безмежні галузі.

Отже крива положена у всіх 4-х чвертях і переходить через початок осей [графічна ілюстрація (рис. 103)].




Рис. 103

II) Беремо похідну $y'=\frac{dy}{dx}$

$$y'=\left(\frac{x^3}{x^2-4}\right)'=\frac{x^2(x^2-12)}{(x^2-4)^2}$$

Шукаємо maximum або minimum. Для цього

$$\frac{x^2(x^2-12)}{(x^2-4)^2}=0 \quad \text{або} \quad x_1=0\ ;\ x_{2,3}=\pm 2\sqrt{3}=\pm 3{,}464\ldots$$

$$y_1=0\ ;\quad y_{2,3}=\pm 3\sqrt{3}=\pm 5{,}196\ldots$$

Беремо другу похідну:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{8x(x^2+12)}{(x^2-4)^3}$$

і вставляємо вартості x_1, $x_{2,3}$. Тоді:

$$1)\ \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{x=0}=0$$

Це показує, що при $x=0$ є можливою точка пе-


перегину. Але:

$$2)\left[\frac{d^2y}{dx^2}\right]_{x=-2\sqrt{3}} = -\frac{3\sqrt{3}}{4} \quad [\text{Maximum}]$$

$$3)\left[\frac{d^2y}{dx^2}\right]_{x=+2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \quad [\text{Minimum}].$$

Для дослідження точки $x=0$, $y=0$ ми беремо 3-ю похідну, вставляємо вартості $x=0$, $y=0$ й переконуємося, що: $\left(\frac{d^3x}{dx^3}\right) \neq 0$. Отже точка $O(0,0)$ є точкою перегину. Ці дослідження дають нам такі точки (рис. 104)

III) Досліджуємо на асимптоти. 1) Рівняння кривої: $x^3 - x^2y + 4y = 0$ має сотий при x^2-одиницю, тому асимптот, рівнобіжних до осі x-ів немає.



2) Сотий при найстарших степенях y буде $(-x^2+4)$. Тому $x^2-4=0$; $x=\pm 2$. Себто асимптоти рівнобіжні до осі y-ів є дві (вони вже знайдені раніше).

3) Шукаємо асимптоти не рівнобіжні до осей: беремо рівняння простої $y=mx+n$ і вставляємо у рівняння кривої; тоді маємо:

$$x^3 - x^2(mx+n) + 4(mx+n) = 0 \quad \text{або}$$

$$x^3(1-m) - x^2n + 4mx + 4n = 0$$

Тому:

$$1-m=0;\ n=0;\ \text{звідси}\ m=1,\ n=0$$

і рівняння асимптоти має вигляд:

$$x - y = 0$$

(є рівнобічною перша бісектриса)

IV) Особливі точки: 1) $\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 - 2xy = 0$; $\frac{\partial F}{\partial y} = -x^2 + 4 = 0$ Звідки $x = \pm 2$; $y = \pm 3$. Значить ці точки не задовольняють рівняння кривої, тому особливих точок немає. (Це очевидно ще з того, що рівняння містить тільки члени в 1 степені)

Перейдемо тепер до графічного зображення кривої (рис. 105).




Рис. 105

Приклад 2. Дослідити криву:

$$x^3 - 2ax^2 + y^3 = 0$$

1) Крива проходить через початок (чому?) координат.

2) Крива перетинає вісь x-ів не в точці: $\boxed{x^3 - 2ax^2 = 0}$ $x = 2a$ (рис. 105а точки через які проходить крива означено •).




Рис. 105а

3) Крива не симетрична вздовж осей координат.

4) Виражаючи y, маємо:

$$y = \sqrt[3]{x^2(2a - x)}$$

а) коли x зростає до $+\infty$, то y зростає до $-\infty$, а коли x зростає до $-\infty$, то y зростає до $+\infty$, себто маємо дві безмежно далекі точки: $(\infty, -\infty)$ і $(-\infty, \infty)$

б) для додатніх вартостей $x < 2a$, $y > 0$; а для тих

ня варіюється $x > 2a$, $y < 0$. в) для від'ємних варіюється x, завжди $y > 0$ (рис. 105а, заштриховані ≡ частини площі + ті де міститься крива).

5) Досліджуємо maximum і minimum (якщо неявної функції) Для цього:


$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 - 4ax$; тому: $3x^2 - 4ax = 0$; $x_1 = 0$; $x_2 = -\frac{4}{3}a$. Вставляючи ці варіюється в рівняння кривої, маємо:

$y_1 = 0$; $y_2 = \frac{2\sqrt[3]{4}}{3}a$ Але $y'' = -\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} : \frac{\partial F}{\partial y} = -[6x - 4a] : 3y^2 = \frac{4a - 6x}{3y^2}$, y^2 буде завжди додатнім, а тому досить досліджувати знак чисельника: $u = 4a - 6x$. Отже:

а) $x_1 = 0$ не задовольняє до дослідження, бо при тому $y_1 = 0$ і $\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2$ обертається в нуль. Це + особлива точка, коли $\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_0$ і $\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)$ разом рівні з нулем.

б) При $x_2 = \frac{4}{3}a$ маємо: $u = 4a - 8a = -4a < 0$. В цій точці маємо maximum (рис. 106)

Рис. 106



6) Досліджуємо на асимптоти. а) асимптоти рівнобіжні осі x-ів і y-ів немає, бо коли при стаючих ступінях x і y в рівнянні кривої + сталі величини. б) Асимптоти не рівнобіжні до осей координат: беремо рівняння прямої $y = mx + n$ і вставляємо в рівняння кривої, тоді маємо:

$$\underline{\underline{x^3}} - \underline{2amx^2} + \underline{\underline{m^3x^3}} + \underline{3m^2x^2n} + 3mxn^2 + n^3 = 0$$

$n = \frac{2}{3}a$. Рівняння асимптоти: $y = -x + \frac{2}{3}a$ (звідки маємо $x = \frac{2}{3}a$; $y = \frac{2}{3}a$ - відтинки асимпто-

ти на осях (рис. 106, асимптота СФ)

7) Досліджуємо на особливі точки. Находимо точку, що є особливою, себто беремо:

$$\frac{\partial F}{\partial x}=0 \; ; \; \frac{\partial F}{\partial y}=0$$

Отже:

$3x^2-4ax=0$; $x_1=0$; $x_2=\frac{4}{3}a$; $\frac{\partial F}{\partial y}=3y^2$; $y_1=0$ $y_2=0$

а) точка (x_1,y_1) обертає рівняння кривої в тотожність, а тому є особливою. б) точка (x_2,y_2) не обертає рівняння кривої в тотожність, а тому не є особливою (не належить до кривої).

Користуємося практичним способом. Члени найвищого виміру $+x^3-2ax^2$ прирівнюємо їх до нуля й маємо: $2ax^2=0$; $x^2=0$; $x=0$ і $x=0$. Отже, подвійну точку з двома злитими дотичними, що є вісю y-ів. Ми в початку дослідження (рис 105) переконались, що гілки кривої з обох боків точки 0 (для додатніх і від'ємних x-ів) лежать в бік додатніх y-ів. Це є точка повороту 1-го роду (як доведено вище) гілки кривої йдуть з обох боків вісі y-ів (рис. 107)




Рис. 107.

Приклад 3. Дослідити криву:

$$y=\frac{a^2x}{(x-a)^2}$$

1) Крива переходить через початок осей (голу?).

2) Крива вріж початку не перетинає ні вісь x-ів, ні вісь y-ів (голу?).

3) Крива не симетрична щодо осей (чому?).

4) Досліджуємо зміни змінних: а) коли x наближається до $\pm\infty$, то y до 0, справді: $y = \frac{a^2}{(\sqrt{x} - \frac{a}{\sqrt{x}})^2}$ асимптота вісь x-ів для обох напрямів). б). Коли x наближається до a, то y наближається до ∞ ($x \to a$, є асимптота для обох напрямів, бо x може наближатися до a як зростаючи, як спадаючи)

в) Для x додатніх і y додатні, а для x від'ємних і y від'ємне. Отже крива міститься в 1-ій і 3 чверті координат (рис.108)




Рис.108

5) Досліджуємо на екстремум і мінімум.

$$y' = -\frac{a^2(x+a)}{(x-a)^3}$$ тому

$y' = 0$, коли $x = -a$

А як $y'' = \frac{2a^2(x+2a)}{(x-a)^4}$ при $x = -a$

дає: $y'' = \frac{1}{8a} > 0$

Маємо в точці $(-a; -\frac{a}{4})$ максимум.

6) Досліджуємо на асимптоти. Маємо рівняння кривої:

$$y(x-a)^2 = a^2x \quad \ldots\ldots (\alpha)$$

або:

$$yx^2 - 2axy + a^2y = a^2x$$

або:

$$x^2y - (2ax - a^2)y - a^2x = 0$$

а) прирівнюючи коефіцієнт найстаршого ступеня x маємо асимптоту рівнобіжну до осі x-ів, а саме: $y = 0$ (сама вісь x-ів)

б) шукаємо прирівнюючи коефіцієнт най-

старшого степеня у масиві [умв. прів(а)]

$$(x-a)^2 = 0 \quad ; \quad x = a$$

Асимптота рівнобіжна вісі у-ів.

с) Беруть рівняння асимптоти $y = mx+n$, маємо:

$$(mx+n)(x-a)^2 = a^2x^2$$

або:

$$mx^3 - (2am - n)x^2 + \dots$$

Отже: $m=0$; $2am - n = 0$; $n=0$ Асимптот не рівнобіжна до осей немає.

7) Особливі точки. Рівняння кривої $y(x-a)^2 - a^2x = 0$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= 2y(x-a) - a^2 \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= (x-a)^2 \end{aligned}\right\} \text{тому } \begin{aligned} 2y(x-a) - a^2 &= 0 \\ (x-a)^2 &= 0 \end{aligned}$$

Рівняння не спільно-розв'язні і особливих точок немає. Отже крива має вигляд (рис. 109)




Рис. 109

Приклад 4. Дослідити криву:

$$xy^2 - x^2 + 2x - 1 = 0$$

1) Крива не перетинає вісь x-ів (чому?).

2) Крива перетинає вісь x-ів в точці $x=1$ і симетрична вісь y-ів на безмежності, бо

$$y = \pm \frac{x-1}{\sqrt{x}}$$

при $x=0$, $y = \pm\infty$ (рис. 110)




Рис. 110

3) Крива симетрична щодо осі x-ів (бо заміна у на $-y$ не змінює рівняння)

4) $$y = \pm \frac{x-1}{\sqrt{x}}$$

а) Коли x зростає від нуля до 1, то $|y|$ спадає від ∞ до 0; б) коли x зростає від 1 до ∞, то $|y|$ зростає від 0 до ∞; в) крива немає в лівій частині хреста координат, бо для від'ємних x y уявне.

5) Досліджуємо на максимум і мінімум.

$$y' = \pm \frac{1}{2} \frac{x+1}{x\sqrt{x}}$$

тому $y' = 0$; $x = -1$. Такої точки не існує, бо y для неї уявне. Тому максимуму й мінімуму немає.

6) Точок перегину немає, бо $y'' = \mp \frac{1}{4} \frac{x+3}{x^2\sqrt{x}}$; $y'' = 0$; $x = -3$. Такої точки теж немає.

7) Досліджуємо на асимптоти. а) Рівнобіжних до осі x-ів немає, бо сполучник стичного спадання $x \to -1$; б) рівнобіжних до осі y-ів існує, а саме, одна вісь, бо сполучник при стичному спадані y буде ∞; отже асимптота $x = 0$. в) Асимптот не рівнобіжних осям координат немає, бо маємо:

$x(mx+n)^2 - x^2 + 2x - 1 = 0$, або $m^2x^3 + (2mn-1)x^2 + \dots$

$m^2 = 0$; $m = 0$; $2mn - 1 = 0$; $n = \frac{1}{2m} = \infty$ (знова маємо асимптоту-вісь y-ів).

8) Особливі точки. Маємо:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 - 2x + 2; \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy$$

Тому $y^2 - 2x + 2 = 0$; $2xy = 0$; $y^2 = 2(x-1)$; $y = \pm\sqrt{2(x-1)}$

Отже $2x\sqrt{2(x-1)} = 0$; $2x^2(x-1) = 0$; ~~$x = 0$~~; $x_2 = 1$

Звідси: 1) $y^2 + 2 = 0$; y = уявні; 2) $y^2 = 2(1-1) = 0$; $y = 0$

Ці значення $(1, 0)$ задовольняють рівняння, а тому знайдена точка може бути особливою

Перетворимо осі координат до неї, тоді вирази перетворення будуть: $x = \xi + 1$; $y = \eta$ і маємо:

$$(\xi+1)^2\eta^2 - (\xi+1)^2 + 2(\xi+1) - 1 = 0$$

або:

$$(\xi+1)\eta^2 - \xi^2 = 0 \quad \text{або} \quad \xi\eta^2 + \eta^2 - \xi^2 = 0$$

Дорівнюючи до нуля члени найнижчого виміру маємо:

$$\eta^2 - \xi^2 = 0$$

або:

$$\eta + \xi = 0; \quad \eta - \xi = 0$$

Є дотичні. Вузлова точка, де дотичні нахилені до осі x-ів під кутами 45°, 135° (рис. 111)




Рис. 111.

Частина II.

Розділ I

Просторові криві.

§44. Визначення кривої в просторі.

Аналітична геометрія дає 4 способи визначення кривої в просторі; а саме:

$$\text{I)} \ldots\ldots\ldots \left.\begin{aligned} f(x,y,z)&=0 \\ \varphi(x,y,z)&=0 \end{aligned}\right\}$$

Крива, як перетин двох поверхонь.

$$\text{II)} \ldots\ldots \left.\begin{aligned} f(y,z)&=0 \\ \varphi(x,z)&=0 \end{aligned}\right\} \text{або} \left.\begin{aligned} x&=\varphi(z) \\ y&=\psi(z) \end{aligned}\right\}$$

Крива, як перетин двох циліндричних поверхонь. В окремому випадку (при вилученні одного з двох змінних) ми маємо криву, як перетин циліндричної поверхні плоскою

$$f(x,y)=0 \ ; \ z=a \ (\text{const})$$

$$\text{III)} \ldots\ldots x=\varphi(t) \ ; \ y=\psi(t) \ \text{і} \ z=\chi(t)$$

Рівняння (III) визначає криву утворену рухом точки в просторі, а ~~самі~~ змінні її сліди на координатних осях.

Очевидно, що всі три роди рівнянь можна перетворити один з одного. Так, рівняння (II) маємо з рівняння (I) вилучивши з них по черзі z і y і визначивши з одержаних виразів

певних змінних. Далі розглядаючи z, як задану функцію змінного t, ми одержимо з рівнянь (II) рівняння (III). Навпаки, виключивши з рівнянь (III) змінну t, одержимо рівняння (II).

При цьому дослідженні будемо мати на увазі, що всі криві, які розглядаємо, є аналітичні, себто в межах дослідження вони і їх рівняння розгортаються в ряди Тейлора (хоча б для цілого першого порядку).

§45. Дотична до просторової кривої.

I) Припустімо, що рівняння кривої визначено через рівняння:

$$x=\varphi(t);\quad y=\psi(t);\quad z=\chi(t)$$

Візьмімо на цій кривій якусь-будь точку $M(x,y,z)$ і нашій точці безмежно близьку до неї точку M_1, таку, щоб її координати були: $x_1=x+\Delta x=\varphi(t+\Delta t)$; $y_1=y+\Delta y=\psi(t+\Delta t)$ і $z_1=z+\Delta z=\chi(t+\Delta t)$. Проведемо через ці точки січну MM_1 до кривої. Рівняння її, як прямої, що проходить через дві задані точки буде:




Рис. 112

$$\frac{X-x}{x_1-x}=\frac{Y-y}{y_1-y}=\frac{Z-z}{z_1-z}$$

або:

$$\frac{X-x}{\Delta x}=\frac{Y-y}{\Delta y}=\frac{Z-z}{\Delta z}$$

де x, y і z задано в функції t [в окремому випадку величини x, y і z відповідають певній величині $t=t_0$], а точку помножимо всі ці рівності

на Δt, матимемо:

$$\frac{X-x}{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)} = \frac{Y-y}{\left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)} = \frac{Z-z}{\left(\frac{\Delta z}{\Delta t}\right)}.$$

Будемо тепер точку M_1 наближати до M аж до злиття; тоді Δt буде прямувати до нуля, а разом з тим знаменники наших рівностей до: $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ і $\frac{dz}{dt}$, або ж другими означеннями до x', y' і z'. Але в цьому разі січна обертається в дотичну й тому її рівняння матиме вигляд:

$$\frac{X-x}{x'} = \frac{Y-y}{y'} = \frac{Z-z}{z'} \quad \ldots\ldots (59)$$

Або після скорочення на dt:

$$\frac{X-x}{dx} = \frac{Y-y}{dy} = \frac{Z-z}{dz} \quad \ldots\ldots (60)$$

Приклад. В аналітичній геометрії ми розглядали гвинтову лінію, що має рівняння:

$$x = a\cos t; \quad y = a\sin t; \quad z = \frac{h}{2\pi}t$$

Написати рівняння дотичної до неї в якій-будь точці $M(x_0, y_0, z_0)$ де $x_0 = \varphi(t_0)$ і т. д.

$$x' = -a\sin t; \quad y' = a\cos t; \quad z' = \frac{h}{2\pi}$$

Маємо:

$$\frac{x - a\cos t_0}{-a\sin t_0} = \frac{y - a\sin t_0}{a\cos t_0} = \frac{z - \frac{h}{2\pi}t_0}{\frac{h}{2\pi}}$$

II) Розглянемо тепер випадок, коли крива задана рівняннями:

$$F(x, y, z) = 0, \quad \Phi(x, y, z) = 0$$

Продиференціювавши кожне з цих рівнянь і мати-

маємо:

$$\frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy + \frac{\partial F}{\partial z}dz = 0$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z}dz = 0$$

Як очевидну вимогу для точки $M(x,y,z)$ маємо:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy + \frac{\partial F}{\partial z}dz = 0\\ \frac{\partial \varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z}dz = 0\end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots (\alpha)$$

З рівнянь маємо:

$$dx = \frac{X-x}{\rho}\ ;\quad dy = \frac{Y-y}{\rho}\ ;\quad dz = \frac{Z-z}{\rho}$$

де ρ є кратність відношень. Отже вставляючи ці вартості $b(\alpha)$ і скорочуючи на ρ, маємо:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial F}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial F}{\partial z}(Z-z) = 0\\ \frac{\partial \varphi}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial \varphi}{\partial z}(Z-z) = 0\end{aligned}\right\} \quad \ldots (61)$$

Покажемо, що цей буде потрібним рівнянням дотичної. Справді;

1) ці 2 рівняння є косими загальними рівняннями площі, ($1^{\text{го}}$ ступеня, проєкт. змінних)

2) системна цих рівнянь виписаєм просту (як перетин даних площ).

3) x, y і z є шуканими точки, що належать до цієї простої, бо вони задовольняють рівняння (61). Отже, ця проста має бути дотичною до кривої. Описано тепер для скорочення так:

$\frac{\partial F}{\partial x} = F_1$; $\frac{\partial F}{\partial y} = F_2$; $\frac{\partial F}{\partial z} = F_3$ й аналогічно $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \varphi_1$, і т. д.

Тоді маємо:

$$(X-x)F_1 + (Y-y)F_2 + (Z-z)F_3 = 0$$

$$(X-x)\Phi_1 + (Y-y)\Phi_2 + (Z-z)\Phi_3 = 0$$

Виключимо по черзі з цих рівнянь Y і X і матимемо:

$$(X-x)\left[F_1\Phi_2 - F_2\Phi_1\right] + (Z-z)\left[F_3\Phi_2 - F_2\Phi_3\right] = 0$$

або:

$$Z - z = \frac{\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_2 & F_3 \\ \Phi_2 & \Phi_3 \end{vmatrix}}(X-x)$$

Аналогічно:

$$Z - z = \frac{\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_3 & F_1 \\ \Phi_3 & \Phi_1 \end{vmatrix}}(Y-y)$$

Звідси:

$$\frac{\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_2 & F_3 \\ \Phi_2 & \Phi_3 \end{vmatrix}}(X-x) = \frac{\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_3 & F_1 \\ \Phi_3 & \Phi_1 \end{vmatrix}}(Y-y) = Z-z$$

або поділивши на $\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix}$ маємо:

$$\frac{X-x}{\begin{vmatrix} F_2 & F_3 \\ \Phi_2 & \Phi_3 \end{vmatrix}} = \frac{Y-y}{\begin{vmatrix} F_3 & F_1 \\ \Phi_3 & \Phi_1 \end{vmatrix}} = \frac{Z-z}{\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix}} \quad \ldots\ldots\ldots (62)$$

Для цих детермінантів часто вживають також означення, напр.

$$\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} & \frac{\partial \Phi}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial(F, \Phi)}{\partial(x, y)}$$

Тоді рівняння (62) матиме вигляд:

$$\frac{X-x}{\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(y,z)}} = \frac{Y-y}{\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(z,x)}} = \frac{Z-z}{\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(x,y)}} \quad \ldots\ldots\ldots (63)$$

Це є „напрямні" форми рівняння (61).

§46. Напрямні косинуси дотичної до просторової кривої (кривої подвійної кривини)

Хай рівняння цієї дотичної буде:

$$\frac{X-x}{dx}=\frac{Y-y}{dy}=\frac{Z-z}{dz}$$

З аналітичної геометрії ми знаємо, що коли рівняння прямої мають вигляд:

$$\frac{X-x}{m}=\frac{Y-y}{n}=\frac{Z-z}{l},$$

то косинуси напрямних кутів (з осями координат) визначаються:

$$\lambda=\cos\alpha=\frac{m}{\pm\sqrt{m^2+n^2+l^2}};\quad \mu=\cos\beta=\frac{n}{\pm\sqrt{m^2+n^2+l^2}}\ \text{і}\ \nu=\cos\gamma=\frac{l}{\pm\sqrt{m^2+n^2+l^2}}$$

Тепер числа в даному разі напрямні знаменники цієї дотичної будуть:

$$\lambda=\frac{dx}{\pm\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}}\ \text{і}\ \mu=\frac{dy}{\pm\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}}\ \text{і}\ \nu=\frac{dz}{\pm\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}},$$

або ділячи чисельник й знаменник на dt, маємо:

$$\lambda=\frac{x'}{\pm\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}};\ \mu=\frac{y'}{\pm\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}\quad \nu=\frac{z'}{\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$$

і наприклад для рівнянь (61) і (63)

$$\lambda=\frac{\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(y,z)}}{\pm\sqrt{\left[\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(x,y)}\right]^2+\left[\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(y,z)}\right]^2+\left[\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(z,x)}\right]^2}}\ \text{і т. д.}$$


При цьому умовляємося брати перед $\sqrt{\ }$ плюс, коли дотична спрямована у бік зростання дуги кривої.

Розглянемо ще другу визначення напрямних знаменників дотичної. Візьмімо на кривій точку $M(x,y,z)$ де $x=\varphi(t)$ і т. д. і другу близьку точку $M_1(x_1,y_1,z_1)$, тоді

що $x_1 = x + \Delta x$; $y_1 = y + \Delta y$; $z_1 = z + \Delta z$. Тоді довжина хорди MM_1, як відомо з аналітичної геометрії буде:

$$\overline{MM_1}^2 = (x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + (z_1 - z)^2 \text{ або:}$$

$$\overline{MM_1}^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$



Будемо безмежно наближати точку M_1 до точки M і тоді хорда буде безперервно наближатися до відповідного елементу дуги ds і в межі матимемо:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

а звідси

$$ds = \pm\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} \quad \ldots\ldots (64)$$

Це є вираз диференціала дуги просторової кривої. Поділивши обидві частини на dt, ми матимемо другий вигляд цього диференціала:

$$ds = \pm dt\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} \quad \ldots\ldots (65)$$

і нарешті визначаючи вартості x', y' і z' [з порівняння рівнянь (60) і (63)] для випадку, коли рівняння кривої визначене рівняннями $F(x,y,z) = 0$ і $\Phi(x,y,z) = 0$ маємо:

$$ds = \pm\sqrt{\left[\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(x,y)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(y,z)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(z,x)}\right]^2} \quad \ldots\ldots (66)$$

Тут „+" відповідає випадку, коли дуга зростає разом із зростанням відповідного значення, від якого вона залежить. Таким чином, напрямні косинуси кривої можна буде дати вигляд:

$$\lambda = \pm\frac{dx}{ds}; \quad \mu = \pm\frac{dy}{ds}; \quad \nu = \pm\frac{dz}{ds} \quad \ldots\ldots (67)$$

§47. Прямові (нормальні) площини.

В точці M, взятій на даній дотичній ми можемо (як відомо з геометрії) поставити до цієї дотичної безліч прямих, всі вони очевидно є прямовими (нормалями) до кривої в цій точці. Але тепер нам відомо з геометрії, що всі прямі лежатимуть в площині, проведеній через дану точку M прямово до даної дотичної. Цю площину називатимемо прямовою або нормальною площиною до кривої в точці M.




Рис. 114.

З аналітичної геометрії знаємо, що коли нам дано криву: $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$, то рівняння якої-будь площі, проведеної через дану точку $M(x_0, y_0, z_0)$ прямово до цієї прямої матиме вигляд:

$$m(x-x_0) + n(y-y_0) + p(z-z_0) = 0$$

а тому в нашому випадку, коли рівняння даної дотичної буде: $\frac{X-x}{dx} = \frac{Y-y}{dy} = \frac{Z-z}{dz}$, то рівняння прямової площі, що переходить через точку дотику $M(x, y, z)$ прямово до цієї дотичної матиме вигляд:

$$(X-x)dx + (Y-y)dy + (Z-z)dz = 0 \quad \ldots\ldots (68)$$

або [див. рівняння дотичної (59)]:

$$x'(X-x) + y'(Y-y) + z'(Z-z) = 0 \quad \ldots\ldots\ldots (69)$$

або [див. рівняння дотичної (62) або (63)]:

$$\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(y,z)}(X-x) + \frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(z,x)}(Y-y) + \frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(x,y)}(Z-z) = 0 \quad \ldots\ldots (70)$$

Розкриємо символ $\frac{\partial(F,\Phi)}{\partial(y,z)}$ і т. д., маємо:

$$(X-x)\begin{vmatrix} F_2 & F_3 \\ \Phi_2 & \Phi_3 \end{vmatrix} + (Y-y)\begin{vmatrix} F_3 & F_1 \\ \Phi_3 & \Phi_1 \end{vmatrix} + (Z-z)\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix} = 0 \quad \ldots\ldots (71)$$

де F і Φ мають ті самі значення що й раніше: $F_1 = \frac{\partial F}{\partial x}$; $F_2 = \frac{\partial F}{\partial y}$; $F_3 = \frac{\partial F}{\partial z}$; $\Phi_1 = \frac{\partial \Phi}{\partial x}$ і т. д. Звідси:

$$(X-x)\begin{vmatrix} F_2 & F_3 \\ \Phi_2 & \Phi_3 \end{vmatrix} - (Y-y)\begin{vmatrix} F_1 & F_3 \\ \Phi_1 & \Phi_3 \end{vmatrix} + (Z-z)\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ \Phi_1 & \Phi_2 \end{vmatrix} = 0$$

можна взяти за пропорційний через перший рядок, виписати:

$$\begin{vmatrix} X-x & Y-y & Z-z \\ F_1 & F_2 & F_3 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \ldots\ldots (72)$$

Це друга форма рівняння прямової площі до кривої визначеної рівняннями: $F(x,y,z)=0$ і $\Phi(x,y,z)=0$

§48. Площа кривини (дотична площа).

Коли в точці $M(x,y,z)$ кривої ми маємо дотичну, то очевидно, що через неї можна провести безліч площ, що будуть проходити й через точку дотику M. Ці площі загалом можна звати дотичними площами до кривої L в точці M.




Рис. 116

Також дотична площа неодмінно переходить через дві безмежно-близькі точки (взяті), що визначають напрям дотичної. Коли крива простора (подвійної кривини) то дотична до неї площ де-які, або зовсім не стикається з кривою в цій точці, крім взятої M,

або хустрічатись її ще в одній, або кількох точках. З цих площ виберемо ту, що крім M переходить ще через яку одну точку кривої N, безмежно-близьку до M (рис.115). Очевидно, що така площа буде одна (визначена трьома безмежно-близькими точками, взятими з двократного M і нового N. Коли в цьому місці крива буде плоскою, то очевидно, що шукана площа співпадається з площею перерізу (площею де лежить крива), коли ж дотична кривої від площі перерізу відхиляється й обертається навколо дотичної, площі на певний кут навколо даної дотичної. Це дає нам судити про кривину кривої в даній точці M. Можно шукану нами площу й назвати площею кривини кривої. З другого боку, розуміння дотичності, поширене нами вище для плоских кривих дає підставу й в даному разі користуватись тій самій основі (а саме проходженню площі через 3 безмежно-близькі точки кривої) й до цієї площі, а тому назвати її також і дотичною площею. Виведемо рівняння цієї площі.

Хай наша крива визначається рівняннями:

$$x = f(t)\ ;\quad y = \varphi(t)\ ;\quad z = \psi(t) \ldots . (1)$$

Візьмім на ній точку $M(x, y, z)$ і поведемо через останню дотичну до кривої. Її рівняння буде:

$$\frac{X-x}{f'(t)} = \frac{Y-y}{\varphi'(t)} = \frac{Z-z}{\psi'(t)} \ldots\ldots (2)$$

[Примітка. Взявши точку $M(x, y, z)$ ми вважали довільно взятою на кривій L, а через те також

x, y, z є змінними функціями t. В кожному окремому випадку для якоїсь певної точки M_0 її змінні стають сталими величинами x_0, y_0, z_0, що відповідають певній величині $t = t_0$. В цьому разі нульові значення рівняння дотичної одержуємо також сталі величини: $f'(t)_{t=t_0} = f'(t_0)$; $\varphi(t)_{t=t_0} = \varphi'(t_0)$; $\psi(t)_{t=t_0} = \psi'(t_0)$ що є виходами вставивши в перші похідні заданих функцій величину $t = t_0$].

Щоб написати рівняння нашої допоміжної площі, ми зверемо увагу на те, що вона проходить через дотичну до кривої, поведену через точку M, а тому маємо виконування умови лежання цієї площі з прямою (2). Як відомо з аналітичної геометрії ці умови дають такі рівності:

1) Умова того, що точка M належить до площі:

$$A(x - x) + B(y - y) + C(z - z) = 0 \ldots (\alpha)$$

[де A, B і C поки-що нам невідомі сталі рівняння площі]

2) Умова рівнобіжності цієї не площі й прямої (2)

$$A f'(t) + B\varphi'(t) + C\psi'(t) = 0 \ldots\ldots (\beta)$$

Знайдені умови (α) і (β) показують, що дана площа переходить через дотичну до кривої в точці M.

Візьмім тепер точку N дуже близьку до точки M, тоді щоб мати її відповідний безконечно малому приросту τ - змінної t, себто точка N мала б значення:

$$x_1 = f(t + \tau); \quad y_1 = \varphi(t + \tau); \quad z_1 = \psi(t + \tau)$$

Очевидно, що коли б нам площа переходила й

через яку точку N, то значення останньої змінної δ задовольняти її рівняння [себто рівняння (α)]. Отже:

$$A(x_1-x) + B(y_1-y) + C(z_1-z) = 0$$

або:

$$A[f(t+\tau)-f(t)] + B[\varphi(t+\tau)-\varphi(t)] + C[\psi(t+\tau)-\psi(t)] = 0$$

Але формула Тейлора:

$$\Phi(t+\tau) - \Phi(t) = \tau\,\Phi'(t) + \frac{\tau^2}{2!}\Phi''(t+\theta\tau) \quad \text{де } 0<\theta<1$$

дає нам право попередню рівність написати так:

$$A\left[\tau f'(t) + \frac{\tau^2}{2!}f''(t+\theta\tau)\right] + B\left[\tau\varphi'(t) + \frac{\tau^2}{2!}\varphi''(t+\theta\tau)\right] + C\left[\tau\psi'(t) + \frac{\tau^2}{2!}\psi''(t+\theta\tau)\right] = 0$$

або:

$$\left[Af'(t) + B\varphi'(t) + C\psi'(t)\right]\tau + \left[Af''(t+\theta\tau) + B\varphi''(t+\theta\tau) + C\psi''(t+\theta\tau)\right]\frac{\tau^2}{2!} = 0$$

Коли взяти на увагу рівність (β), то ми дістанемо (після скорочення на $\frac{\tau^2}{2!}$) таку рівність:

$$Af''(t+\theta\tau) + B\varphi''(t+\theta\tau) + C\psi''(t+\theta\tau) = 0$$

Це є третьою умовою, що зв'язує нашу площу, а саме умовою переходження її через точку N. Будемо тепер наближати точку N до M безмежно-близько. Тоді τ буде прямувати до нуля й наша третя умова обернеться в:

$$Af''(t) + B\varphi''(t) + C\psi''(t) = 0 \quad \ldots\ldots (\gamma)$$

Ці три умови дають можливість визначити співвідношення A, B і C площі. Справді, розв'язуючи всі ці три рівняння $(\alpha), (\beta)$ і (γ), або систему, дістанемо:

$$A(x-x) + B(y-y) + C(z-z) = 0$$

$$Af'(t) + B\varphi'(t) + C\psi'(t) = 0 \quad [\text{або: } Ax' + By' + Cz' = 0]$$

$$Af''(t) + B\varphi''(t) + C\psi''(t) = 0 \quad [\text{або: } Ax'' + By'' + Cz'' = 0]$$

Ці рівняння є одновимірні, що-до змінних A, B і C, а тому вони сполучені лише тоді, коли виконання вимагання змінних є рівний з нулем, себто:

$$\begin{vmatrix} X-x & Y-y & Z-z \\ f'(t) & \varphi'(t) & \psi'(t) \\ f''(t) & \varphi''(t) & \psi''(t) \end{vmatrix} = 0 \quad \ldots\ldots (73)$$

або:

$$\begin{vmatrix} X-x & Y-y & Z-z \\ x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \end{vmatrix} = 0 \quad \ldots\ldots (74)$$

Це й буде рівняння потрібної нам площі кривої.

Доведемо тепер протилежне твердження, що <u>кожна</u> площа, яка переходить через три безмежно-близькі точки кривої є відповідною площею її кривої, себто переходить і через дотичну, поведені через дві з цих даних безмежно близьких точок.

Хай ми маємо на кривій три безмежно близькі точки:

$M(x, y, z)$ де $x = f(t_0)$; $y = \varphi(t_0)$ і $z = \psi(t_0)$

$N(x_1, y_1, z_1)$ де $x_1 = f(t_1)$ і т. д.

$P(x_2, y_2, z_2)$ де $x_2 = f(t_2)$ і т. д.

Ми знаємо, що загальне рівняння якої-будь площі буде:

$$F(t) = AX + BY + CZ = 0$$

[де $X = f(t)$; $Y = \varphi(t)$ і $Z = \psi(t)$] Коли ж ця площа переходитиме через точки M, N і P, то значення їй задовольнятимуть і рівняння її. А тому матиме-

по тотожності:

$$F(t_0) = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

$$F(t_1) = Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$$

$$F(t_2) = Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D = 0$$

Отже для визначення площі шляхом зведення маємо рівності:

$$F(t) = 0 \; ; \; F(t_0) = 0 \; ; \; F(t_1) = 0 \text{ і } F(t_2) = 0 \quad \ldots (A)$$

Розглянемо по черзі: 1) $F(t_0) = 0$ і $F(t_1) = 0$ Очевидно, що на підставі теореми Ролля завжди існуватиме така вартість τ $(t_0 \le \tau \le t_1)$ для якої $F'(\tau) = 0$. Аналогічно розглядаємо: 2) $F(t_1)$ і $F(t_2)$ за якого не теоремою, маємо:

$$F'(\vartheta) = 0 \quad \text{де } t_1 \le \vartheta \le t_2$$

і нарешті розглядаємо:

$$F'(\tau) = 0 \text{ і } F'(\vartheta) = 0$$

завжди знайдеться вартість: $\tau \le \theta \le \vartheta$, що:

$$F''(\theta) = 0$$

Значення члени системи (A) можна застосувати через межу:

$$F(t) = 0 \; ; \; F(t_0) = 0 \; ; \; F'(\tau) = 0 \; ; \; F''(\theta) = 0$$

Коли ми будемо наближати точку N і P безмежно близько до M, то вартості t_1 і t_2 будуть прямувати до вартості t_0, а тим самим до цієї величини t_0 прямуватимуть і середні між ними вартості τ і θ. Тому в останньому випадку одержимо:

$$F(t) = 0 \; ; \; F(t_0) = 0 \; ; \; F'(t_0) = 0 \text{ і } F''(t_0) = 0 \quad \ldots (B)$$

Розглянувши ці функції і первісні вартості

ми одержимо:

$$AX + BY + CZ + D = 0$$

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$Ax' + By' + Cz' + D = 0$$

$$Ax'' + By'' + Cz'' + D = 0$$

Ця система дає можливість визначити коефіцієнти A, B, C і D. Попередньо відкинувши 2 рівняння з першого й перейшовши до системи:

$$A(X-x) + B(Y-y) + C(Z-z) = 0$$

$$Ax' + By' + Cz' = 0$$

$$Ax'' + By'' + Cz'' = 0$$

одновимірних рівнянь що дотичні:

$$\begin{vmatrix} X-x & Y-y & Z-z \\ x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \end{vmatrix} = 0$$

Ми одержали рівняння площі кривих (74).

Розкриваючи визначник через перші елементи першого рядка, ми одержимо <u>другий вигляд рівняння площі кривих, а саме:</u>

$$(X-x)\begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix} + (Y-y)\begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix} + (Z-z)\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix} = 0$$

або:

$$(X-x)(y'z'' - y''z') + (Y-y)(x''z' - x'z'') + (Z-z)(x'y'' - x''y') = 0 \ldots (75)$$

А звідси скоротивши все рівняння на dt^2, матимемо:

$$(X-x)(dy\,d^2z - d^2y\,dz) + (Y-y)(d^2x\,dz - dx\,d^2z) + (Z-z)(dx\,d^2y - d^2x\,dy) = 0 \ldots (76)$$

Це не рівняння площі безпосередньо з визначника:

$$\begin{vmatrix} X-x & Y-y & Z-z \\ dx & dy & dz \\ d^2x & d^2y & d^2z \end{vmatrix} = 0 \ldots\ldots (77)$$

що одержимо з виписаних (74) після скорочення по-го на $d\tau^3$ (виносячи за знак виписаних з 2-го рядка $d\tau$ а з третього $d\tau^2$)

§49. Властивості площі кривини.

I) Площа кривини є лінійне положення площі, що переходить через дану дотичну рівнобіжно до дотичної, поведеної до кривої через безмежно близьку точку.

Справді, поведемо дотичну через точку $N(x_1, y_1, z_1)$ (див. вивод рівняння площі кривини). Рівняння цієї дотичної буде:

$$\frac{X-x_1}{x_1'} = \frac{Y-y_1}{y_1'} = \frac{Z-z_1}{z_1'}$$

де $x_1 = x + \Delta x = f(t+\tau)$; $y_1 = \varphi(t+\tau)$ і $z_1 = \psi(t+\tau)$. Звідси умова рівнобіжності цієї площі:

$$A(X-x) + B(Y-y) + C(Z-z) = 0$$

і даної дотичної буде:

$$Ax_1' + By_1' + Cz_1' = 0$$

Але за Тейлоровим:

$$x_1 = f(t+\tau) = f(t) + \tau f'(t+\theta\tau) \quad \text{де } 0<\theta<1$$

і аналогічно:

$$y_1 = \varphi(t) + \tau\varphi'(t+\theta\tau)$$

$$z_1 = \psi(t) + \tau\psi'(t+\theta\tau)$$

Тому умова рівнобіжності матиме вигляд:

$$A[f(t)+\tau f'(t+\theta\tau)]' + B[\varphi(t)+\tau\varphi'(t+\theta\tau)]' + C[\psi(t)+\tau\psi'(t+\theta\tau)]' = 0,$$

або:

$$Af'(t) + B\varphi'(t) + C\psi'(t) + \tau[Af''(t+\theta\tau) + B\varphi''(t+\theta\tau) + C\psi''(t+\theta\tau)] = 0$$

Звідси з умового (другого) проходження площі через дотичну точки M маємо $Af'(t)+B\varphi'(t)+C\psi'(t)=0$, а тому попередня рівність обертається в:

$$Af''(t+\theta\tau)+B\varphi''(t+\theta\tau)+C\psi''(t+\theta\tau)=0$$

В лінійному положенні, коли точка N наближається безмежно до точки M, вартість прямує до нуля, а через те умова рівнобіжності даної площі кривині й безмежно-близької дотичної лиш остаточно такий вигляд:

$$Af''(t)+B\varphi''(t)+C\psi''(t)=0$$

або:

$$Ax''+By''+Cz''=0$$

Це, як бачимо, є третя умова існування площі кривини, а тому можна твердити, що площа кривини є рівнобіжною до безмежно близької дотичної.

II. <u>Коли через точку дотичну провести сліпучо безмежно дотичний площ, то площа кривини є найближчою до безмежно близької до дотичної точки кривої</u>, себто це віддалення буде безмежно малою величиною порівняно найвищої можливости.

Хай безмежно близька до дотичної $M(x,y,z)$ буде точка $N(x_1,y_1,z_1)$ де $x_1=f(t+\tau)$ і т.д. Поведемо через точку M яку будь площу; тоді її рівняння можемо взяти вигляд:

$$A(X-x)+B(Y-y)+C(Z-z)=0$$

Віддалення не від неї точки N (як відомо з аналітичної геометрії) буде:

$$d = \frac{A(x_1-x) + B(y_1-y) + C(z_1-z)}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

Сполучимо A, B і C з обмеженні величини, що рівні не обертаються в нуль, а тому числом d зменшимо виключно від множника:

$$K = A(x_1-x) + B(y_1-y) + C(z_1-z)$$

Вставляючи в цього множника замість x і x_1, y і y_1, z і z_1 маємо:

$$K = A[f(t+\tau) - f(t)] + B[\varphi(t+\tau) - \varphi(t)] + C[\psi(t+\tau) - \psi(t)] = 0$$

А це за взором Тейлора обертається в:

$$K = [A f'(t) + B\varphi'(t) + C\psi'(t)]\tau + [A f''(t) + B\varphi''(t) + C\psi''(t)]\frac{\tau^2}{2!} +$$

$$+ [A f'''(t) + B\varphi'''(t) + C\psi'''(t)]\frac{\tau^3}{3!} + \dots$$

Для кожної площі, що переходить через дотичну маємо:

$$A f'(t) + B\varphi'(t) + C\psi'(t) = 0$$

а тому:

$$K = [A f''(t) + B\varphi''(t) + C\psi''(t)]\frac{\tau^2}{2!} + \dots$$

є другої малості, щодо τ. Але рівність:

$$A f''(t) + B\varphi''(t) + C\psi''(t) = 0$$

виконується лише для площі кривини й тоді

$$K = [A f'''(t) + B\varphi'''(t) + C\psi'''(t)]\frac{\tau^3}{3!} + \dots$$

є не менш 3-ої малості що-до τ.

Малим числом віддалення площі кривини від безмежно близької точки N є найменше.

§50. Головні прямовні (нормалі)

Ми вже говорили, що в точці M до кривої можемо повести безліч прямовних. З них одну, а

саме ту, що є грубою перехрестя площ прямової і кривини беруть за головну прямову (нормаль) (рис. 116)




Рис 116

Тепер площи зазначення головної прямової можемо виписати системою:

1) [рівняння прямової площі (69)]:

$$x'(X-x) + y'(Y-y) + z'(Z-z) = 0$$

2) [рівняння площі кривини - див. рів (75)]:

$$(y'z'' - y''z')(X-x) + (x''z' - x'z'')(Y-y) + (x'y'' - x''y')(Z-z) = 0$$

Перейдемо до напрямної форми рівняння головної прямової й для цього вилучимо з наших рівнянь по черзі z і y, а саме:

$$(X-x)(Az' - Cx') + (Y-y)(Bz' - Cy') = 0$$

$$(X-x)(Bx' - Ay') + (Z-z)(Bz' - Cy') = 0$$

де $A = y'z'' - y''z'$; $B = x''z' - x'z''$ і $C = x'y'' - x''y'$

Звідси:

$$X - x = \frac{Cy' - Bz'}{Az' - Cx'}(Y-y) = \frac{Cy' - Bz'}{Bx' - Ay'}(Z-z)$$

або:

$$\frac{X-x}{Cy' - Bz'} = \frac{Y-y}{Az' - Cx'} = \frac{Z-z}{Bx' - Ay'}$$

Обчислимо тепер кутові залежності, що є в знаменниках одержаного рівняння:

$$Cy' - Bz' = (x'y'' - x''y')y' - (x''z' - x'z'')z' = x'(y'y'' + z'z'') - x''(y'^2 + z'^2)$$

Ми знаємо, що:

$$ds = dt\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}, \text{ або } \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = s'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

А звідси:

$$y'^2 + z'^2 = s'^2 - x'^2$$

Взявши від обох частин похідну, ми одержимо

$$2y'y'' + 2z'z'' = 2s's'' - 2x'x''$$

або:

$$y'y'' + z'z'' = s's'' - x'x''$$

Перемінні вставляючи знайдені вартости у вирез: $Cy' - Bz'$, одержимо:

$$Cy' - Bz' = x'(s's'' - x'x'') - x''(s'^2 - x'^2) = -s'(s'x'' - s''x')$$

Аналогічно:

$$Az' - Cx' = -s'(s'y'' - s''y')$$

і $$Bx' - Ay' = -s'(s'z'' - s''z')$$

Тому рівняння головної прямової (після скорочення всіх його членів на $-s'$) буде:

$$\frac{X-x}{s'x'' - s''x'} = \frac{Y-y}{s'y'' - s''y'} = \frac{Z-z}{s'z'' - s''z'} \quad \ldots\ldots (78)$$

Означивши напрямні зчинники прямової через λ_n, μ_n і ν_n ми за відомими взорами аналітичної геометрії: $\lambda = \frac{m}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$ і т. д. складемо:

$$\left.\begin{aligned} \lambda_n &= \frac{s'x'' - s''x'}{\sqrt{(s'x'' - s''x')^2 + (s'y'' - s''y')^2 + (s'z'' - s''z')^2}}; \quad \mu_n = \frac{s'y'' - s''y'}{\sqrt{\Sigma(s'x'' - s''y')^2}} \text{ і} \\ \nu_n &= \frac{s'z'' - s''z'}{\sqrt{\Sigma(s'x'' - s''x')^2}} \end{aligned}\right\} \quad (79)$$

Припустім тепер, що за зчинника змінної t беремо s, тоді $t = s$; $s' = 1$; $s'' = 0$; $x' = \frac{dx}{ds}$; $x'' = \frac{d^2x}{ds^2}$; $y' = \frac{dy}{ds}$ і т. д. і маємо тоді:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{X-x}{\frac{d^2x}{ds^2}} = \frac{Y-y}{\frac{d^2y}{ds^2}} = \frac{Z-z}{\frac{d^2z}{ds^2}}, \text{ або:} \\ &\frac{X-x}{d^2x} = \frac{Y-y}{d^2y} = \frac{Z-z}{d^2z} \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots (80)$$

де d^2x, d^2y і т. д. є другі похідні через s, як невідомими. Через тему самої задачу ми одержимо й вторі напрямні множники головної прямової або функції від s, але невідомими, а саме:

$$\lambda_n = \frac{\frac{d^2x}{ds^2}}{\sqrt{\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{ds^2}\right)^2}}; \quad M_n = \frac{\frac{d^2y}{ds^2}}{\sqrt{\sum\left(\frac{d^2x}{ds}\right)^2}}; \quad \nu_n = \frac{\frac{d^2z}{ds^2}}{\sqrt{\sum\left(\frac{d^2x}{ds}\right)^2}} \quad \cdots (80)$$

Рівняння головної прямової (78) можна ще перетворити так:

$$\frac{X-x}{\frac{ds}{dt}\cdot\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{d^2s}{dt^2}\cdot\frac{dx}{dt}} = \frac{Y-y}{\frac{ds}{dt}\cdot\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{d^2s}{dt^2}\cdot\frac{dy}{dt}} = \frac{Z-z}{\frac{ds}{dt}\cdot\frac{d^2z}{dt^2} - \frac{d^2s}{dt^2}\cdot\frac{dz}{dt}}$$

Скоротивши всіх знаменників на dt^3 і зділивши їх на ds^2, матимемо:

$$\frac{X-x}{\frac{d^2x\,ds - d^2s\,dx}{ds^2}} = \frac{Y-y}{\frac{d^2y\,ds - d^2s\,dy}{ds^2}} = \frac{Z-z}{\frac{d^2z\,ds - d^2s\,dz}{ds^2}}$$

або:

$$\frac{X-x}{d\left(\frac{dx}{ds}\right)} = \frac{Y-y}{d\left(\frac{dy}{ds}\right)} = \frac{Z-z}{d\left(\frac{dz}{ds}\right)} \quad \cdots (81)$$

Але беручи на увагу, що напрямні множники дотичної:

$$\lambda = \frac{dx}{ds}; \quad M = \frac{dy}{ds}; \quad \nu = \frac{dz}{ds}$$

одержимо:

$$\frac{X-x}{d\lambda} = \frac{Y-y}{dM} = \frac{Z-z}{d\nu} \quad \cdots (82)$$

<u>Напрямні множники головної прямової є рівні з диференціалами напрямних множників дотичної.</u>

Повернемо тепер через дотичну нову площину, прямову до головної нормалі. Ця площина має окрему назву: <u>випрямної</u>.

Очевидно, що рівняння нормальної площі, як тої площі, що проходить через точку $M(x, y, z)$, прямовісно до дотичної (78) буде:

$$(X-x)(y'z''-y''z')+(Y-y)(z'x''-z''x')+(Z-z)(x'y''-x''y')=0 \quad \ldots\ldots (83)$$

або:

$$d\left(\frac{dx}{ds}\right)(X-x)+d\left(\frac{dy}{ds}\right)(Y-y)+d\left(\frac{dz}{ds}\right)(Z-z)=0 \quad \ldots\ldots (83a)$$

А коли за змінну береться s, то останнє рівняння випрямляючої площі в такому вигляді:

$$\frac{d^2x}{ds^2}(X-x)+\frac{d^2y}{ds^2}(Y-y)+\frac{d^2z}{ds^2}(Z-z)=0 \quad \ldots\ldots\ldots (83b)$$

Умовимося за додатний напрям головної нормалі вважати напрям від точки кривої у той бік випрямляючої площі, з якого лежить сама крива

§51 Співнормальна (бінормаль)

Умовимося ту пряму, що в будь-якій перетині нормальної площі з випрямляючою звати співнормальною (або бінормаллю). Очевидно, що співнормаль є пряма до площі кривини, а тому рівняння її можна легко скласти на основі попередніх міркувань, а саме: З аналітичної геометрії відомо, що рівняння прямої, що проходить через точку $K(x_1, y_1, z_1)$ і нормальної до даної площі $Ax+By+Cz+D=0$ буде: $\frac{x-x_1}{A}=\frac{y-y_1}{B}=\frac{z-z_1}{C}$. Тому рівняння співнормалі, що проходить через точку $M(x, y, z)$ прямовісно до площі кривини (75) або (76) матиме вигляд:

$$\frac{X-x}{y'z''-y''z'}=\frac{Y-y}{z'x''-z''x'}=\frac{Z-z}{x'y''-x''y'} \quad \ldots\ldots (84)$$

або:

$$\frac{X-x}{dy\,d^2z-d^2y\,dz}=\frac{Y-y}{dz\,d^2x-d^2z\,dx}=\frac{Z-z}{dx\,d^2y-d^2x\,dy} \quad \ldots (85)$$

Означимо величини напрямних зміщень співпрямової через $\lambda_в$, $M_в$, $N_в$. Очевидно, що величини цих зміщень будуть:

$$\left.\begin{aligned} \lambda_в &= \frac{y'z''-y''z'}{\sqrt{\Sigma(y'z''-y''z')^2}} \qquad M_в = \frac{z'x''-z''x'}{\sqrt{\Sigma(y'z''-y''z')^2}} \\ \text{і } N_в &= \frac{x'y''-x''y'}{\sqrt{\Sigma(y'z''-y''z')^2}} \end{aligned}\right\} \ldots (86)$$

Кожний хвіст через точку M кривої переходить при взаємно прямових простих: дотична T, прямова N і співпрямова B і три взаємно прямовимі площі: дотичальна (прилегла) NMT, прямова NMB і випростальна TMB. Будемо всюди ці прості й площі беруть за координатні, причому напрям співпрямової B вибирається так, щоб при застосуванні, раніше уведеними умовами, напрямах T і N напрям B відповідав третій осі координат.





Рис. 117.

Звичайно, за додатний напрям співпрямової вважається той, коли перед коріннем в знаменнику виразів $\lambda_в$, $M_в$, $N_в$ стоїть знак +.

Установивши додатний напрям співпрямової, ми тим самим установили який бік площі кривини будемо звати додатнім, а який від-

кинця. А саме, коли ми рухаємося вздовж спів-
напрямної в додатному напрямі її, то ми переходимо з від'ємного боку площі кривини на додатний і навпаки (рис. 118 а, б).



§52. Кривина просторової кривої.

Нам відомо, що кривина елемента дуги кривої зветься межа відношення кута суміжності до дугового елементу дуги. Ця дуга вибирається колом кривини, що переходить через відповідні три безмежно близькі точки даного дугового.
Але ці три безмежно близькі точки також визначають і площу кривини. Тому кожне коло кривини для якої-будь точки кривої завжди лежить на відповідній площі кривини. Коли крива (яку ми раніш досліджували) є плоскою, то площі кривини для всіх її точок будуть зливатися в одну площу, себто у площу самої кривої. Тоді для дослідження кривини кривої досить знайти відповідні лише кривини для певних точок кривої. Інакше, коли крива просторова. Тоді площі кривини не зливаються в одну, а для кожного нового елемента дуги (для кожної нової тройки безмежно близьких точок) ми будемо мати окрему площу кривини, що лежатиме в просторі під

ялись кутом до суміжної собі площі кривини. Разом з цим і кола кривини не лежатимуть в одній площі. Степень відхилення площ кривин (а разом і кол кривин) ми будемо звати кручением кривої. Очевидно, що для дослідження просторової кривої мало знати лише кривину кривої, а треба дослідити й степень кручення її при даній точці. Зупинімося попереду на більш детальному вивченню кривин й для цього візьмімо на даній кривій якусь точку $M(x, y, z)$ і досить близько до неї другу точку N, що будемо її невпинно наближувати до M. Дотичні в цих точках, як будуть вони перехрещ[ую]ться, як-небудь створять якийсь кут φ (кут суміжності). Отже відношення кута φ до довжини дуги MN будемо звати середньою кривиною даної кривої. Коли ми візьмемо межу цього відношення, при умові що N безмежно наближається до M (себто дуга MN простує до нуля), то ця межа звається справжньою кривиною або просто кривиною даної кривої. Зворотню величину кривини $k = \frac{1}{\rho}$ будемо звати радіусом кривини.




Рис. 119

Щоб визначити кут φ між дотичними суміжности, як повеземо з початку осей двоє вектори рівнобіжні до даних дотичних. Хай вони будуть

Om і On. А далі хорди рівних лінійних одиниць відкладемо навколо початку кулю. Коли б ми з початку координат повели б хорди рівнобіжні до кожної дотичної в усіх точках кривої по черзі, то кінці цих хорд утворили б на поверхні кулі криву ab (рис. 119) відповідно до даної кривої AB. Ця крива лежить вся своїми точками на поверхні даної кулі й має назву <u>сферичної індикатриси</u> дотичних до даної кривої. Для кожної дуги AB кривої завжди відповідатиме дуга ab індикатриси і коли якась дуга з кривої матиме приріст $\Delta\sigma$, то відповідна їй дуга індикатриси б матиме приріст $\Delta\beta$.

Розглянемо тепер хорду mn, що відповідає дузі $\overset{\frown}{MN}$ індикатриси m₁. Ми маємо рівнобедрений Δ Omn; спустивши в ньому висоту Ok і розглянувши один з утворених прямокутних трикутників, одержимо:

$$\overline{mn} = 2\,Om \sin\frac{\varphi}{2}$$

Але Om = r кулі = 1, а тому:

$$\overline{mn} = 2\sin\frac{\varphi}{2}.$$

З другого боку означимо напрямні зчіпних дотичної MS, а тому й вектора Om через λ, μ і ν. Очевидно, що точці N взято так близько до M, що напрямні зчіпних дотичної в цій точці, а разом і напрямні зчіпних вектора On можна вважати рівними: $\lambda+\Delta\lambda$; $\mu+\Delta\mu$ і $\nu=\nu+\Delta\nu$.

Хай початок точки m будуть x, y, z, а точки n – x_1, y_1, z_1. Тоді $x = Om.\lambda = \lambda$ (бо Om = 1); analogo-

нехай $y = \mu$; $z = \nu$; $x_1 = \lambda + \Delta\lambda$; $y_1 = \mu + \Delta\mu$ і $z_1 = \nu + \Delta\nu$

Отже:

$$mn = \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + (z_1 - z)^2} = \sqrt{\Delta\lambda^2 + \Delta\mu^2 + \Delta\nu^2}$$

Маємо також:

$$\sqrt{\Delta\lambda^2 + \Delta\mu^2 + \Delta\nu^2} = 2\sin\tfrac{\varphi}{2}$$

Але нам відомо, що:

$$\lim_{\varphi \to 0} \frac{2\sin\frac{\varphi}{2}}{\varphi} = \lim_{\varphi \to 0} \frac{\sin\frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}} = 1, \text{ або } \lim_{\varphi \to 0} \varphi = \lim_{\varphi \to 0} 2\sin\tfrac{\varphi}{2} = \sqrt{\Delta\lambda^2 + \Delta\mu^2 + \Delta\nu^2}$$

А тому кривина K буде рівна:

$$K = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\varphi}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\sqrt{\Delta\lambda^2 + \Delta\mu^2 + \Delta\nu^2}}{\Delta s}$$

де Δs є елемент дуги MN. Звідси ділимо чисельник і знаменник на Δt, маємо:

$$K = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\mu}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\nu}{\Delta t}\right)^2}}{\frac{\Delta s}{\Delta t}} = \frac{\sqrt{\lambda'^2 + \mu'^2 + \nu'^2}}{s'} \qquad (a)$$

або:

$$K = \sqrt{\left(\frac{d\lambda}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\mu}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\nu}{ds}\right)^2} \quad \ldots \quad (b)$$

А звідси рад кривини буде:

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{d\lambda}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\mu}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\nu}{ds}\right)^2}} \quad \ldots \ldots \quad (87)$$

Рад кривини ρ будемо вважати завжди додатним.

Ми маємо, що $\lambda = \frac{dx}{ds} = \frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{ds}{dt}} = \frac{x'}{s'}$; $\mu = \frac{y'}{s'}$; $\nu = \frac{z'}{s'}$, а тому:

$$\lambda' = \frac{x''s' - x's''}{s'^2} \quad \mu' = \frac{y''s' - y's''}{s'^2} \quad \nu = \frac{z''s' - z's''}{s'^2}$$

Вставляючи ці вартости у вірш (a) маємо:

$$K = \frac{\sqrt{(x''s' - x's'')^2 + (y''s' - y's'')^2 + (z''s' - z's'')^2}}{s'^3} \quad \ldots \ldots \quad (88)$$

Перетворимо цей вірш так, щоб мати вираз кривини через змінні точки дотичної

Маємо:

$$\sqrt{\Sigma(x''s' - x's'')^2} = \sqrt{s'^2(x''^2 + y''^2 + z''^2) - 2s's''(x'x'' + y'y'' + z'z'') + s''^2(x'^2 + y'^2 + z'^2)}$$

Ми знаємо, що $x'^2 + y'^2 + z'^2 = s'^2$, а диференціюючи цю рівність (після скорочення на 2) маємо:

$$x'x'' + y'y'' + z'z'' = s's''$$

Далі вставляючи знайдені вартості в рівність (88) одержимо:

$$\sqrt{s'^2(x''^2 + y''^2 + z''^2) - 2s'^2s''^2 + s''^2s'^2}, \text{ або:}$$

$$\sqrt{s'^2(x''^2 + y''^2 + z''^2) - s'^2s''^2}$$

Тепер зробимо вставку наверху:

$$s'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \text{ і } s's'' = x'x'' + y'y'' + z'z''$$

і під радикалом одержимо:

$$(x'^2 + y'^2 + z'^2)(x''^2 + y''^2 + z''^2) - (x'x'' + y'y'' + z'z'')^2 = x'^2x''^2 + x'^2y''^2 + x'^2z''^2 + y'^2x''^2 + y'^2y''^2 + y'^2z''^2 + z'^2x''^2 + z'^2y''^2 + z'^2z''^2 - x'^2x''^2 - y'^2y''^2 - z'^2z''^2 - 2x'y'x''y'' - 2x'z'x''z'' - 2y'z'y''z'' = (x'y'' - x''y')^2 + (z'x'' - x'z'')^2 + (y'z'' - z'y'')^2$$

Маємо також:

$$K = \frac{\sqrt{(x'y'' - x''y')^2 + (z'x'' - z''x')^2 + (y'z'' - z'y'')^2}}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}}$$

А звідси:

$$\rho = \frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}}{\sqrt{\Sigma(x'y'' - x''y')^2}} \quad \ldots\ldots (89)$$

Коли б змінна t вважати рівною s, тоді вір (A) мав би вигляд:

$$K = \sqrt{x''^2 + y''^2 + z''^2} \text{ або } \rho = \frac{1}{\sqrt{x''^2 + y''^2 + z''^2}}$$

або: $\frac{dx}{ds} = x'$, то $x'' = \frac{d}{ds}\left(\frac{dx}{ds}\right) = \frac{dx^2}{ds^2}$, а тому:

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\frac{d^2x}{ds^2} + \frac{d^2y}{ds^2} + \frac{d^2z}{ds^2}}} \quad \ldots\ldots (90)$$

Отже, прийнявши під увагу взір (88), маємо:

$$\lambda_n = \pm\rho\frac{d^2x}{ds^2}; \qquad \mu_n = \pm\rho\frac{d^2y}{ds^2}; \qquad \nu_n = \rho\frac{d^2z}{ds^2}$$

(коли незалежною є дуга s). Ми бачимо, що рух кривини лежить на головній нормалі.

Відкладемо вартість ρ вздовж головної нормалі у бік додатний від точки дотику $M(x, y, z)$. Тоді ми одержимо центр кривини $O(a, b, c)$. Обчислимо значення a, b, c цього центру кривини. (рис. 120.) Відтинок $OM = \rho$ спроектуємо на осі координат і матимемо:

$$\rho_x = a - x = \rho\lambda_n$$

$$\rho_y = b - y = \rho\mu$$

$$\rho_z = c - z = \rho\nu$$




Рис. 120

А звідси:

$$a = x + \rho\lambda_n; \quad b = y + \rho\mu_n; \quad c = z + \rho\nu_n \quad \ldots (91)$$

Ми бачимо, що це коло кривини переходить через 3 безмежно близькі дотику точки, а ці точки можемо вибирати також в площі кривини, а тому коло кривини лежить в площі кривини. Коли ми поведемо через центр пряму до площі кривини, то цей пряма називається вісю кривини й буде рівнобіжний до співнормалі (до бінормалі).

§53 Кручення кривої.

Зараз ми розглядали кривизну кривої в

даній точці кожної площі кривої. Іншими словами ми розглядали певний елемент дуги кривої, що лежить в даній площі кривої і вважали цей елемент за плоский. Коли б уся крива була плоскою, то вона вміщалася б у спільній площі кривої й тоді всі осі кривої (а разом і співпрямлова) були б рівнобіжні, як прямі до одної площі. Коли ж ми маємо просторову (не плоску криву), то для кожної нової точки її буде своя площа кривої, що складатиме з попередньою певний кут. Цей кут буде показувати, як закручується крива відходячи від площі, в якій перед тим лежала. Тому кут між двома сусідніми площами кривої будемо звати кутом кручення (рис. 121) кривої і означимо його через θ. Аналогічно з визначенням кривини ми будемо звати відношення кута кручення до дуги між точками M і N (точками, що досліджуємо) перерізним кручення кривої, а межу цього відношення, коли точка N наближається безмежно близько до M, себто, коли елемент дуги кривої прямує до нуля ($\Delta s \to 0$), називатимемо справжнім кручення кривої при точці M, або просто кручення кривої в точці M.




Рис. 121

Визначимо кут кручення. Поставимо до даної площі кривої прямі в точках її дотику (співпрямлові). Очевидно, що кут між цими співпрямловими буде рівний із кутом між площами кривих.

а тому ми знаходимо кут між цими двома площинами кривини, замінивши кут між цими двома відповідними для них співпрямовими. (Рис 121)

Означимо кривину даного елементу дуги через К. Моді:

$$K = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Theta}{\Delta s}$$

Поведемо тепер з початку осей кулі вектори ОК і ОL (рис. 122), рівнобіжні до співпрямових MB і NB$_1$ і кулю рівних одиниці очертимо круг центру кулю. Очевидно, що коли в околиці точки дуги кривої AB будуть співпрямові й поведемо з початку координат рівнобіжні їм вектори, то останні утворять на кулі криву ав, як геометричний осередок кінців цих векторів. Ця крива зветься кутового або сферичного індикатриси співпрямових кривої. Міркуючи цілком аналогічно з попереднім доводом, ми дійдемо до виразу подібному (а) попереднього §, а саме:




Рис. 122.

$$K = \frac{\sqrt{\lambda_b'^2 + \mu_b'^2 + \nu_b'^2}}{s'} \quad \ldots (1)$$

або:

$$K = \frac{\sqrt{d\lambda_b^2 + d\mu_b^2 + d\nu_b^2}}{ds} \quad \ldots (2)$$

Але:

$$\lambda_b = \frac{y'z'' - y''z'}{\sqrt{\Sigma(y'z'' - y''z')^2}} \quad \text{і т. д.} \quad \ldots (3)$$

де: $\Sigma(y'z'' - z'y'')^2 = (y'z'' - y''z')^2 + (z'x'' - z''x')^2 + (x'y'' - y'x'')^2$

Отметим для сокращения:

$y'z'' - y''z' = A$; $z'x'' - z''x' = B$; $x'y'' - y'x'' = C$. тогда:

$$\lambda_b = \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}; \quad \mu_b = \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}; \quad \nu_b = \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} \quad \ldots (4)$$

А потому:

$$\lambda_b' = \frac{A'(A^2+B^2+C^2) - A(AA'+BB'+CC')}{(A^2+B^2+C^2)^{3/2}} \quad \ldots (5^a)$$

Аналогично:

$$\mu_b' = \frac{B'(A^2+B^2+C^2) - B(AA'+BB'+CC')}{(A^2+B^2+C^2)^{3/2}} \quad \ldots (5^b)$$

и $$\nu_b' = \frac{C'(A^2+B^2+C^2) - C(AA'+BB'+CC')}{(A^2+B^2+C^2)^{3/2}} \quad \ldots (5^c)$$

Отсюда:

$$\lambda_b'^2 + \mu_b'^2 + \nu_b'^2 = \frac{(A^2+B^2+C^2)^2(A'^2+B'^2+C'^2) + (A^2+B^2+C^2)(AA'+BB'+CC')^2}{(A^2+B^2+C^2)^3} -$$

$$- \frac{2(A^2+B^2+C^2)(AA'+BB'+CC')^2}{(A^2+B^2+C^2)^3}.$$

Або, роблячи зведення й скорочення на $(A^2+B^2+C^2)$, маємо:

$$\lambda_b'^2 + \mu_b'^2 + \nu_b'^2 = \frac{(A^2+B^2+C^2)(A'^2+B'^2+C'^2) - (AA'+BB'+CC')^2}{(A^2+B^2+C^2)^2} =$$

$$= \frac{(BC'-CB')^2 + (CA'-A'C)^2 + (AB'-A'B)^2}{(A^2+B^2+C^2)^2} \quad \ldots (6)$$

Обчислимо окремо $BC'-CB'$:

$$B' = (z'x'' - x'z'')' = z''x'' + z'x''' - x''z'' - x'z''' = z'x''' - x'z'''$$

Маємо:

$$C' = (x'y'' - x''y')' = x'y''' - x'''y'$$

тому:

$$BC' - CB' = (z'x'' - x'z'')(x'y''' - x''y') - (x'y'' - x''y')(z'x''' - x'z''') =$$

$$= x'z'x''y''' - y'z'x''x''' - x'^2z''y''' + x'y'z''x''' - x'z'y''x''' + x'^2y''z''' +$$

$$+ y'z'x''^2y''' - x'y'x''z''' = x'[x'y''z''' + y'z''x''' + z'x''y''' - z'y''x''' - y'x''z''' -$$

$$-x'z''y'''] = x'\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix} = x'\cdot\Delta$$

Аналогічно:

$$CA' - AC' = y'\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix} = y'\Delta \;\text{і}\; AB' - BA' = z'\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix} = z'\cdot\Delta$$

Отже:

$$\lambda_0'^2 + \mu_0'^2 + \nu_0'^2 = \frac{(x'^2 + y'^2 + z'^2)\Delta^2}{[\Sigma(y'z'' - y''z')]^2} = \frac{s'^2\cdot\Delta^2}{[\Sigma(y'z'' - y''z')]^2} \quad \ldots\ldots(7)$$

А звідси:

$$\mathcal{K} = \frac{x'\Delta}{s'^2\Sigma(y'z'' - y''z')^2} = \frac{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}}{\Sigma(y'z'' - y''z')^2}$$

Таким чином ми коли кручення буде:

$$\tau = \frac{\Sigma(y'z'' - y''z')^2}{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}} \quad \ldots\ldots\ldots(22)$$

Умовимося, що коли τ додатне, то кручення кривої йде з правої руки до лівої, для спостерігача, що стоїть вздовж підрядкової й навпаки.

§54. Взори Френе (Serret).

Щоб установити залежність між напрямами дотичної, головної прядкової й співпрядкової, а також установити вік (знак) кручення, ми доведемо дуже важні взори Френе.

I. Ми вже знаємо, що 1) напрямні зміннини дотичної [взір (67)]: $\lambda = \frac{dx}{ds} = \frac{x'}{s'}$; $\mu = \frac{y'}{s'}$ і $\nu = \frac{z'}{s'}$ ...(1)

2) напрямні зміннини головної прядкової [взір (79)]

$$\lambda_n = \frac{s'x'' - s''x'}{\sqrt{\Sigma(s'x'' - s''x')^2}};\ \mu_n = \frac{s'y'' - s''y'}{\sqrt{\Sigma(s'x'' - s''x')^2}};\ \nu_n = \frac{s'z'' - s''z'}{\sqrt{(s'x'' - s''x')^2}} \quad \ldots\ldots(2)$$

і наприкінці:

$$\rho = \frac{s'^3}{\sqrt{\Sigma(s'x'' - s''x')^2}} \quad \text{(див. вище ??)} \quad \ldots\ldots (3)$$

Зі виразів (2) визначимо $u = \sqrt{\Sigma(s'x'' - s''x')^2}$, а саме:

$$u = \frac{s'x'' - s''x'}{\lambda_n}; \quad u = \frac{s'y'' - s''y'}{\mu_n} \text{ і } u = \frac{s'z'' - s''z'}{\nu_n}$$

і вставимо їх у вираз для ρ (3). Тоді матимемо:

$$1)\ \rho = \frac{\lambda_n s'^3}{s'x'' - s''x'}; \quad 2)\ \rho = \frac{\mu_n s'^3}{s'y'' - s''y'} \quad 3)\ \rho = \frac{\nu_n s'^3}{s'y'' - s''z'}.$$

Але, взявши від виразів (1) перші похідні маємо, маємо:

$$\lambda' = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{s'x'' - s''x'}{s'^2}; \quad \mu' = \frac{d\mu}{dt} = \frac{s'y'' - s''y'}{s'^2}; \quad \nu' = \frac{d\nu}{dt} = \frac{s'z'' - s''z'}{s'^2}$$

А звідси:

$s'x'' - s''x' = \lambda' s'^2$; $s'y'' - s'y' = \mu' s'^2$; $s'z'' - s''z' = \nu' s'^2$. Тому:

$$\rho = \frac{\lambda_n s'}{\lambda'}; \quad \rho = \frac{\mu_n s'}{\mu'} \quad \text{і} \quad \rho = \frac{\nu_n s'}{\nu'}$$

або:

$$\frac{\lambda'}{s'} = \frac{\lambda_n}{\rho}; \quad \frac{\mu_1}{s'} = \frac{\mu_n}{\rho}; \quad \frac{\nu_1}{s'} = \frac{\nu_n}{\rho}$$

Звідси остаточно, (скорочуючи λ' і s' і т.д на dt), маємо:

$$\lambda_n = \rho \frac{d\lambda}{ds}; \quad \mu_n = \rho \frac{d\mu}{ds} \text{ і } \nu_n = \rho \frac{d\nu}{ds} \quad \ldots\ldots (93)$$

<u>Це є перша група виразів Серре.</u>

<u>II Властивість натуральних залишків головної прямової.</u>

Ми мали рівняння головної прямової: (78)

$$\frac{X - x}{s'x'' - s''x'} = \frac{Y - y}{s'y'' - s''y'} = \frac{Z - z}{s'z'' - s''z'}$$

Вставивши вартості s' і s'' і перетворивши це рів-
няння до другого вигляду:

$$s'x'' - s''x' = \frac{s'^2x'' - s's''x'}{s'},$$

але $s'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$; $s's'' = x'x'' + y'y'' + z'z''$. тому:

$$s'x'' - s''x' = \frac{1}{s'}\left[x'^2x'' + y'^2x'' + z'^2x'' - x'^2x'' - x'y'y'' - z'z''x'\right] =$$

$$= \frac{1}{s'}\left[y'(y'x'' - x'y'') + z'(z'x'' - z''x')\right] = \frac{M}{s'}$$

Аналогічні вздри застосовано й для:

$$s'y'' - s''y' = \frac{1}{s'}\left[z'(z'y'' - z''y') + x'(x'y'' - x''y')\right] = \frac{N}{s'},$$

$$s'z'' - s''z' = \frac{1}{s'}\left[x'(x'z'' - x''z') + y'(y'z'' - y''z') = \frac{P}{s'}.$$

Вставляючи ці вартості в рівняння прямової, та скорочуючи на s', матимемо:

$$\frac{x-x}{M} = \frac{y-y}{N} = \frac{z-z}{P}$$

З другого боку ми маємо, що: [взір (5) попер. §]

$$\lambda_b' = \frac{A'(A^2+B^2+C^2) - A(AA'+BB'+CC')}{(A^2+B^2+C^2)^{3/2}}$$

і т. д. З цих маємо:

$$\lambda_b' = \frac{A'A^2 + A'B^2 + A'C^2 - A^2A' - ABB' - ACC'}{(A^2+B^2+C^2)^{3/2}} \text{ і т. д.}$$

а тому:

$$\lambda_b' = \frac{C(A'C - AC') - B(AB' - A'B)}{(A^2+B^2+C^2)^{3/2}} \text{ і т. д.}$$

Користуючись перетвореннями з попереднього §, а саме:

$$A = (y'z'' - y''z'); \quad B = z'x'' - z''x' \text{ і } C = x'y'' - y'x''$$

і $A'C - AC = y'\Delta$; $AB' - A'B = z'\Delta$; $BC' - CB' = x'\Delta$,

$$\text{де } \Delta = \begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}$$

маємо:

$$\lambda'_b = \frac{Cy' - Bz'}{\Sigma(y'z'' - y''z')^{3/2}} \cdot \Delta = -\frac{Bz' - Cy'}{\Sigma(y'z'' - z'y'')^{3/2}} \cdot \Delta$$

Аналогічно:

$$M'_b = \frac{Cx' - Az'}{\Sigma(y'z'' - y''z')^{3/2}} \Delta$$

і $$\nu'_b = \frac{Ay' - Bx'}{\Sigma(y'z'' - z'y'')^{3/2}} \cdot \Delta$$

А звідси:

$$\lambda'_b = -\frac{z'(z'x'' - x'z'') - y'(x'y'' - y'x'')}{K} = -\frac{y'(y'x'' - x'y'') + z'(z'x'' - x'z'')}{K} = -\frac{M}{K}$$

де $$K = \frac{\Delta}{\Sigma(y'z'' - z'y'')^{3/2}}$$

Аналогічно:

$$M'_b = -\frac{N}{K}\ ; \qquad \nu'_b = -\frac{P}{K}$$

Звідси: $M = -K\lambda'_b$; $N = -KM'_b$; $P = -K\nu'_b$

Нарешті, вставляючи ці вартості в рівняння прямової й скорочуючи на $-K$, маємо:

$$\frac{x - x}{\lambda'_b} = \frac{y - y}{M'_b} = \frac{z - z}{\nu'_b}$$

або:

$$\frac{x - x}{d\lambda_b} = \frac{y - y}{dM_b} = \frac{z - z}{d\nu_b} \quad \ldots\ldots (94)$$

Рівняння (94) приводять нас до дуже важливого висновку, а саме:

Напрями дотичних головної прямової пропорційні:

1) (рів. 82) похідні (диференціяли) напрямних дотичних;

2) (рів. 93) похідні (диференціяли) напрямних

<u>змінних співвісьової.</u>

Тепер перейдемо до доводу другої пари теорем Серре-Френе.

III Коли ми маємо, що напрями змінних головної нормалевої пропорційні диференціялам напрямних змінних співвісьової, то можемо записати:

$$\lambda_n = q\,d\lambda_b \;;\; \mu_n = q\,d\mu_b \;;\; \nu_n = q\,d\nu_b,$$

де q невідомий нам сталий пропорційності. Щоб його визначити підносимо до квадрату всі рівності й додамо їх. Тоді:

$$\lambda_n^2 + \mu_n^2 + \nu_n^2 = q^2\left(d\lambda_b^2 + d\mu_b^2 + d\nu_b^2\right).$$

Але сума квадратів напрямних змінних одного й того ж вектора = рівна з одиницею, а тому:

$$1 = q^2\left(d\lambda_b^2 + d\mu_b^2 + d\nu_b^2\right)$$

а звідси:

$$q = \pm \frac{1}{\sqrt{d\lambda_b^2 + d\mu_b^2 + d\nu_b^2}}$$

або (див. взір (2) попер. §) наприклад:

$$q = \pm \frac{1}{K\,ds} = \pm \frac{r}{ds} \quad (\text{де } r = \text{пр. кручення})$$

Таким чином маємо <u>другу групу взорів Френе.</u>

$$\lambda_n = r\frac{d\lambda_b}{ds} \;;\; \mu_n = r\frac{d\mu_b}{ds} \;;\; \nu_n = r\frac{d\nu_b}{ds} \quad \ldots\ldots (9\Sigma)$$

При тому беремо лише (+), що вставляємо знак додаткового кручення.

Візьмім просторову криву й при деякій точці збудуємо головний трисічний кут, що тво-

рится площами: 1) кривини 2) дотичної й бінормальної (рис. 123) і візьмемо цю систему за нову координатну. Хай кути нових осей зі старими будуть:

дотичної T: λ, μ і ν

головної N: λ_n, μ_n і ν_n

бінормальної B: λ_b, μ_b і ν_b




Рис. 123.

Із аналітичної геометрії відомо, що ці 9 кутів будуть зв'язані між собою таке:

	x	y	z
T	λ	μ	ν
N	λ_n	μ_n	ν_n
B	λ_b	μ_b	ν_b

I Із властивості суми квадратів напрямних косинусів:

а) нових через старі:

1) $\lambda^2+\mu^2+\nu^2=1$ 2) $\lambda_n^2+\mu_n^2+\nu_n^2=1$; 3) $\lambda_b^2+\mu_b^2+\nu_b^2=1$

б) старих до нових:

1) $\lambda^2+\lambda_n^2+\lambda_b^2=1$; 2) $\mu^2+\mu_n^2+\mu_b^2=1$; 3) $\nu^2+\nu_n^2+\nu_b^2=1$

II Із умови прямовісності: а) нових між собою:

1) $\lambda\lambda_n+\mu\mu_n+\nu\nu_n=0$; 2) $\lambda\lambda_b+\mu\mu_b+\nu\nu_b=0$; 3) $\lambda_n\lambda_b+\mu_n\mu_b+\nu_n\nu_b=0$

б) старих між собою:

1) $\lambda\mu+\lambda_n\mu_n+\lambda_b\mu_b=0$; 2) $\lambda\nu+\lambda_n\nu_n+\lambda_b\nu_b=0$; 3) $\mu\nu+\mu_n\nu_n+\mu_b\nu_b=0$

Візьмемо тепер підрозділ головну прямову. Її напрямні косинуси зв'язані рівняннями:

$$1)\ \lambda_n^2+\mu_n^2+\nu_n^2=1 \quad (\text{I а, 2})$$

і (умова прямовісності до дотичної й бінормальної)

$$2)\ \lambda\lambda_n+\mu\mu_n+\nu\nu_n=0 \quad (\text{II, а, 1})$$

$$3)\ \lambda_b\lambda_n+\mu_b\mu_n+\nu_b\nu_n=0 \quad (\text{II, а, 3})$$

Продиференціюємо їх і дістанемо:

I) $\lambda_n \lambda'_n + \mu_n \mu'_n + \nu_n \nu'_n = 0$

II) $(\lambda' \lambda_n + \mu' \mu_n + \nu' \nu_n) + (\lambda \lambda'_n + \mu \mu'_n + \nu \nu'_n) = 0$

III) $(\lambda'_6 \lambda_n + \mu'_6 \mu_n + \nu'_6 \nu_n) + (\lambda_6 \lambda'_n + \mu_6 \mu'_n + \nu_6 \nu'_n) = 0$

Ако за 1ми низок бројева среме (93) имамо:

$$\lambda_n = \rho \frac{d\lambda}{ds}, \text{ або } \lambda_n = \rho \frac{\lambda'}{s'}$$

а извиди:

$$\lambda' = \frac{\lambda_n s'}{\rho}$$

замену:

II) $\left(\frac{\lambda_n^2 s'}{\rho} + \frac{\mu_n^2 s'}{\rho} + \frac{\nu_n^2 s'}{\rho}\right) + (\lambda \lambda'_n + \mu \mu'_n + \nu \nu'_n) = 0$

або:

$\lambda \lambda'_n + \mu \mu'_n + \nu \nu'_n = -\frac{s'}{\rho}(\lambda_n^2 + \mu_n^2 + \nu_n^2)$. Онако:

$$\lambda \frac{d\lambda_n}{ds} + \mu \frac{d\mu_n}{ds} + \nu \frac{d\nu_n}{ds} = -\frac{1}{\rho} \ldots (\alpha)$$

Исто само за другога низок бројева среме (95) имамо:

$$\lambda_n = \tau \frac{d\lambda_6}{ds} = \tau \frac{\lambda'_6}{s'} \text{ и т. д.}$$

а извиди:

$$\lambda'_6 = \frac{\lambda_n s'}{\tau} \text{ и т. д.}$$

замену (III)

$$\left(\frac{\lambda_n^2 s'}{\tau} + \frac{\mu_n^2 s'}{\tau} + \frac{\nu_n^2 s'}{\tau}\right) + (\lambda_6 \lambda'_n + \mu_6 \mu'_n + \nu_6 \nu'_n) = 0$$

А извиди:

$$\lambda_6 \lambda'_n + \mu_6 \mu'_n + \nu_6 \nu'_n = -\frac{s'}{\tau} \quad (\text{бо } \lambda_n^2 + \mu_n^2 + \nu_n^2 = 1)$$

замену:

$$\lambda_6 \frac{d\lambda_n}{ds} + \mu_6 \frac{d\mu_n}{ds} + \nu_6 \frac{d\nu_n}{ds} = -\frac{1}{\tau} \ldots (\beta)$$

Имамо само исто имено имену:

I) $\lambda_n \frac{d\lambda_n}{ds} + \mu_n \frac{d\mu_n}{ds} + \nu_n \frac{d\nu_n}{ds} = 0$ — [ова добијамо ако извршимо скалирање на s' и потом скалирамо на $dt = \frac{\lambda'_n}{s'} = \frac{d\lambda_n}{ds}$]

II) $\lambda \frac{d\lambda_n}{ds} + \mu \frac{d\mu_n}{ds} + \nu \frac{d\nu_n}{ds} = -\frac{1}{\rho}$ (α)

III) $\lambda_6 \frac{d\lambda_n}{ds} + \mu_6 \frac{d\mu_n}{ds} + \nu_6 \frac{d\nu_n}{ds} = -\frac{1}{\tau}$ (β)

де знаходимо з: $\frac{d\lambda_n}{ds}$, $\frac{d\mu_n}{ds}$ і $\frac{d\nu_n}{ds}$

Множимо рівняння I) на λ_n, II на λ і III на λ_β і складаємо:

$$\left(\lambda_n^2+\lambda^2+\lambda_\beta^2\right)\frac{d\lambda_n}{ds}+\left(\lambda_n\mu_n+\lambda\mu+\lambda_\beta\mu_\beta\right)\frac{d\mu_n}{ds}+\left(\lambda_n\nu_n+\lambda\nu+\lambda_\beta\nu_\beta\right)\frac{d\nu_n}{ds}=-\left(\frac{\lambda}{\rho}+\frac{\lambda_\beta}{r}\right)$$

Звідси [беручи під увагу рівності: а) (I, б, 1); б) (II, б, 1) і в) (III, б, 2)] маємо:

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\lambda_n}{ds}&=-\left(\frac{\lambda}{\rho}+\frac{\lambda_\beta}{r}\right)\\ \text{Аналогічно:}\quad \frac{d\mu_n}{ds}&=-\left(\frac{\mu}{\rho}+\frac{\mu_\beta}{r}\right)\\ \text{і}\quad \frac{d\nu_n}{ds}&=-\left(\frac{\nu}{\rho}+\frac{\nu_\beta}{r}\right)\end{aligned}\right\}\ldots\ldots(96)$$

Це є <u>третя низка взорів Серре-Френе.</u>

<u>Приклад.</u> Визначити циліндрову лінію рівнянням лінії:

$$x=a\cos t;\quad y=a\sin t;\quad z=\frac{ht}{2\pi}$$

[Вибір цього рівняння відомий диференціальній геометрії: циліндрова лінія утворюється, коли на циліндрову поверхню (радіуса a) ми будемо накладати прямокутний трикутник з прямими $PK=2\pi a$ (обвід поперечного перерізу циліндра) і $KL=h$, що звичайно ходом, або кроком циліндра. Значить лінія буде точки $M(x,y,z)$ визначатимуться з ΔBOM: $x=a\cos t$; з ΔAOM: $y=a\sin t$ і, нарешті, $z=MN$. Але MN на розгортці відповідає $M'N'$, а дуга NP відповідає дузі PN'. Коли радіус a, то дуга NP в кругових мірах буде at,




Рис. 124

тому й $PN' = at$. Отже з $\Delta PM'N'$ маємо: $z = MN = at \cdot tg\alpha$, але з ΔZPK $tg\alpha = \frac{h}{2\pi a}$, тому $MN = z = \frac{th}{2\pi}$].

I) Визначимо попередньо ρ — кут кривини гвинтової лінії. Беручи на увагу, що $\frac{d\lambda}{ds} = \frac{\lambda'}{s'}$ (коли λ і s є функціями t), ми експериментуємо першою низкою формул Френе в такому вигляді:

$$\lambda_n = \rho\frac{\lambda'}{s'} \; ; \quad \mu_n = \rho\frac{\mu'}{s'} \; ; \quad \nu_n = \rho\frac{\nu'}{s'} \quad \ldots\ldots (d)$$

де λ, μ і ν, як напрями змінної дотичної, є рівні:

$\lambda = \frac{x'}{s'}$; $\mu = \frac{y'}{s'}$; $\nu = \frac{z'}{s'}$, але $x' = -a\sin t$, $y' = a\cos t$ і $z' = \frac{h}{2\pi}$.

тому:

$$s' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + \frac{h^2}{(2\pi)^2}} =$$

$$= a\sqrt{1 + \frac{h^2}{(2\pi a)^2}} = ak \text{, де } k = \sqrt{1 + \frac{h^2}{(2\pi a)^2}} = (const)$$

тому:

$$\lambda = -\frac{\sin t}{k} \; ; \quad \mu = \frac{\cos t}{k} \; ; \quad \nu = \frac{\frac{h}{2\pi a}}{k}$$

А звідси:

$$\lambda' = -\frac{\cos t}{k} \; ; \quad \mu' = -\frac{\sin t}{k} \; ; \quad \nu' = 0.$$

Вставляючи ці вартості у взори (d), ми одержимо:

$$\lambda_n = \rho\frac{-\frac{\cos t}{k}}{ak^2} = -\rho\frac{\cos t}{ak^2} \; ; \quad \mu_n = -\rho\frac{\sin t}{ak^2} \text{ і } \nu_n = \rho \cdot 0 = 0.$$

Коли ці рівняння піднести до квадрату й додати одно до одного, то одержимо:

$$\lambda_n^2 + \mu_n^2 + \nu_n^2 = \rho^2\frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{a^2k^4} = \rho^2 \cdot \frac{1}{a^2k^4}$$

Але $\lambda_n^2 + \mu_n^2 + \nu_n^2 = 1$, а тому:

$$\rho^2 \cdot \frac{1}{a^2k^4} = 1, \text{ або: } \rho = ak^2 = a\left[1 + \frac{h^2}{(2\pi a)^2}\right]$$

Отже кривина гвинтової лінії є <u>стала</u>. Крім того, оскільки маємо $\nu_n = 0$, це значить, що головна нор-

нова лежить в площині дотичній до площі $\Sigma(xy)$, себто дотичною до лука валька; 2) $\lambda_n = -\rho\frac{\cos t}{ak^2}$ і $\mu_n = -\rho\frac{\sin t}{ak^2}$ є величини від'ємні, бо вставляючи величину ρ у вирази λ_n, μ_n і ν_n маємо:

$$\left.\begin{aligned}\lambda_n &= -ak^2\frac{\cos t}{ak^2} = -\cos t\\ \mu_n &= -\sin t\end{aligned}\right\} \dots (\rho)$$

А тому головна нормаль має напрям протилежний до напряму лука в валька, себто вона спрямована до осі валька.

II) Обчислимо тепер лук кручення τ. Порівнюючи вздовж першої пари ортогональних з відповідними взаємними другої пари [взори: (33) і (35)], одержимо:

$$\rho\frac{\lambda'}{s'} = \tau\frac{\lambda'_\beta}{s'} \quad \text{або:} \quad \rho\lambda' = \tau\lambda'_\beta$$

Тому:

$$\tau = \rho\frac{\lambda'}{\lambda'_\beta} \dots (*)$$

З другого боку ми маємо, що (взір *):

$$\lambda_\beta = \frac{y'z'' - y''z'}{\sqrt{\Sigma(y'z'' - y''z')}},$$

де в даному випадку:

$$x' = -a\sin t;\ y' = a\cos t;\ z' = \frac{h}{2\pi}$$

$$x'' = -a\cos t;\ y'' = -a\sin t;\ z'' = 0$$

Маємо тепер:

$$y'z'' - y''z' = a\cos t\cdot 0 - \left(-a\sin t\frac{h}{2\pi}\right) = a\frac{h\sin t}{2\pi}$$

$$z'x'' - z''x' = \frac{h}{2\pi}\cdot -a\cos t - (-a\cos t\cdot 0) = -a\frac{h\cos t}{2\pi}$$

і $x'y'' - x''y' = (-a\sin t\cdot -a\sin t) - (a\cos t\cdot -a\cos t) = a^2$

Тому:

$$\sqrt{\Sigma(y'z'' - y''z')} = a^2\sqrt{\frac{h^2\sin^2 t}{(2\pi a)^2} + \frac{h^2\cos^2 t}{(2\pi a)^2} + 1} = a^2\sqrt{1 + \frac{h^2}{(2\pi a)^2}} = a^2 k$$

А звідси:

$$\lambda_б = \frac{\frac{h}{2\pi a}}{\kappa} \sin t \; ; \; \mu_б = -\frac{\frac{h}{2\pi a}}{\kappa} \cos t \; ; \; \nu_б = \frac{1}{\kappa}$$

Далі:

$$\lambda'_б = \frac{\frac{h}{2\pi a}}{\kappa} \cos t \quad і \quad т. g.$$

Отже: (*)

$$\gamma = \rho \frac{-\frac{\cos t}{\kappa}}{\frac{h}{2\pi a}\cos t} = -\rho \frac{\cos t \cdot \kappa}{\kappa \cdot \frac{h}{2\pi a} \cdot \cos t} = -\rho \frac{2\pi a}{h}.$$

А враховуючи вартість ρ, маємо:

$$\gamma = -\alpha\left[1 + \frac{h^2}{(2\pi a)^2}\right] \cdot \frac{2\pi a}{h} = -\frac{2\pi a^2}{h}\left[1 + \frac{h^2}{(2\pi a)^2}\right].$$

Циліндрова лінія є лінією кручення. Це кручення є від'ємне (при $h > 0$) себто лінія закручується в ліву руку до правої (рис. 125)




Рис. 125

Розділ II

Поверхні.

§55. Загальні їх рівняння.

Загальне рівняння поверхні устелює функціональний зв'язок поміж змінними x, y, z її точок, а тому рівняння такої поверхні можна символічно означити:

$$F(x, y, z) = 0 \quad \ldots\ldots (a)$$

Найчастіше, як найбільш зручне, це рівняння устрічається у виявленій щодо z формі, а саме:

$$z = f(x, y) \quad \ldots\ldots (b)$$

Але цей вигляд не може охопити всіх родів рівнянь поверхні, бо не завжди кожне рівняння можна розв'язати що-до z (або якої іншої із змінних). Прикладом цього випадку є наприклад пряма циліндрична поверхня з напрямним контуром в одній з координатних площ, напр. в площі xOy (себто з твірними рівнобіжними до осі z). Ці поверхні мають рівняння вигляду:

$$F(x, y) = 0 \quad \ldots\ldots (c)$$

що зовсім не містить z (або іншої відповідної змінної), а тому це z не може бути вилучене з нього. Нарешті можна сказати й загальне рівняння поверхні, а саме:

$$x = \varphi(u,v) \; ; \quad y = \psi(u,v) \quad i \quad z = \chi(u,v) \ldots\ldots (9),$$

де u і v – певні довільні змінні. Коли з цих трьох рівнянь виключити надалі два змінних, то одержимо перше рівняння: $F(x,y,z)=0$

Щоб одержати рівняння вигляду z, то досить для цього взяти за змінними u і v самі змінні x і y. Тоді третє рівняння матиме вигляд:

$$z = \chi(x,y)$$

Очевидно, що кожним окремим вартостям u і v завжди відповідає певна точка зі змінними x, y, z. Тому можна припустити існування на самій поверхні якоїсь системи координат, що для кожної точки M (на цій поверхні) визначатиме певні вартості u і v, як змінні її. Ця система координат, що лежить на цій поверхні буде загалом криволінійною, а тому й змінних u і v звуться криволінійними координатами (змінними) точки M.




Рис. 126

Щоб мати ще більшу уяву про ці координати, припустимо, що в даній мені одна із змінних, напр. u не матиме своєї вартості ($u = const$), тоді v зможе перебрати всі можливі свої вартості. тоді рівняння (9) є функцією одного лише змінного:

$$x = \varphi_1(v) \; ; \quad y = \psi_1(v) \quad i \quad z = \chi_1(v) \ldots\ldots (e)$$

У нас одержано рівняння певної кривої в просторі.

Коли тепер тимчасово сталій величині u будемо давати довільні вартості $u_1, u_2 \ldots u_n$, то одержимо через (родину) кривих, сказати поміж себе лінії. Цей процес цілком подібний до процесу переходу рядів при довільних змінах вартості відмінкової в простолінійних координатах (рис. 127).




Рис. 127.

[Аналогічні міркування коли й $v = const$].

Для скорочення є прийнято назви – „криволінійні координати" і для нас можливість надавати цим криволінійним координатам всі привілеї простолінійних.

§56. Дотична пряста й площа до поверхні.

Хай поверхня визначається рівнянням $F(x, y, z) = 0$. Коли вибрано певну по-
верхні точку M, то через
неї можна на сталій поверх-
ні провести безліч кривих і
до кожної з них окремі дотич-
ні (рис. 128) Цілком зрозуміло
що кожна з таких дотичних




Рис. 128

буде одночасно й дотичною до поверхні. Коли через точку M переходить безліч кривих, то через неї пройде й безліч дотичних до кривої. Очевидно, що всі ці дотичні складуть певний геометричний

середовищ. Розглянемо деякі з них:

Перш за все, кожна крива на даній поверхні, що проходить через точку M є лінією перетину (в загальному випадку) даної поверхні другою, що також проходить через точку M. Таких поверхонь можна провести безліч і їх рівняння будуть цілком довільні, з одною лише умовою, що частина точки M мусять їх задовольняти, бо всі згадані поверхні проходять через точку M.

Означимо рівняння такого роду довільної площі через:

$$\varphi(x, y, z) = 0 \quad \ldots (2)$$

Рівняння кожної дотичної до кривої в точці $M(x, y, z)$ матиме вигляд:

$$\frac{X-x}{x'} = \frac{Y-y}{y'} = \frac{Z-z}{z'}$$

або:

$$\frac{X-x}{dx} = \frac{Y-y}{dy} = \frac{Z-z}{dz} \quad \ldots (3)$$

Лишається лише за допомогою рівнянь (1) і (2) визначити величини dx, dy і dz. Для цього продиференціюємо дані рівняння (1) і (2) і матимемо:

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy + \frac{\partial F}{\partial z}dz &= 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z}dz &= 0 \end{aligned}\right\} \ldots (4)$$

Ці рівності (3) і (4) зв'язують між собою невідомі dx, dy і dz і дають змогу виключити їх з рівнянь (3). Справді, означимо в рівняннях (3) спільні пропорційності через t. Тоді маємо рівність:

$$\frac{X-x}{dx} = t\,; \quad \frac{Y-y}{dy} = t\,; \quad \frac{Z-z}{dz} = t$$

Звідси:

$$dx = \frac{X-x}{t}\,; \quad dy = \frac{Y-y}{t} \text{ і } dz = \frac{Z-z}{t}$$

Вставляючи ці вартості в (4) і скорочуючи після того всі члени на t, матимемо:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial F}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial F}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial F}{\partial z}(Z-z) = 0 \quad (\alpha) \\ &\frac{\partial \varphi}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial \varphi}{\partial z}(Z-z) = 0 \quad (\beta) \end{aligned}\right\} \ldots (5)$$

Ми переконуємося, що це є рівняння дотичної, як виявиться перетину двох площ (α) і (β)

Коли б ми взяли якусь другу поверхню $\varphi_1(x,y,z)$, що проходить через точку M, то у виразі попередніх міркувань мали б рівняння другої дотичної до даної поверхні в точці M такого вигляду:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial F}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial F}{\partial z}(Z-z) = 0$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial \varphi_1}{\partial z}(Z-z) = 0$$

і т. д.

Ми бачимо, що для кожної нової дотичної змінюється лише друге рівняння, а перше рівняння (α) залишається незмінним. Це доводить нам, що всі дотичні до поверхні, що проходять через дану точку цієї поверхні M лежатимуть на площі (α), а через те сама площа (α) є потрібним геометричним осередком всіх даних дотичних. <u>Площу цю</u> <u>звуть дотичною до поверхні площею.</u> Вартості $\frac{\partial F}{\partial x}$, $\frac{\partial F}{\partial y}$ і $\frac{\partial F}{\partial z}$ є певно визначені й деякою одиницю, а то-

й згадана площа є єдиною дотичною площею до даної поверхні в точці M. Рівняння цієї площі дає змогу скласти рівняння:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(X-x)+\frac{\partial F}{\partial y}(Y-y)+\frac{\partial F}{\partial z}(Z-z)=0 \quad \ldots\ldots (97)$$

Коли рівняння поверхні має вигляд:

$$z=\varphi(x,y),$$

то тоді:

$$F(x,y,z)=z-\varphi(x,y)=0$$

Звідси маємо:

$$\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial \varphi}{\partial x};\ \frac{\partial F}{\partial y}=-\frac{\partial \varphi}{\partial y};\ \frac{\partial F}{\partial z}=1.$$

Введемо за звичаєм інші означення: $\frac{\partial \varphi}{\partial x}=p$; $\frac{\partial \varphi}{\partial y}=q$; і тоді рівняння дотичної площі буде:

$$-p(X-x)-q(Y-y)+Z-z=0$$

або:

$$Z-z=p(X-x)+q(Y-y) \quad \ldots\ldots (98)$$

§ 57. Пряма до поверхні.

Візьмімо просту, що проходить через точку M; напишемо її рівняння:

$$\frac{X-x}{m}=\frac{Y-y}{n}=\frac{Z-z}{l}$$

Коли це є пряма до поверхні, то на підставі умови прямовісности прямої й площі її кутові множники є пропорційні співмножникам дотичної площі, а тому рівняння прямої матиме вигляд:

$$\frac{X-x}{\frac{\partial F}{\partial x}}=\frac{Y-y}{\frac{\partial F}{\partial y}}=\frac{Z-z}{\frac{\partial F}{\partial z}} \quad \ldots\ldots (99),$$

де $F(x,y,z)$ є рівнянням відповідної поверхні.

Коли поверхня буде задана рівнянням:

$$z = \psi(x, y),$$

тоді рівняння прямової в описаних вище межах будуть:

$$\frac{X-x}{-r} = \frac{Y-y}{-q} = Z - z \quad \ldots\ldots\ldots (100).$$

§58. Напрямні зчислики дотичної площі.

(косинуси кутів прямової з осями)

Хай α, β і γ є кути що творить прямова даної поверхні з осями координат. Тоді введемо такі означення:

$$\cos\alpha = L \; ; \; \cos\beta = M \text{ і } \cos\gamma = N$$

I. Очевидно, що на підставі вздрів (99), де аналітичної геометрії, одержимо:

$$L = \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\pm\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}} ; \quad M = \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\pm\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}} \text{ і } N = \frac{\frac{\partial F}{\partial z}}{\pm\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}}$$

або означивши коротше:

$$\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}} = \Delta F$$

Матимемо:

$$L = \pm\frac{\partial F}{\partial x}\Delta F \; ; \; M = \pm\frac{\partial F}{\partial y}\Delta F \text{ і } N = \pm\frac{\partial F}{\partial z}\Delta F \quad \ldots (101),$$

де „+" відповідає додатньому напрямку прямової (зовнішній прямовій, а „−" навпаки.

II. Аналогічно, коли поверхню задано рівнянням:

$$z = \psi(x, y)$$

матимемо:

$$L=\pm\frac{-p}{\sqrt{p^2+q^2+1}};\quad M=\pm\frac{-q}{\sqrt{p^2+q^2+1}}\ \text{і}\ N=\pm\frac{1}{\sqrt{p^2+q^2+1}}\quad\ldots(102)$$

III. Нехай, яка задовольняє поверхня вихідному рівнянню:

$$x=\varphi(u,v);\quad y=\psi(u,v)\ \text{і}\ z=\chi(u,v)$$

Візьмімо на ній якусь точку M і проведемо через неї променеву до поверхні (рис. 128). Очевидно, що ця променева є одночасно й променевою до усіх кривих, що лежать на даній поверхні й проходять через дану точку M її. Між останніми кривими неодмінно знаходитимуться й координатні криволінійні координати, що визначатимуться умовами $u=\text{const}$ і $v=\text{const}$. Отже, написавши рівняння довільної дотичної, що проходить через точку M, а саме:

$$\frac{X-x}{x'}=\frac{Y-y}{y'}=\frac{Z-z}{z'},$$

ми визначимо в цьому рівнянні шукові змінні x', y', z', так щоб кожна точка була по черзі дотичною до 1-ої й 2-ої криволінійних координат, а для цього:

1) вважаючи в рівняннях поверхні змінне $v=\text{const}$, одержимо:

$$x'=\frac{\partial\varphi}{\partial u};\quad y'=\frac{\partial\psi}{\partial u}\ \text{і}\ z'=\frac{\partial\chi}{\partial u}$$

і 2) беручи $u=\text{const}$, маємо:

$$x'=\frac{\partial\varphi}{\partial v};\quad y'=\frac{\partial\psi}{\partial v};\quad z'=\frac{\partial\chi}{\partial v}$$

Очевидно, що дотичні:

$$\frac{X-x}{\frac{\partial \varphi}{\partial u}} = \frac{Y-y}{\frac{\partial \psi}{\partial u}} = \frac{Z-z}{\frac{\partial x}{\partial u}}$$

$$\frac{X-x}{\frac{\partial \varphi}{\partial v}} = \frac{Y-y}{\frac{\partial \psi}{\partial v}} = \frac{Z-z}{\frac{\partial x}{\partial v}}$$

і прямові до поличної, що переходить через точку M, а через неї ніяких виконуватиме умови прямовості, а саме:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} L + \frac{\partial \psi}{\partial u} M + \frac{\partial x}{\partial u} N = 0$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial v} L + \frac{\partial \psi}{\partial v} M + \frac{\partial x}{\partial v} N = 0$$

Виключаючи 1) M (множивши 1-е рівняння на $\frac{\partial \psi}{\partial v}$, а 2-е на $\frac{\partial \psi}{\partial u}$ і відніманні одне з одного) і 2) L (в той же спосіб) ми виключимо по черзі N через L і M, а саме:

$$1)\ N = \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v} - \frac{\partial \psi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}}{\frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial x}{\partial v}} L$$

$$і\quad 2)\ N = \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial u} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u}}{\frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}} M$$

А звідси прирівнюючи вартості N маємо:

$$N = \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v} - \frac{\partial \psi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}}{\frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial x}{\partial v}} L = \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial u} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u}}{\frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}} M$$

або:

$$\frac{L}{\frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v} - \frac{\partial \psi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}} = \frac{M}{\frac{\partial \psi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v} - \frac{\partial \varphi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v}} = \frac{N}{\frac{\partial \varphi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial u} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u}}$$

або:

$$\frac{L}{A} = \frac{M}{B} = \frac{N}{C},$$

де через A, B і C ми для скорочення означуємо попередні відповідні знаменники. Підносимо ці рівності до квадрату й складаємо похідну пропорційно, а саме:

$$\frac{L^2 + M^2 + N^2}{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{L^2}{A^2} = \frac{M^2}{B^2} = \frac{N^2}{C^2}$$

Тому:

$$L = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}};\ M = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}};\ N = \pm \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

де $A = \frac{\partial \psi}{\partial u}\cdot\frac{\partial \chi}{\partial v} - \frac{\partial \chi}{\partial u}\cdot\frac{\partial \psi}{\partial v} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \chi}{\partial u} & \frac{\partial \chi}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial(\psi, \chi)}{\partial(u, v)}$

$$B = \frac{\partial(\chi, \varphi)}{\partial(u, v)} \text{ і } \quad C = \frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(u, v)}$$

Таким чином:

$$L = \pm \frac{\frac{\partial(\psi, \chi)}{\partial(u, v)}}{\sqrt{\left[\frac{\partial(\psi, \chi)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(\chi, \varphi)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(u, v)}\right]^2}} \text{ і т.д. . . . } (103)$$

Очевидно, що кожна площа, що переходить через прямову KN є також площею прямового до поверхні. Таких прямових площ буде безліч і всі вони складуть осевий пучок з віссю KN – що є даною прямовою (рис. 129)




Рис. 129

§59. Кривина ліній, дотичних до поверхні, або так званих поверхневих кривих.

Припустім, що задана поверхня P виражена

рівнянням (рис. 130)

$$z = f(x, y)$$




Рис. 130

Візьмімо на ній довільну точку $M(x, y, z)$ і через неї поведемо на поверхні якусь криву AB. Хай дотична до неї Γ, поведена через точку M має напрямні зчинники λ, μ і ν. Поведемо також: 1) пряслову N до поверхні P і 2) головну пряслову N_1 до кривої AB і візьмімо на останній точку K - центр кривини AB. Означимо тоді через ρ величину MK = = лучу кривини.

Ми маємо, що напрямні зчинники дотичної є рівні:

$$\lambda = \frac{dx}{ds} \; ; \; \mu = \frac{dy}{ds} \; i \; \nu = \frac{dz}{ds} \quad \ldots (1)$$

де під ds означимо диференціял дуги кривої AB. Але ця крива лежить на поверхні P, а тому значники x, y і z мають задовольняти її рівняння. Отже:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = p\,dx + q\,dy$$

(де вживаємо означення Монжа). Вставляючи це вирізне у третє рівняння (1), маємо:

$$\nu = \frac{p\,dx + q\,dy}{ds} = p\frac{dx}{ds} + q\frac{dy}{ds}$$

Що за допомогою перших двох рівнянь (1) дістаємо таку тісну зв'язок між напрямними зчинниками розглядуваної дотичної:

$$\nu = p\lambda + q\mu \quad \ldots\ldots (2)$$

Тепер обчислимо кут θ між прямовою поверхні й головною прямовою даної кривої AB, щоб скористатись ним для вимірювання кривини ρ цієї кривої. З аналітичної геометрії ми знаємо, що косинус кута між двома простими є рівний сумі здобутків відповідних напрямних множників цього кута. А тому означивши, як раніше, напрями множників прямової до поверхні через L, M і N, а напрями множників головної прямової до кривої AB через λ_n, μ_n і ν_n, маємо:

$$\cos\theta = \lambda_n L + \mu_n M + \nu_n N$$

В попередньому § ми довели (вірш 102), що:

$$L = \frac{-p}{\pm\sqrt{p^2+q^2+1}}; \quad M = \frac{-q}{\pm\sqrt{p^2+q^2+1}}; \quad N = \frac{1}{\pm\sqrt{p^2+q^2+1}}$$

А за вказаним вище (1-ша умова) маємо:

$$\lambda_n = \rho\frac{d\lambda}{ds}; \quad \mu_n = \rho\frac{d\mu}{ds} \quad і \quad \nu_n = \rho\frac{d\nu}{ds}$$

Маємо:

$$\cos\theta = \pm\frac{\rho\left(\frac{d\nu}{ds} - p\frac{d\lambda}{ds} - q\frac{d\mu}{ds}\right)}{\sqrt{p^2+q^2+1}} \quad \ldots\ldots (3)$$

З рівности (2) маємо, що:

$$\nu = p\lambda + q\mu$$

а тому:

$$d\nu = p\,d\lambda + \lambda\,dp + q\,d\mu + \mu\,dq$$

або ділячи на ds:

$$\frac{d\nu}{ds} = \left(p\frac{d\lambda}{ds} + q\frac{d\mu}{ds}\right) + \left(\lambda\frac{dp}{ds} + \mu\frac{dq}{ds}\right)$$

Вставляючи останню варіність $\frac{dw}{ds}$ у рівність (3) після скорочення маємо:

$$\cos\theta = \pm \frac{s\left(\lambda \frac{dp}{ds} + \mu \frac{dq}{ds}\right)}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}} \quad \ldots\ldots (4)$$

Розглянемо тепер, що уявляють з себе диференціали: dp і dq. Ми знаємо, що $p = \frac{\partial f}{\partial x}$, а $q = \frac{\partial f}{\partial y}$. Тому:

$$dp = d\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy$$

і аналогічно:

$$dq = d\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy$$

Введемо означення Монжа й Ґурі:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = r \;;\; \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = s \;\text{ і }\; \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = t$$

і маємо:

$$dp = r\,dx + s\,dy$$

$$dq = s\,dx + t\,dy$$

Поділивши обидві частини рівності на ds, одержимо:

$$\frac{dp}{ds} = r\frac{dx}{ds} + s\frac{dy}{ds} = r\lambda + s\mu .$$

Також маємо:

$$\frac{dq}{ds} = s\lambda + t\mu .$$

Отже вставляючи знайдені вартості в рівність в рівність (3) маємо:

$$\cos\theta = \pm \frac{s\left[\lambda(r\lambda + s\mu) + \mu(s\lambda + t\mu)\right]}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}$$

або:

$$\cos\Theta = \pm \frac{\rho(r\lambda^2 + 2s\lambda\mu + t\mu^2)}{\sqrt{p^2+q^2+1}} \quad \ldots\ldots (104)$$

Очевидно „+" відповідає додатньому напрямку головної нормалі, а „−" відємному. Надалі ми будемо вважати напрям цієї нормалі за додатній, а тому:

$$\rho = \frac{\sqrt{p^2+q^2+1}}{r\lambda^2 + 2s\lambda\mu + t\mu^2}\cos\Theta \quad \ldots\ldots (105)$$

Тут ми константуємо, що:

Луч кривини (а значить і сама кривина) залежить лише від величин напрямних зміщень відповідної дотичної та косинуса нормального кута (кута між нормалями до поверхні й до даної кривої. Цей кут ми умовимося, береться лише додатніми напрямами обох нормалей)

Тепер проведемо через точку M нормальний (прямовий) переріз поверхні відповідно до даної кривої AB на ній (рис. 130)

Прямовим перерізом поверхні, відповідно до даної кривої AB на ній, будемо звати криву CD перетину поверхні площею, що проходить через нормаль цієї поверхні й дотичну до даної кривої AB проведену через точку M. (Очевидно, що ця дотична буде різна одного з дотичних до поверхні, а тому буде й дотичного до самого прямого перерізу).

Зрозуміло тут, що прямовий переріз є також нормальовою кривою даної поверхні P, а тому вираз (105) буде виразом і для луча R кривини її. Лишаємо

стоїть лише установити вартість Θ, λ, μ і ν для цієї кривої.

1) Як розглянемо вище, тангенс дотичний прямового перерізу поверхні містить сильну дотичну T, а тому й вартости λ, μ і ν для обох кривих однакові.

2) Прямовий переріз є площина кривої, а тому її головна нормаля лежить в площі перерізу й проходить через точку M прямово до дотичної T. Але площа перерізу поведеної ~~навскоси~~ через нормаль до поверхні й дотичну T, а тому нормаля до поверхні лежить в цій же площі, переходить через точку M і є прямового до дотичної T.

Таким чином нормаля поверхні й нормаля прямового перерізу поведені через дану точку поверхні є *протилежні* (рис. 131, a, b). Але в залежности від сторони кута точки M самої поверхні, ці нормалі можуть бути в обох випадках (a) і (b) протилежних напрямів (в бік випуклости, чи випуклости поверхні). В першому випадку кут $\Theta=0$, а в другому: $\angle\Theta=\pi$, а тому в першому випадку $\cos\Theta=1$, а в другому $\cos\Theta=-1$; загалом $\cos\Theta=\pm1$




Рис. 131

Отже, вставляючи знайдену вартість $\cos\Theta$ у вираз (105) для ρ, ми одержимо вартість R кожної кривини прямового перерізу, а саме:

$$R = \pm \frac{\sqrt{p^2+q^2+1}}{2\lambda^2 + 2s\lambda\mu + t\mu^2} \quad \ldots\ldots\ldots (106)$$

А порівнюючи вздри (105) і (106) маємо:

Теорему Мюнье:

$$\rho = \pm R\cos\theta \quad \ldots\ldots\ldots (107)$$

Словесно: Центр кривини в якій будь точці поверхньової лінії є кінцем центра кривини відповідного нормального перерізу (себто того, що має спільну дотичну з даною кривою) на площині нормальних даної кривої.

З'ясуємо це: кут θ є кутом площин головного нормального даної поверхньової кривої й нормального самої поверхні (що є разом і нормального прямового перерізу (рис. 132). Центри кривини K і K_1 даної кривої й прямового перерізу, лежать на нормалях, а тому рівність $\rho = \pm R\cos\theta$ виявляє, що луг




Рис. 132

Пояснення до рис 132.
N – нормаль поверхні
N_1 – нормаль кривої AB
N_{11} – нормаль нормального перерізу CB
K центр кривини даної поверхньової кривої, а K_1 центр кривини прямового перерізу.

кривини ρ поверхньової кривої є кінцем луча кривини R прямового перерізу на головну нормаль даної поверхньової кривої (рис. 132). Але всі нормалі прямові до спільної дотичної, тому кінцем луча кривини R на головну нормаль N_1

є одночасно й мірою цього кута на площу кривизни T_1MN, що переходить через дотичну й цю головну нормаль MN_1. Тепер міра кривизни ρ якоїсь поверхневої кривої AB є мірою кута кривизни відповідного прямового перерізу на площу кривизни, а разом і центр K кривизни цієї поверхневої кривої AB є мірою центру кривизни відповідного прямового перерізу на площу кривизни тієї ж кривої AB. Це й є теорема Мюньє.

Висновок. Вартість $\cos\theta$ не може бути більшою одиниці, а тому: Із всіх поверхневих кривих, що мають спільну дотичну відповідний прямовий переріз має найбільший кут кривизни (найменшу кривизну).

§60. Будування кругів кривизни для всіх можливих поверхневих кривих, що переходять через точку M поверхні й мають спільну дотичну.

Хай через точку M (рис. 133) переходить ціла пучка поверхневих кривих, що мають спільну дотичну T. Виберемо з цих кривих CD, що є прямовим перерізом відповідним до цих кривих і збудуємо центр його кривизни K. Коли тепер круг K, його центром окресленого кругом кривизни (кругом кута $R = MK$), то тоді контур малого круга цієї кулі, що переходить через точку M є кругом




Рис. 133.

кривини одній з даних поверхневих кривих. Справді: хай площа кривини якоїсь поверхневої кривої AB перетинає дану кулю по кругу MN. Тоді центр цього кругу K_1 є містом (як відомо з геометрії) центра кулі на площу його, а тому й є центром кривини кривої AB, що має KL за радіус кривини.

§61. Кривині прямових перерізів.

Ми вивели, що рад кривини прямового перерізу буде:

$$R = \frac{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}{Dl^2 + 2Sl\mu + Tm^2}$$

Візьмімо тепер за початок координат точку M поверхні, а за вісь z нормалю до поверхні, тоді площа дотична до поверхні в точці M буде координатною площею xy. Тамтим площа дотична до прямового перерізу AB буде лежати в цій площі xy. Ми означили кут нахилу дотичної з віссю x-ів через φ; тоді кут тієї ж дотичної з віссю y-ів буде $\frac{\pi}{2} - \varphi$ (рис. 134)




Рис. 134

Перетворимо вираз ρ до нових координат:

1) $l = \cos\varphi$ (бо φ є кут дотичної з віссю x-ів)

2) $m = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \sin\varphi$

Кути ж нормалі (що взята за вісь z) з осями x-ів і y-ів будуть $\frac{\pi}{2}$, а тому l_n і $m_n = 0$ (як косинуси цих кутів)

Але: $l = \frac{-p}{\sqrt{p^2+q^2+1}}$; $m = \frac{-q}{\sqrt{p^2+q^2+1}}$

Тому $p \neq 0$ і $q \neq 0$, бо $\sqrt{p^2+q^2+1} \neq 0$

а звідси: $\sqrt{p^2+q^2+1} = \sqrt{1} = 1$

Через те:

$$R = \frac{1}{r\cos^2\varphi + 2s\sin\varphi\cos\varphi + t\sin^2\varphi}$$

а звідси кривина:

$$K = \frac{1}{R} = r\cos^2\varphi + 2s\sin\varphi\cdot\cos\varphi + t\sin^2\varphi \quad \ldots (4)$$

Будемо шукати при якій варіації φ кривина K буде maximum або minimum. Для цього, як маємо вище, прирівнюємо до нуля першу похідну через φ, а саме:

$$K' = -2r\sin\varphi\cdot\cos\varphi + 2s(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) + 2t\sin\varphi\cdot\cos\varphi = 0$$

або:

$$-r\sin 2\varphi + 2s\cos 2\varphi + t\sin 2\varphi = 0$$

тому:

$$2s\cos 2\varphi = (r-t)\sin 2\varphi$$

або:

$$2s = (r-t)\operatorname{tg} 2\varphi$$

А звідси:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2s}{r-t}$$

Отже:

$$\varphi = \frac{\pi n}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{2s}{r-t}$$

де n в даному випадку може бути або нуль, або 1. Очевидно, цей вірш не виконує φ, коли або $s=0$, або $r=t$. Ці випадки ми розглянемо окремо.

Коли б ми вставили знайдені вартості φ у другу похідну, то одержали б вартості її рівні нулеві, а тому ці вартості φ є в одному випадку maximum, а в другому minimum.

Ці прямові перерізи є взаємно прямові і звуть

ми головними.

Коли б ми одержали, що $\delta = 0$ і $r = t$, то ми в виразі (d) одержали б:

$$\frac{1}{R} = r(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = r$$

Це показує, що в цьому випадку кривина всіх нормальних перерізів не залежить від кута φ, а тому однакова. Такі точки поверхні звуться пупковими або сферичними.

Геометричну точку сферичності можна інтерпретувати так: Припустимо, що деяка точка M на даній поверхні Φ, має ту властивість, що навколо неї можна буде окреслити досить малу частину цієї поверхні, яка зливається з поверхнею кулі, радіус якої R. Очевидно, що для цієї точки кривини всіх нормальних перерізів буде однакова й тому вона зватиметься точкою сферичності (або пупковою точкою).




Рис. 135

Обернемо тепер вісь x-ів і y-ів так, щоб площі xz і yz були площами головних перерізів. В цьому разі кут φ для одиниць з координатними площ має бути рівний нулеві, а тому:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2\delta}{r-t} = 0 \quad , \text{ а звідси } \delta = 0$$

Отже (з рівняння d) маємо:

$$\frac{1}{R} = K = r\cos^2\varphi + t\sin^2\varphi \quad \ldots\ldots (\rho)$$

Очевидно, що при такому перетворенні координатних осей головні радіуси кривини, що відповідають головним перерізам будуть відповідати вартостями $\varphi = 0$ і $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Себто:

$$K_1 = z \quad ; \quad K_2 = t$$

а звідси:

$$z = \frac{1}{R_1} \quad ; \quad t = \frac{1}{R_2}$$

де R_1 і R_2 відповідно радіуси кривини головних перерізів. Вставляючи ці вартости в (β), одержимо:

$$\frac{1}{R} = \frac{\cos^2\varphi}{R_1} + \frac{\sin^2\varphi}{R_2} \quad \ldots\ldots (108)$$

Це є вірш Ейлера, що устанавлює залежність між радіусами кривини якого бажаного прямового перерізу й радіусами кривини головних прямових перерізів.

Коли взяти ще якийсь другий прямовий переріз, площа якого була прямовою до даного перерізу, то очевидно, що його кривина буде виповнюватися рівнянням (108) з тим, що в місце кута φ зустрінеться кутом $\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)$. Отже тоді матимемо:

$$\frac{1}{R'} = \frac{\sin^2\alpha}{R_1} + \frac{\cos^2\alpha}{R_2} \quad \text{або}$$

додавши це рівняння до рівняння (108), одержимо:

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R'} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \ldots\ldots (109)$$

<u>Сума кривин двох прямових перерізів, що мають взаємно прямові площі є величина стала рівна сумі кривин головних прямових перерізів.</u>

<u>Суму $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ звуть середньою кривиною поверхні в точці M, або кривиною Ейлера.</u>

§62. Індикатриса Дюпена.

Хай маємо поверхню диференційовної рівнянням

$$z = f(x,y) \quad \ldots\ (1)$$

перерізання цю поверхню площиною рівнобіжною до дотичної в даній точці M. Хай рівняння її буде:

$$z = d \quad \ldots\ (2)$$

Розв'язуючи рівняння (1) і (2) як систему, ми одержимо рівняння перерізу поверхні площиною (2), а саме:

$$f(x,y) = d \quad \ldots\ (3)$$

Будемо вважати d за дуже малу величину, тоді вважатимемо x і y, що задовольняють рівняння (3) будуть залежними й коли d прямує до нуля (бо початок координат є точка M, що належить до поверхні). Добираємо вважаємо d таке, щоб x і y були безмежно малими або ж можемо розкласти $f(x,y)$ в ряд Маклорена, а саме:

$$f(x,y) = f(0,0) + \frac{1}{1!}\left(\frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y\right) + \frac{1}{2!}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}x^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}xy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}y^2\right) + \ldots$$

Дані відомі означення Монжа, маємо:

$$f(x,y) = f(0,0) + (px + qy) + \frac{1}{2!}(rx^2 + 2sxy + ty^2) + \ldots$$

Ми взяли за початок осей точку M поверхні, за вісь z-ів - перпендикуляр поверхні, а за площину xy - дотичну площину до поверхні в точці M, а тому, як довели в попередньому §-і

$$p = 0 \ ; \quad q = 0$$

і крім того:

$$f(0,0) = 0$$

Отже:

$$f(x,y) = \frac{1}{2}(rx^2 + 2sxy + ty^2)$$

Тепер рівняння перерізу поверхні $z = d$ буде:

$$rx^2 + 2sxy + ty^2 = 2d \quad \ldots\ldots (110)$$

Це і є індикатриса Дюпена.

Показано, що за крива 2-го степеня дає можливість судити про кривину даного прямового перерізу.

Виводячи вздір цієї кривої ми припустили, що даний прямовий переріз положений так, що дотична до нього в точці M творить з віссю x-ів, кут φ [а з віссю y-ів - кут $\frac{\pi}{2} - \varphi$]. Отже перетворимо рівняння (110) до бігусових координат, беручи за бігусу точку M, а за бігусову вісь саму дотичну T. Тоді взори перетворення будуть:

$$x = \rho\cos\varphi \; ; \qquad y = \rho\sin\varphi$$

де ρ є дуга вектор. точки M. У виразі нового перетворення матимемо:

$$r\rho^2\cos^2\varphi + 2s\rho^2\sin\varphi\cos\varphi + t\rho^2\sin^2\varphi = 2d$$

або (поділивши всі члени на ρ^2):

$$r\cos^2\varphi + 2s\sin\varphi\cdot\cos\varphi + t\sin^2\varphi = \pm\frac{1}{m^2} \quad \ldots\ldots (111)$$

де $m^2 = \pm\frac{\rho^2}{2d}$ ($+m$ - додатнє, від точки d). Порівнюючи це рівняння з рівнянням (4) попереднього §-а ми бачимо, що:

$$\frac{1}{R} = \pm\frac{1}{m^2} \; ; \qquad R = \pm m^2$$

Ми бачимо, що квадрати дуг векторів кривої рівняння (111) взяті зі знаком „+" чи „-" пропор-

<u>чий кругам кривин прямових перерізів, що не-</u>
<u>проходять через ці кулі - вектори.</u> При цьому сонин-
пинеми пропорційності є $\frac{1}{2d}$. Де d_1 є знаком
рівняння площі індикатриси. Тому індикатри-
са дає можливість судити про знак кривини
даного прямового перерізу в залежності від знак
кута φ.

Будемо досліджувати рівняння індикатриси (III):

1) Це рівняння не має членів першого виміру, а
тому (аналіт. геом.) центр індикатриси лежить
на осі Z-ів.

2) Вираження (дискримінант) цього рівняння є:

$$D = rt - s^2$$

тому можуть бути 3 випадки: $D \gtrless 0$. Коли
$D = rt - s^2 > 0$, то, як відомо з аналітичної геометрії,
індикатриса (III) є еліпса. При цьому в залежно-
сти від знаку d, що еліпса може бути дійсною,
або уявною. Очевидно, ми виберемо вартість d так,
щоб еліпса була дійсною. Але в цьому разі для
всіх вартостей φ кривина $\frac{1}{R}$ буде або завжди
$\frac{1}{R} = +\frac{1}{m^2}$, або завжди $\frac{1}{R} = -\frac{1}{m^2}$, себто одного знаку.
Отже всі прямові перерізи в точці M мають од-
накову випуклість. З цього видно, що круг точ-
ки M всієї поверхні $z = f(x)$ лежить з одного боку пло-
щі індикатриси.

При еліпсах φ найбільшу й найменшу вартість
кута вектора еліпси індикатриси має на великій
та малій осях еліпси. Очевидно, що й кут кривин
прямового перерізу пропорційний кругу вектору,

буде мати найбільшу й найменшу вартість для прямових перерізів, що переходять через дотичний прямовисний до осей еліпса індикатриси. Ці перерізи й будуть головними прямовими перерізами.

II. Припустимо тепер, що $\mathfrak{D} = rt - s^2 = 0$; тоді з рівняння індикатриси маємо:

$$r\cos^2\varphi + 2\sqrt{rt}\sin\varphi\cos\varphi + t\sin^2\varphi \mp \frac{1}{m^2} = 0$$

або:

$$\left(\sqrt{r}\cos\varphi + \sqrt{t}\sin\varphi\right)^2 \mp \frac{1}{m^2} = 0$$

Це рівняння розпадається на 2, а саме:

або 1) для верхнього знаку

$$\left.\begin{aligned}\sqrt{r}\cos\varphi + \sqrt{t}\sin\varphi + \frac{1}{m} &= 0\\ \sqrt{r}\cos\varphi + \sqrt{t}\sin\varphi - \frac{1}{m} &= 0\end{aligned}\right\} \ldots (\alpha)$$

або 2) для нижнього знаку:

$$\sqrt{r}\cos\varphi + \sqrt{t}\sin\varphi \pm \frac{1}{m} = 0 \ldots (\beta)$$

Отже, в цьому випадку індикатриса є системою двох прямих: (α) – дійсних і (β) – уявних. Тому можемо вибрати кут φ так, щоб одержати лише перший випадок (α).

Це нам приводить до того, що для кривини всіх прямових перерізів поверхні, для всіх вартостей φ одинакового знаку. Себто поверхня круг точки M лежить з одного боку дотичної. Розглядаючи рівняння (α), ми бачимо, що системою прямих індикатриса є симетрично рівнобіжних. Рис центр індикатриси лежить на осі z-ів, то ці прямі однаково віддалені




Рис. 136

на певну величину від точки N перетину площі індикатриси вісею Z-ів.

Коли змінювати параметр, то буде вектор ρ змінюватись від найменшої вартости $\rho = a$, де a є стала відстань простих індикатриси від точки N, до найбільшої: $\rho = cs$ (рис. 136) Напрями цих найменших вартостей ρ будуть власними прямими ($\rho = a$ є пряма до даних простих індикатриси, а $\rho = cs$ є рівнобіжна до неї)

Очевидно для прямих перерізів тих же напрямів і буде кривизна k (що є пропорційне до буде вектора ρ) буде мати також найменшу й найбільшу вартість (головні перерізи). При цьому при $R = cs$ кривина $\frac{1}{R} = 0$, себто цей головний переріз є пряма лінія.

III. Коли же $D < 0$, себто $rt - s^2 < 0$, то відно з аналітичного погляду індикатриса є гіпербола, при цьому вартости $\pm d$ відповідають вершинам гіперболи. Отже тепер буде крива може бути подвійний: $R = \pm m^2$

Хай головні вісі гіперболи будуть a і b (рис. 137). Тоді починаючи від A буде вектор ρ спадати від cs до a, потім від вершини K до B зростати знову до cs, далі спадати до b, знова зростати до cs, потім спадати до $-a$ і т. д. Разом з цим і відповідні буде кривини прямих перерізів то зростати, то спадати. Тому




Рис. 137

й кривина $\frac{1}{R}$ змінюється приймає найбільшу вартість для прямових перерізів, що переходять вісь a й найменшу для вісі $b\left(-\frac{2d}{5}\right)$

Ті прямові перерізи, що переходять через асимптоти гіперболи індикатриси мають кривину $\frac{1}{R}=0$. В цей момент відбувається зміна знаку R, а через те прямові перерізи змінюють свою випуклість в протилежному напрямі (рис. 138).




Рис. 138

На підставі попередньої елементарної поверхні можна поділити на еліптичні, параболічні й гіперболічні. Основного цього є те, що 1) для еліптичної поверхні лучі головних перерізів одного знаку, а тому їх здобуток буде:

$$\frac{1}{R_1}\cdot\frac{1}{R_2}=\frac{1}{R_1\cdot R_2}>0$$

2) для параболічної поверхні або $\frac{1}{R_1}=0$, або $\frac{1}{R_2}=0$, а тому здобуток їх:

$$\frac{1}{R_1}\cdot\frac{1}{R_2}=0$$

і нарешті 3) для гіперболічної поверхні лучі кривин головних перерізів різних знаків і тому здобуток їх

$$\frac{1}{R_1}\cdot\frac{1}{R_2}<0$$

Цей здобуток дає назву <u>кривини Гаусса.</u>

§63. Обчислення головних кутів кривини.

Ми знаємо, що вартість кута кривини косого прямового перерізу в даній точці M буде мати вигляд:

$$k = \frac{\sqrt{h^2+q^2+1}}{2\lambda^2 + 2s\lambda\mu + t\mu^2} \quad (1)$$

Як ми зазначали, вартість цього k залежить лише від напрямних зміннихів цього перерізу (власне від напрямних зміннихів відповідної дотичної, що визначає положення перерізу).

Відомо, що для головних прямових перерізів вартість k є максимум або мінімум, а тому щоб знайти кути кривини, цих головних прямових перерізів, досить визначити вартости λ і μ, при яких будуть максимум або мінімум кута кривини k. Але змінних дві, а тому нам треба мати ще умову, що зв'язувала би.

Такою умовою є зв'язок між напрямними зміннихами дотичної, виведеної при обчисленню нормального кута (себто: (2) §59), а саме:

$$V = p\lambda + q\mu$$

Щоб виключити непотрібне нам V, ми пригадуємо вірш звичайної властивости напрямних зміннихів косого вектора й рівняння дотичної, а саме:

$$\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$$

Звідси маємо:

$$\lambda^2 + \mu^2 + (p\lambda + q\mu)^2 = 1 \quad \text{або:}$$

$$\lambda^2(1+p^2) + 2pq\lambda\mu + \mu^2(1+q^2) = 1 \quad \ldots (2)$$

Це й є та умова, що зв'язує наші змінні λ і μ.

Вартість R [вздовж (1)] має змінну лише в знаменнику, а тому досить знайти максимум та мінімум цього знаменника й тоді максимум'у знаменника буде відповідати мінімум R і навпаки. Отже ми маємо задачу:

Знайти максимум і мінімум функції:

$$f = r\lambda^2 + 2s\lambda\mu + t\mu^2 \quad \ldots (3)$$

де λ і μ зв'язані умовою (2). Розв'язуючи цю задачу способом Лагранжа з рівнянь (2) і (3) складаємо функцію:

$$U = r\lambda^2 + 2s\lambda\mu + t\mu^2 + \kappa[(1+p^2)\lambda^2 + 2pq\lambda\mu + (1+q^2)\mu^2]$$

де κ є довільний множник. Далі:

1) Беремо похідну цієї функції через λ і зрівнюємо її з нулем, маємо:

$$2r\lambda + 2s\mu + 2\kappa\lambda(1+p^2) + 2\kappa pq\mu = 0$$

або: $$\lambda r + s\mu + \kappa[\lambda(1+p^2) + pq\mu] = 0 \quad \ldots (\alpha)$$

2) Ще одне робимо з похідною функції через μ:

$$2s\lambda + 2t\mu + 2\kappa pq\lambda + 2\kappa\mu(1+q^2) = 0$$

або: $$s\lambda + t\mu + \kappa[pq\lambda + \mu(1+q^2)] = 0 \quad \ldots (\beta)$$

Щоб виключити невідомого множника k, ми помножимо рівняння (α) на λ, а рівняння (β) на μ й додамо їх, тоді:

$$(\lambda^2 r + 2\lambda\mu s + t\mu^2) + k[\lambda^2(1+p^2) + 2\lambda\mu pq + \mu^2(1+q^2)] = 0$$

Але множник в дужках ( ) є рівним з f [див. (3)], а множник в дужках [ ] є рівний з 1 [див. (2)]. Тому:

$$f + k = 0 \quad \text{або:} \quad k = -f$$

Вставляючи тепер вартість k в рівняння (α) і (β) одержимо:

$$\lambda r + s\mu - f[\lambda(1+p^2) + pq\mu] = 0 \quad (\gamma)$$

$$\lambda s + t\mu - f[\lambda pq + \mu(1+q^2)] = 0 \quad \ldots (\delta)$$

Виключимо звідси:

1) f, ми одержимо зв'язок поміж напрямними кутами головної дотичної (дотичні головних перерізів)

2) виключивши λ і μ одержимо рівняння, що визначатиме R_1 і R_2 головних перерізів. Справді:

I) 1) виключимо f з обох рівнянь і прирівняємо одержані вартости, маємо:

$$\frac{\lambda r + s\mu}{\lambda(1+p^2) + pq\mu} = \frac{\lambda s + t\mu}{\lambda pq + \mu(1+q^2)}$$

А звідси після зведення до спільного знаменника й упорядкування, маємо:

$$\lambda^2[s(1+p^2) - rpq] + \lambda\mu[(1+p^2)t - (1+q^2)r] + \mu^2[tpq - s(1+q^2)] = 0 \quad \ldots (\varepsilon)$$

Ці рівняння складено при виконанні умов максимума й мінімума для R, а тому умо-

ляг звязок між напрямними косинусами головної дотичної (є 2 величини для кожної із 2^n головних дотичних)

Це рівняння є однорідним, а тому з нього легко визначити відношення цих напрямних косинусів, а саме означимо відношення:

$$\frac{\mu}{\lambda} = \psi$$

маємо:

$$\psi^2 \cdot \left[pqt - (1+q^2)s\right] + \psi\left[(1+p^2)t - (1+q^2)r\right] + \left[(1+p^2)s - pqr\right] = 0 \quad \cdots (112)$$

де $\mu = \lambda\psi$.

Припустимо, що розв'язавши рівняння (112) ми одержимо дві величини: ψ_1 і ψ_2. Щоб визначити самі λ і μ ми скористуємося рівнянням (2). Справді, коли вставимо в нього величини $\mu = \lambda\psi_1$ і $\mu = \lambda\psi_2$, то одержимо:

$$\lambda^2(1+p^2) + 2pq\lambda^2\psi_1 + (1+q^2)\lambda^2\psi_1^2 = 1$$

або $$\lambda^2\left[(1+p^2) + 2pq\psi_1 + (1+q^2)\psi_1^2\right] = 1$$

А звідси:

$$\lambda_1 = \frac{\pm 1}{\sqrt{(1+p^2) + 2pq\psi_1 + (1+q^2)\psi_1^2}}$$

Аналогічно:

$$\lambda_2 = \frac{\pm 1}{\sqrt{(1+p^2) + 2pq\psi_2 + (1+q^2)\psi_2^2}} \qquad (113)$$

Тому:

$$\mu_1 = \frac{\pm \psi_1}{\sqrt{(1+p^2) + 2pq\psi_1 + (1+q^2)\psi_1^2}}$$

$$\mu_2 = \frac{\pm \psi_2}{\sqrt{(1+p^2) + 2pq\psi_2 + (1+q^2)\psi_2^2}}$$

Знаки ± відповідають протилежним нап-

рахунки від точки долучу взаємно однієї і тієї долучної, а тому будемо далі брати лише +.

II) Використовуємо рівняння (8) і (6) і маємо:

$$\lambda[2 - f(1+p^2)] + \mu(1 - pqf) = 0$$

$$\lambda[1 - pqf] + \mu[t - f(1+q^2)] = 0$$

Щоб виключити λ і μ складаємо пропорції й порівнюємо їх маємо:

$$\frac{\lambda}{-\mu} = \frac{t - f(1+q^2)}{1 - pqf} = \frac{1 - pqf}{2 - f(1+p^2)}$$

Звідси:

$$(1 - pqf)^2 = [2 - f(1+p^2)][t - f(1+q^2)]$$

або: $$f^2[p^2q^2 - (1+p^2)(1+q^2)] + f[t(1+p^2) + 2(1+q^2) - 2pq1] + (1^2 - 2t) = 0$$

Отже:

$$-f^2(p^2+q^2+1) + f[t(1+p^2) + 2(1+q^2) - 2pq1] - (2t - 1^2) = 0$$

або: $$f^2(p^2+q^2+1) - f[t(1+p^2) + 2(1+q^2) - 2pq1] + (2t - 1^2) = 0$$

Але:

$$R = \frac{\sqrt{p^2+q^2+1}}{f}$$

тому:

$$f = \frac{\sqrt{p^2+q^2+1}}{R}$$

а вставляючи це значення в наше рівняння, та зводячи його до спільного знаменника одержимо:

$$(2t - 1^2)R^2 - \sqrt{p^2+q^2+1}\,[t(1+p^2) + 2(1+q^2) - 2pq1]R +$$

$$+ (p^2+q^2+1)^2 = 0 \quad \cdots \cdots (114)$$

Рівняння (114) дає два розв'язки R_1, R_2 куїв перпендикулярних головних променевих перерізів.

§64. Обчислення головних кривин поверхні: Гаусса й Ейлера.

Коли ніяк вставим $f = \frac{\sqrt{p^2+q^2+1}}{R}$ ми не будемо вводити рівняння до спільного знаменника [це тепер, коли всі члени рівняння (114) поділимо на R^2] по порядку:

$$(p^2+q^2+1)\cdot\left(\frac{1}{R}\right)^2 - \sqrt{p^2+q^2+1}\left[t(1+p^2)-2(1+q^2)-2pqs\right]\frac{1}{R} + (rt-s^2) = 0$$

або:

$$\left(\frac{1}{R}\right)^2 - \frac{t(1+p^2)-2(1+q^2)-2pqs}{(p^2+q^2+1)^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{R} + \frac{rt-s^2}{(p^2+q+1)^2} = 0.$$

З властивостей розв'язків квадратових рівнянь маємо:

1) Вираз Ейлерової кривини (нормальної):

$$H = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{t(1+p^2)+2(1+q^2)-2pqs}{(p^2+q^2+1)^{\frac{3}{2}}} \quad \cdots (115)$$

2) Вираз Гаусової кривини.

$$\mathcal{K} = \frac{1}{R_1 R_2} = \frac{rt-s^2}{(p^2+q^2+1)^2} \quad \cdots (116)$$

Вірш (116) показує, що яку б систему координат ми не взяли б:

для еліптичної точки: $rt-s^2>0$ завжди: $\mathcal{K}>0$

" параболічної " : $rt-s^2=0$ " $\mathcal{K}=0$

" гіперболічної " : $rt-s^2<0$ " $\mathcal{K}<0$

§65. Кривизна лінії.

Збудуємо на даній поверхні з точкою її точці головні перерізи й виберемо з цих точок ті, що знаходяться геометричний осередок дотичних до всіх головних дотичних, проведених через ці точки.

Згадані точки утворять криву, що дотичні до неї в кожній її точці будуть головними дотичними до самої поверхні. Такі криві звуться <u>кривизними лініями</u>, або <u>лініями кривизни поверхні</u>

Очевидно, що через кожну точку поверхні переходить по 2 кривизні лінії відповідно двом головним дотичним в цій точці. Коли знаходимо всі кривизні лінії, то знаходимо й всі головні прямові перерізи в кожній точці поверхні, а тим самим можемо цілком дослідити характер самої поверхні.

<u>Знайдемо рівняння кривизної лінії.</u> Очевидно, що першим рівнянням її буде рівняння поверхні, на якій ця лінія лежить, себто:

$$z = f(x, y) \quad \ldots\ldots \quad (\alpha)$$

З другого боку дотичні до цієї кривої в однозначно й головними дотичними (уздовж) точками поверхні, а тому напрями знайшли їй мусять задовольняти рівнянню (112) попереднього §, а саме:

$$\psi^2[\mu q t - (1+q^2)s] + \psi[t(1+p^2) - r(1+q^2)] + [(1+p^2)s - \mu q r] = 0$$

де $\mu = \lambda\psi$. Але напрями знайшли λ і μ, як дотичних до даної кривої висловлюються як:

$$\lambda = \frac{dx}{db} \; ; \quad \mu = \frac{dy}{db}$$

де db є диференціал дуги кривої. А звідси:

$$\psi = \frac{\mu}{\lambda} = \frac{dy}{dx}$$

Маючи лінії остання рівняння матиме вигляд:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\left[rt+(1+q^2)s\right]+\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\left[t(1+p^2)-2(1+q^2)\right]+\left[(1+p^2)s-pqr\right]=0 \quad \ldots(\beta)$$

Рівняння (α) і (β) визначають потрібну кривину лінію. На жаль, ми не знаємо ще інтегрування диференційних рівнянь не зможемо операувати рівняннями (α) і (β) в загальному вигляді й обмежимося лише окремими випадками.

Приклад. Знайти кривині лінії поверхні обертового тіла рівняння:

$$z=f(x^2+y^2) \quad \text{або} \quad z=f(R), \text{ бо } x^2+y^2=R^2$$

Складаємо рівняння (β) і для цього обчислюємо

1) $p=\frac{\partial f}{\partial x}=f'\cdot 2x=2xf'$; 2) $q=\frac{\partial f}{\partial y}=2yf'$

3) $r=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2xf''+2f'=4x^2f''+2f'$

4) $t=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=4y^2f''+2f'$ 5) $s=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=4xyf''$

Маємо:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\left[16xy^3f'^2f''+8xyf'^3-4xyf''-16xy^3f'^2f''\right]+$$

$$+\frac{\partial y}{\partial x}\left[4y^2f''+2f'+16x^2y^2f'^2f''+8x^2f'^3-4x^2f''-2f'-16x^2y^2f'^2f''-8y^2f'^3\right]+$$

$$+4xyf''+16x^3yf'^2f''-16x^3yf'^2f''-8xyf'^3=0$$

Звідси:

$$4xy(2f'^3-f'')\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left[8f'^3(x^2-y^2)-4f''(x^2-y^2)\right]\frac{dy}{dx}-$$

$$-4xy\left[2f'^3-f''\right]=0 \quad \text{або:}$$

$$4xy(2f'^3-f'')\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+4(x^2-y^2)(2f'^3-f'')\frac{dy}{dx}-4xy\left[2f'^3-f''\right]=0$$

Винесемо за дужки: $4(2f'^3-f'')$, маємо:

$$4(2f'^3-f'')\left[xy\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+(x^2-y^2)\frac{dy}{dx}-xy\right]=0$$

А звідси:

$$xy\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + (x^2-y^2)\frac{dy}{dx} - xy = 0$$

Або означивши $\frac{dy}{dx} = u$, маємо:

$$xyu^2 + x^2u - y^2u - xy = 0$$

звідси:

$$xu(yu+x) - y(yu+x) = 0 \quad \text{або:} \quad (yu+x)(xu-y) = 0$$

тому:

$$(yu+x) = 0 \; ; \qquad xu - y = 0$$

Себто:

$$\text{I)}\; y\frac{dy}{dx} + x = 0 \qquad \text{II)}\; x\frac{dy}{dx} - y = 0$$

I) зводимо до спільного знаменника: $ydy + xdx = 0$ і інтегруємо: $\int ydy + \int xdx = c_1$ маємо $\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} = c_1$ або $x^2+y^2 = 2c_1 = c^2$ (const).

Отже рівняння кривизної кривої будуть:

$$z = f(x^2+y^2) \; ; \quad x^2+y^2 = c^2 = R^2 = (\text{const}).$$

звідси:

$$z = f(c^2) = d(\text{const})$$

Себто всі кривизні лінії лежать в площині паралельній до осі z (рівнобіжній до площі xOy) бо d зі зміною інтегрування є довільним. Очевидно, що ці кривизні лінії є кругом, паралельні до осі z-ів (рівнобіжні, або концентр.)

II). $x\frac{dy}{dx} - y = 0$, або: $xdy - ydx = 0$

Ділимо всі члени на x^2, маємо:

$$\frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

А звідси:

$$\int d\left(\frac{y}{x}\right) = C\,(\text{const}) \; ; \quad \frac{y}{x} = C \; ; \quad y = Cx.$$

Маємо також одержимо теж рівняння кривинної лінії:

$$1)\ z = f(x^2+y^2) \quad і \quad 2)\ y = Cx$$

Друге рівняння є рівняння сліду площі, що переходить через вісь z-ів. При змінності вартості C, це буде рівняння кожної площі з осьовою нерухомою площу, що має своєю віссю вісь z-ів. Маємо також для кожної точки поверхні кривинна лінія є перетином поверхні з цією площею (меридіяни).

§ 66. Огинальні поверхні.

Візьмімо рівняння поверхні:

$$f(x, y, z, a) = 0$$

де a є довільний змінний. Очевидно, що це буде загальним рівнянням родини поверхень. Кожний окремій вартості $a = a_0$ буде відповідати одна певна поверхня цієї родини. Для всіх точок таких поверхні змінних називаються сталими і змінюється лише при переході від однієї поверхні до другої.

Розглянемо дві досить близькі поверхні, що відрізняються змінними: a і $a+\Delta a$, їх рівняння будуть:

$$\begin{cases} f(x, y, z, a) = 0 \\ f(x, y, z, a+\Delta a) = 0 \end{cases} \quad (A)$$

Візьмемо Δa теж малим, щоб ці поверхні могли перехрещуватися вздовж якоїсь кри-




Рис. 139

вої AB' (рис. 139). Коли вартість Δd будемо змінювати, тоді щоб це Δd прямувало до нуля, то разом з цим перерізом цим плоду AB' буде змінювати й свої положення й форму (AB'' і т. д.). Припустимо, що лезовій вартості Δd відповідає деяка лінія перехрещення AB, що її будемо звати <u>прилеглою кривою родини</u>.

Очевидно, що кожна лінія перехрещення двох поверень родини визначатиметься рівняннями (A), яко системою. Прилегла же крива тієюж визначатиметься тією же системою при умові, що $\Delta d \to 0$

Складаючи з рівнянь системи (A) нове рівняння, відрізняючи з 2-го рівняння 1-ше і ділячи вирізу на Δd, а саме:

$$\frac{f(x,y,z,d+\Delta d)-f(x,y,z,d)}{\Delta d}=0$$

Це рівняння як виходить з даних може заступити нам кожне із рівнянь системи (A), а тому ми створимо нову систему:

$$f(x,y,z,d)=0$$

$$\frac{f(x,y,z,d+\Delta d)-f(x,y,z,d)}{\Delta d}=0$$

що є еквівалентною з попередньою. Як ми вже зазначали, щоб одержати рівняння прилеглої кривої, треба взяти випадок $\lim \Delta d=0$ й ми приходимо до системи:

$$\left.\begin{aligned} f(x,y,z,d)&=0 \quad (1)\\ f'_d(x,y,z,d)&=0 \quad (2)\end{aligned}\right\} \ldots (117)$$

Очевидно, що в залежності від вартості α, що дає лежачими кожний раз на певній поверхні, що належить даній родині. Отже шуканих кривих буде безліч і всі вони створюватимуть геометричний осередок, що ми назвемо <u>огинальної поверхні даної родини поверхонь.</u> Самі ж огинальні поверхні даної родини звуться огинаючими.

Очевидно, що рівняння огинальної поверхні не залежатиме від окремих вартостей змінного α й тому одержиться шляхом виключення його з рівняння (117). Це виключення можемо зробити так: 1) виключимо α з рівняння [117,(2)] як якусь функцію від x, y, z і вставимо в рівняння [117,(1)], тоді одержимо нове рівняння:

$$\varphi(x, y, z) = 0 \quad \ldots (13)$$

що й є рівнянням огинальної поверхні. Цей спосіб дає право в деяких випадках вважати рівняння [117,(1)]:

$$f(x, y, z, \alpha) = 0$$

за рівняння огинальної, при умові, що в цьому разі α – не є довільним змінним, а функцією: $\alpha = \varphi(x, y, z)$, визначеного з рівняння [117,(2)], себто $f'_\alpha(x, y, z, \alpha) = 0$. Це дає змогу й огинальну й огинаючу поверхню визначити рівнянням цілої родини:

$$f(x, y, z, \alpha) = 0 .$$

З цього випливає:

1) Коли $f(x, y, z, \alpha) = 0$ – є рівнянням сталої роди-

ти, то d в цьому є довільний змінний, якому можемо давати дві безліч довільні величини.

2) Коли $f(x,y,z,d)=0$ є рівнянням одної з огортаючих поверхонь (одної поверхні з родини), то d є в цьому певною сталою величиною $=d_0$.

3) Коли $f(x,y,z,d)=0$ є рівнянням огортаючої, то d в цьому є <u>змінною функцією</u> x,y,z, визначеною з допоміжного рівняння $f'_d(x,y,z,d)=0$

<u>Приклад.</u> Знайти огортаючу родини кулі сталого радіуса r, центри яких розташовані вздовж осі x-ів.




Рис. 140

Центр кулі, що розташована вздовж осі x-ів, матиме його координати $(d,0,0)$, де d є довільно-змінним. Тому рівняння родини кулі буде:

$$(x-d)^2+y^2+z^2=r^2$$

Допоміжне рівняння: $f'_d(x,y,z,d)=0$ матиме вигляд:

$$-2(x-d)=0. \quad \text{Отже } d=x.$$

Через це рівняння огортаючої буде:

$$y^2+z^2=r^2$$

Це рівняння прямого кругового, що лежить центральний контур на площині yz і всі вісь самих вісь x-ів (рис. 140).

Зрештою огортаючі родини кулі сталого радіуса творять теж звані циліндричні поверхні.

§ 67. Основна властивість огинаючих поверхонь.

Огинаюча поверхня має спільну дотичну площину з кожною з огинаних поверхонь у всіх точках, відповідних для цієї огинаної, принаймні однієї. (Інакше, огинаюча дотикається кожної з огинаних поверхонь у всіх точках її принаймні однієї).

Нехай дана огинаюча поверхня внаслідок певного параметра $a=a_0$, себто її рівняння буде:

$$f(x,y,z,a_0)=0 \quad \cdots (\alpha)$$

Рівняння не огинаної буде:

$$f(x,y,z,a)=0 \quad \cdots (\beta)$$

де a є функцією x,y,z, визначеною з рівняння

$$\frac{\partial f(x,y,z,a)}{\partial a}=0 \quad \cdots (\gamma)$$

Нормальне рівняння площі дотичної для кожної з цих поверхонь в їх спільній точці $M(x,y,z)$ Ми знаємо, що рівняння дотичної площі до поверхні (α) буде:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(X-x)+\frac{\partial f}{\partial y}(Y-y)+\frac{\partial f}{\partial z}(Z-z)=0 \quad \cdots (\delta)$$

бо $a_0=\text{const}$. Рівняння ж дотичної площі до огинаної поверхні (β) напишеться нам:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f)(X-x)+\frac{\partial}{\partial y}(f)\cdot(Y-y)+\frac{\partial}{\partial z}(f)\cdot(Z-z)=0$$

де символом $\frac{\partial}{\partial x}(f)$ означимо похідну взяту по x від $f(x,y,z,a)$, де a є якоюсь функцією x і т. д.

Тому:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial x};\ \frac{\partial}{\partial y}(f) = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial y};\ \frac{\partial}{\partial z}(f) = \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial z}$$

Отже рівняння дотичної до огинальної поверхні матиме вигляд:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial x}\right](X-x) + \left[\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial y}\right](Y-y) + \left[\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\cdot\frac{\partial \alpha}{\partial z}\right](Z-z) = 0$$

Або:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial f}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial f}{\partial z}(Z-z)\right] +$$

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha}\left[\frac{\partial \alpha}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial \alpha}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial \alpha}{\partial z}(Z-z)\right] = 0$$

Але після умові α вилучається з рівняння (8) себто з рівності $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 0$, а тому другий доданок лівої частини рівняння є рівний з нулем. Отже рівняння площі дотичної в точці M до огинальної поверхні матиме вигляд:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial f}{\partial y}(Y-y) + \frac{\partial f}{\partial z}(Z-z) = 0 \quad \ldots (\varepsilon)$$

Рівняння (ε) і (δ) умовам одночасові.

Ми брали точку M спільну й для огинальної й для огинаної поверхні, а ми знаємо з самого визначення прилеглої кривої, що для точки можна провести й на ній, себто задовольняти рівняння (117). Цілком тепер теорема є доведеною.

§68. Огинальні поверхні 2-го роду.

Припустимо, що ми маємо однопараметрову, що підлягає двоїстій неособливій залежності α і β. Рівняння такої системи буде:

$$f(x, y, z, \alpha, \beta) = 0$$

Дано множину значень змінного β певну величину β_0 й візьмімо дві яких буде поверхні з даної родини, що відповідають певним значенням величини α, напр.

$$f(x, y, z, \alpha, \beta) = 0$$
$$\text{і} \quad f(x, y, z, \alpha + \Delta\alpha, \beta) = 0$$

Дібрання $\Delta\alpha$ теж значне, щоб ці поверхні перетинались, очевидно, вздовж якоїсь криві ab. Коли $\Delta\alpha$ буде змінювати свою величину, прямуючи до нуля, то й крива ab буде змінювати свої положення й форму і у випадку $\lim \Delta\alpha = 0$ ця крива прийме якесь остаточне положення й форму. Цю криву будемо звати <u>прилеглою кривою поверхні</u> <u>взятої</u> <u>значення α.</u>

Очевидно, що її рівняння одержимо міркуваннями попереднього § і вони матимуть вигляд:

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, \alpha, \beta) &= 0 \\ f'_\alpha(x, y, z, \alpha, \beta) &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (A)$$

Також одержимо рівняння <u>прилеглої кривої</u> <u>взятої значення β</u>, а саме:

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, \alpha, \beta) &= 0 \\ f'_\beta(x, y, z, \alpha, \beta) &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (B)$$

Значенням одночасно і α і β ми одержимо ряд поверхонь, що матимуть спільною лише одну спільну точку (перетин прилеглих кривих (A) і (B)). Ця точка має назву прилеглої точки системи поверхонь. Ясна річ, координати прилеглої точки можна визначити розв'язавши систему рівнянь:

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, \alpha, \beta) &= 0 \quad (1) \\ f'_\alpha(x, y, z, \alpha, \beta) &= 0 \quad (2) \\ f'_\beta(x, y, z, \alpha, \beta) &= 0 \quad (3) \end{aligned}\right\} \ldots (118)$$

У висліді розв'язання системи цієї можна виражати як функції α і β, себто:

$$x = \varphi(\alpha, \beta); \quad y = \psi(\alpha, \beta) \text{ і } z = \chi(\alpha, \beta) \ldots (C)$$

Коли α і β матимуть певні вартости, що відповідають даній околиці поверхні, то ми одержимо певну приналежну точку. Коли ж α і β будуть змінними то очевидно, ми матимемо справу з геометричним осередком приналежних точок, себто з поверхнею. Ця поверхня звється огорнувальною поверхнею системи поверхонь або <u>огорнувальною поверхнею 2го роду.</u>

Щоб на основу поверхню можна було одержати, коли з рівнянь (2) і (3) системи (118) виключимо α і β як функції x, y, z і вставимо їх в рівняння (1) тієї ж системи (118). Тоді коли рівняння (1) системи (118) можна розглядати:

1) Як рівняння родини поверхонь, коли α і β є довільно-змінними величинами (змінними)

2) Як рівняння окремої поверхні родини, коли α і β мають певні сталі вартости.

і 3) Як рівняння огорнувальної поверхні 2го роду коли α і β є змінні величини функції x, y і z, що виключаються з рівнянь (2) і (3) системи (118).

§69. <u>Основна властивість огорнувальної поверхні 2го роду.</u>

Огорнувальна поверхня 2го роду має спільну

дотичну площину з кожного огорненого поверхнею в її прилеглій точці.

Дано α і β певні величини α_0, β_0. Моді рівняння даної огорненої поверхні буде:

$$f(x, y, z, \alpha_0, \beta_0) = 0 \quad (a)$$

Візьмім прилеглу точку $M(x, y, z)$ [що визначається рівняннями: $x = \varphi(\alpha_0, \beta_0)$; $y = \psi(\alpha_0, \beta_0)$ і $z = \chi(\alpha_0, \beta_0)$] і через неї поведемо площину дотичну до поверхні (a). Рівняння її буде:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(X - x) + \frac{\partial f}{\partial y}(Y - y) + \frac{\partial f}{\partial z}(Z - z) = 0 \quad \cdots (b)$$

де α_0 і β_0 = const. Рівняння же огорнальної поверхні, як доведено, буде:

$$f(x, y, z, \alpha, \beta) = 0 \quad \cdots (b)$$

де α і β – певні функції x, y, z виражені з рівнянь (2) і (3) системи (118). Точка M, як прилегла лежить і на огорнальній площині. Значить рівняння дотичної площі, поведеної до огорнальної поверхні через цю точку M, матиме вигляд:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f) \cdot (X - x) + \frac{\partial}{\partial y}(f) \cdot (Y - y) + \frac{\partial}{\partial z}(f)(Z - z) = 0$$

Але f – функція x, y, z безпосередньо й через α і β, а тому:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \alpha} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \beta} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial x}; \quad \frac{\partial}{\partial y}(f) = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \alpha} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \beta} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial y}$$

$$\text{і } \frac{\partial}{\partial z}(f) = \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \alpha} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \beta} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial z}$$

Значить рівняння нашої дотичної площі матиме вигляд:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(X - x) + \frac{\partial f}{\partial y}(Y - y) + \frac{\partial f}{\partial z}(Z - z)\right] + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\left[\frac{\partial \alpha}{\partial x}(X - x) + \frac{\partial \alpha}{\partial y}(Y - y) + \frac{\partial \alpha}{\partial z}(Z - z) + \right.$$

$$+\frac{\partial f}{\partial \beta}\left[\frac{\partial \beta}{\partial x}(X-x)+\frac{\partial \beta}{\partial y}(Y-y)+\frac{\partial \beta}{\partial z}(Z-z)\right]=0$$

Ми знаємо, що α і β визначаються з рівнянь (2) і (3) системи (118), а саме з рівнянь:

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha}=0 \quad \text{і} \quad \frac{\partial f}{\partial \beta}=0$$

Через це, вставляючи ці вартості в попередні рівняння ми одержимо остаточно рівняння площі дотичної до огортаючої поверхні в такому вигляді:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(X-x)+\frac{\partial f}{\partial y}(Y-y)+\frac{\partial f}{\partial z}(Z-z)=0 \cdots (9)$$

Порівнюючи рівняння (8) і (9) переконуємося в правдивості нашої теореми.

Приклад. Знайти огортаючу родини еліпсоїдів сталої величини осей, що своїм центром і довжиною з цих осей лежить на площі XY.

Хай осі еліпсоїди будуть: a, b і c, а координати центру $(\alpha, \beta, 0)$. Тоді рівняння еліпсоїди буде:

$$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2}+\frac{(y-\beta)^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \cdots (1)$$

Беручи похідні цього рівняння через α і β й, прирівнюючи одержані нові рівняння до першого, матимемо систему:

$$\left.\begin{array}{l}\dfrac{(x-\alpha)^2}{a^2}+\dfrac{(y-\beta)^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\\ x=\alpha\\ y=\beta\end{array}\right\} \cdots (2)$$

бо: $-\frac{2(x-\alpha)}{a^2}=0$ і $-\frac{2(y-\beta)}{b^2}=0$. Вилучуючи з цієї системи змінних α і β шуканого рівнян-

на ортогональної поверхні, а саме:

$$z^2 = c^2 \; ; \quad z = \pm c \quad \ldots (3)$$

Рівняння (3) є системою двох площин рівновіддалених і віддалених від площі хоу на величину осі с.

§70 Рух повороту.

Хай родина поверхонь визначається рівнянням:

$$f(x, y, z, \alpha) = 0 \quad \ldots (\alpha)$$

і залежить від одного змінника.

Візьмімо з досить близької поверхні з цієї родини таки, щоб вони відповідали вартостям змінника:

$$\alpha, \quad \alpha + \Delta\alpha, \quad \alpha + \Delta_1\alpha$$

Тепер добираємо вартості $\Delta\alpha$ і $\Delta_1\alpha$ таки, щоб ці поверхні перехрещувалися. Але кожні три поверхні перехрещуються в одній або в кількох точках і, щоб визначити значення цього перехрещення, треба розв'язати як систему рівнянь цих поверхонь, а саме:

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, \alpha) &= 0 \\ f(x, y, z, \alpha + \Delta\alpha) &= 0 \\ f(x, y, z, \alpha + \Delta_1\alpha) &= 0 \end{aligned}\right\} \cdots (\beta)$$

Скасавши, як і в попередньому § рівняння:

$$1) \quad \frac{f(x, y, z, \alpha + \Delta\alpha) - f(x, y, z, \alpha)}{\Delta\alpha} = 0$$

$$\frac{f(x, y, z, \alpha + \Delta_1\alpha) - f(x, y, z, \alpha + \Delta\alpha)}{\Delta_1\alpha - \Delta\alpha} = 0$$

Ці рівняння як випливні з системи (β) можуть також заступити дві останні її рівняння.

Коли $\Delta\alpha$ і $\Delta_1\alpha$ будуть прямувати до нуля, то ми одержимо остаточне положення перехрестя поверхонь, що належить прикметного точкою (їх також буває одна, а може бути й декілька). Тоді значення цієї точки визначаються з системи:

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, \alpha) &= 0 \\ f'_\alpha(x, y, z, \alpha) &= 0 \\ f'_\alpha(x, y, z, \alpha+\Delta\alpha) &= 0 \end{aligned}\right\} \dots (\gamma)$$

У свою чергу ми можемо скласти наближене рівняння:

$$\lim_{\Delta\alpha \to 0} \frac{f'_\alpha(x, y, z, \alpha+\Delta\alpha) - f'_\alpha(x, y, z, \alpha)}{\Delta\alpha} = 0$$

або:

$$f''_\alpha(x, y, z, \alpha) = 0$$

Це рівняння, як випливне з двох останніх може заступити в системі перше рівняння, а тому остаточно маємо систему:

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, \alpha) &= 0 \quad (1) \\ f'_\alpha(x, y, z, \alpha) &= 0 \quad (2) \\ f''_\alpha(x, y, z, \alpha) &= 0 \quad (3) \end{aligned}\right\} \dots (119)$$

Для системи ці дає визначити значення точки x, y, z, а саме:

$$x = \varphi(\alpha); \quad y = \psi(\alpha) \quad \text{і} \quad z = \chi(\alpha) \dots (120)$$

де α стала величина, що відповідає даній ос-

ремій поверхні родини.

Коли ж ми α будемо давати все нові й нові вартості, то визначатимемо все нові й нові прилеглі точки, що відповідатимуть геодезичній лінії все нової поверхні з родини.

Нарешті, коли взяти α за змінну, то рівняння (120) будуть рівняннями геометричного осередку всіх прилеглих точок. Цей геометричний осередок, як бачимо зараз, рівняння і крива й зветься <u>рубом повороту родини поверхонь</u>.

З огляду на те, що в системі (119) входять перші два рівняння, що визначають відповідну прилеглу криву, то геодезична прилеглих точок лежить завжди на відповідній прилеглій кривій, а тому й геометричний осередок цих точок, себто руб повороту цілковито лежить на огинальній поверхні.

Вилучивши α зі всіх трьох рівнянь системи (119) дістанемо рівняння рубу повороту у вигляді:

$$F(x, y, z) = 0 \,, \quad \Phi(x, y, z) = 0 \,,$$

як перерізання двох поверхонь. Це вилучення α можемо перевести так: вилучити α з рівняння (3) системи (119) як функцію x, y, z і знайдену вартість $\alpha = \psi(x, y, z)$ вставити а) в рівняння (1) і б) в рівняння (2) даної системи (119). Матимемо такі рівняння

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, \alpha) &= 0 \\ f'_\alpha(x, y, z, \alpha) &= 0 \end{aligned}\right\} \ldots (121)$$

[де $\alpha = \psi(x, y, z)$ визначене з рівняння (3) системи (119)] є системою рівнянь, що визначають рух повороту.

§71. Основна властивість руху повороту.

Рух повороту є доторкальною всіх приєднаних кривих рухів, себто рух повороту має спільну дотичну з відповідною приєднаною кривою, що переходить через точку дотику.

Коли точка дотику є спільна й для руху повороту й для приєднаної кривої, то для знаходження дотичних до обох даних кривих досить, щоб і напрями знайшли їх дотичних були однакові.

Рівняння косої дотичної до якої будь кривої має вигляд:

$$\frac{X - x}{dx} = \frac{Y - y}{dy} = \frac{Z - z}{dz} \quad \ldots (\alpha)$$

Отже напрями знаходимо пропорційні похідні dx, dy і dz.

Ми знаємо, що косина приєднана крива визначається рівняннями:

$$f(x, y, z, \alpha) = 0$$
$$f'_\alpha(x, y, z, \alpha) = 0$$

де α для косої огинної приєднаної кривої має певну сталу вартість α_0.

Щоб визначити dx, dy, dz треба буде продиференціювати ці рівняння й дістанемо:

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz &= 0 \\ \frac{\partial f'_\alpha}{\partial x}dx + \frac{\partial f'_\alpha}{\partial y}dy + \frac{\partial f'_\alpha}{\partial z}dz &= 0 \end{aligned}\right\} \dots (\beta)$$

бо $\alpha = \text{const}$.

З другого боку вартости dx, dy і dz для рівняння дотичної до руху повороту ми визначимо продиференціювавши рівняння цього руху, а саме рівняння (121). Тоді ми

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz + \frac{\partial f}{\partial \alpha}d\alpha &= 0 \\ \frac{\partial f'_\alpha}{\partial x}dx + \frac{\partial f'_\alpha}{\partial y}dy + \frac{\partial f'_\alpha}{\partial z}dz + \frac{\partial f'_\alpha}{\partial \alpha}d\alpha &= 0 \end{aligned}\right\}$$

, де $\alpha = \Psi(x,y,z)$ визначене з рівняння (3)(б)

Але з рівнянь (2) і (3) системи (119) бачимо, що $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = f'_\alpha = 0$ і $\frac{\partial f'_\alpha}{\partial \alpha} = f''_\alpha = 0$. Тому для визначення вартостей dx, dy, dz для рівняння дотичної до руху повороту маємо систему:

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz &= 0 \\ \frac{\partial f'_\alpha}{\partial x}dx + \frac{\partial f'_\alpha}{\partial y}dy + \frac{\partial f'_\alpha}{\partial z}dz &= 0 \end{aligned}\right\} \dots (\gamma)$$

Порівнюючи системи (β) і (γ) і ми бачимо, що вони є однакові, а тому й їх розв'язки dx, dy і dz є однакові, а це доводить що дотичні до руху повороту й відповідної приєднаної кривої співпадають в одну.

Приклад. Знайти огортальну поверхню й рух повороту родини кіл даного сталого кута, що мають центри в одній площині й заслоняють від одного зіниця.

Центри кіл лежать в одній площині, якщо вісь

мело за площу xy. Тоді множина центру можемо описати:

$$x = \alpha; \quad y = \varphi(\alpha); \quad z = 0$$

Себто центри покувалося вздовж напрямної кривої рівняння $y = \varphi(x)$. Тому рівняння родини куль буде:

$$(x-\alpha)^2 + [y - \varphi(\alpha)]^2 + z^2 = r^2 \quad \ldots (\alpha)$$

Щоб знайти огортальну поверхню берем похідну через α і маємо:

$$-2(x-\alpha) - 2[y - \varphi(\alpha)]\varphi'(\alpha) = 0$$

або: $$x - \alpha + [y - \varphi(\alpha)]\varphi'(\alpha) = 0 \quad \ldots\ldots (\beta)$$

Вилучивши α з рівнянь (α) і (β) матимемо огортальну поверхню даної родини куль. Щоб дослідити цю огортальну, ми звернемо увагу на те, що рівняння (β) є першого ступеня, себто є рівнянням площі. Площа перетинає кулю по кругах, а тому всі прилеглі криві поверхні є кругами.

Значення центру задовольняють рівняння (β), а тому прилеглі криві є великі кругами куль. Далі рівняння (β) показує, що площа (β) є площею паралельною до площі xy, а тому остання є площею симетрії огортальної поверхні.

Ці дослідження показують, що огортальна поверхня має форму труби й тому зветься трубчастою поверхнею.

Диференціюючи рівняння родини удруге через маємо:

$$[y - \varphi(\alpha)]\,\varphi''(\alpha) = 1 + \varphi'^2(\alpha) \quad \ldots\ldots\ldots (\gamma)$$

Рівняння (α), (β) і (γ) після вилучення з них змінних α і β дасть рівняння руху повороту, або теж рівняння повороту одержимо виключивши з рівнянь (α), (β) і (γ) величини x, y, z, а саме:

$$x = \alpha - \frac{[1+\varphi'^2(\alpha)]\,\varphi'(\alpha)}{\varphi''(\alpha)}$$

$$y = \varphi(\alpha) + \frac{1 + \varphi'^2(\alpha)}{\varphi''(\alpha)}$$

$$z = c^2 - \frac{[1+\varphi'^2(\alpha)]^3}{\varphi''^2(\alpha)}$$

§72. Поверхні розгортання.

Ми знаємо, що кожна поверхня є певного роду геометричний осередок точок, зв'язаних рівнянням виляду $F(x, y, z) = 0$. Між цими поверхнями можуть бути й такі, що на них ніяку частину й положення не може прилягати проста лінія, а будуть і такі, що на них може прилягати цілка сукупність простих. Тоді ці поверхні творяться рухом, згідно певного закона, простої. Напр. циліндрична поверхня або поверхня однополої гіперболоїди і т. д. Такі поверхні звуться лінійними. Деякі з лінійних поверхень можемо розгорнути в площу, напр., циліндричну, або конічну, а деякі, напр. поверхню згаданого гіперболоїда або гіперболічного параболоїда розгорнути в площу не можемо. Першого роду лінійні поверхні мають назву прямих

лінійних поверхень або поверхень розгортання, а другого роду носять назву <u>усіх лінійних поверхень</u>

Завдання цього § є дослідження принципів і властивостей лінійних поверхень 1-го роду, себто поверхень розгортання.

Візьмімо родину площин, що залежать від одного даного змінника t. Рівняння такої родини можемо написати так:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

де коефіцієнти A, B, C і D є функціями даного змінника t. Визначимо з цього рівняння z і матимемо

$$z = -\frac{A}{C}x - \frac{B}{C}y - \frac{D}{C}$$

Нові коефіцієнти $-\frac{A}{C}, -\frac{B}{C}, -\frac{D}{C}$ будуть також певними функціями t. Перетворимо ці функції так: візьмімо за нового змінника $\alpha = -\frac{A}{C} = f(t)$ і визначимо з нього t. Коли ми тепер вставимо вартість t в функцію $-\frac{B}{C}$ і $-\frac{D}{C}$, то перетворимо їх також в певні функції від α, а саме:

$$-\frac{A}{C} = \alpha \; ; \quad -\frac{B}{C} = \varphi(\alpha) \text{ і } -\frac{D}{C} = \psi(\alpha)$$

Тепер також рівняння родини матиме вигляд:

$$z = \alpha x + \varphi(\alpha)\, y + \psi(\alpha) \quad \ldots\ldots \quad (122)$$

Рівняння (122) дає окрему назву, а саме: рівняння <u>рухомої площі</u>, а змінник α звемо <u>керуючим змінником рухомої площі</u>, бо коли

зміна вартости d, зміною вартість сонних рівняння площі. З огляду на те, що напрямні зміщення площі є пропорційні цим сонним, то кожна зміна вартости d викликає відповідно зміну положення рухомої площі.

Щоб визначити прилеглу криву, ми будемо припускати до рівняння родини площ ще однорідне рівняння, утворене прирівнянням нулеві першої похідної через зміщення d ліву частину рівняння родини. Отже рівняння прилеглої кривої містяться в виразі:

$$\left.\begin{aligned} dx + \varphi(d)y + \psi(d) &= z \quad (1) \\ x + \varphi'(d)y + \psi'(d) &= 0 \quad (2) \end{aligned}\right\} \dots\dots (123)$$

Обидва ці рівняння містять зміні x, y і z в першім степені, а тому система (123) виражає <u>просту</u>. Такими типом прилеглої кривої родини площ (зображеної від одного зміщення) буде проста. Ця проста зветься <u>твірною</u> огорнальної поверхні.

Сама ж огорнальна поверхня одержується з тої самої системи (123) виключенням зміщення d, себто огорнальна поверхня містить рівнянням:

$$dx + \varphi(d)y + \psi(d) = z$$

де d є функція x і y визначена з рівняння (2) системи (123)

Ми знаємо, що огорнальна поверхня буде

геометричним осередком усіх прилеглих кривих, а ці прилеглі криві є простолінійні твори, а тому <u>огортальна родина площ залежить від одного змінного є лінійної поверхні.</u>

Щоб лінійна поверхня могла розгортатись, себто могла вимостатись в площу, потрібно щоб всі, дотичні до поверхні, площі, проведені по черзі одна за одною й тої самої твірної зливались в одну, бо тоді при вимощенні кожна твірна прилеглих всіма своїми точками до площі розгортання.

Отже, щоб задана лінійна поверхня, що її досліджуємо, була поверхнею розгортання, треба довести загальну властивість дотичних площ до неї.

Ми знаємо, що кожна з площ дотичних до огортальної якої-будь родини поверхень і проведених через яку-небудь точку прилеглої кривої, є дотичною й до огорненої поверхні, що цій прилеглій кривій відповідає (через цю прилеглу криву проходить). Тому, коли на одній із твірних візьмемо точку й проведемо площу дотичну до огортальної лінійної поверхні, то вона буде дотичною й до відповідної огорненої площі, а це значить буде змінюватися з нею, а разом і відповідного твірного, що лежить на ній.

Отже, кожна з площ даної родини, залеже-

ної від одного змінника α буде дотикатись своєї огинальної лінійної поверхні вздовж твірної відповідної твірної. Тому дана огинальна лінійна поверхня є <u>поверхнею розгортання. Тобто тоді всі дотичні площі до поверхні розгортання утворюють родину площ, залежних від одного якогось змінника α.</u>

Покажемо, що інші поверхні цієї властивості не мають.

Візьмімо систему площ залежних від двох довільних змінників α і β. Рівняння такої родини (рухомої площі) буде:

$$f(\alpha,\beta)x + \varphi(\alpha,\beta)y + \psi(\alpha,\beta) = z \quad \cdots (124)$$

Щоб знайти характеристику досить нам диференціювати 2 попередні рівняння й тоді маємо систему:

$$\left.\begin{aligned} &f(\alpha,\beta)x + \varphi(\alpha,\beta)y + \psi(\alpha,\beta) = z \quad (1)\\ &f'_\alpha(\alpha,\beta)x + \varphi'_\alpha(\alpha,\beta)y + \psi'_\alpha(\alpha,\beta) = 0 \quad (2)\\ &f'_\beta(\alpha,\beta)x + \varphi'_\beta(\alpha,\beta)y + \psi'_\beta(\alpha,\beta) = 0 \quad (3) \end{aligned}\right\} \cdots (125)$$

Коли дамо змінникові β яку очевидну вартість, то рівняння (1) і (2) системи (125) будуть рівняннями системи простих, що відповідають змінникові α. Коли так самі дамо змінникові α яку очевидну сталу вартість, то рівняння (1) і (3) системи (125) будуть рівняннями другої системи простих, залежних

від змін β.

Коли ці проекції обох систем будуть реальні, то ми маємо справу з косою лінійною поверхнею, що має рівняння $\varphi(x,y,z)$ яке одержується з (125) виключенням обох змінників (напр. гіперболічного параболоїда.

Коли ж ці проекції є уявні, то перетин їх дасть реальну точку, а геометричний осередок останніх дасть криволінійну поверхню з рівняння такого як $\varphi(x,y,z)$ (напр. куля), одержаного як і попередньо.

І нарешті коли один із змінників, напр. β, буде функцією другого, напр. (α), то тоді рівняння (2) і (3) системи (125) будуть виразом один другого й рівняння (3) відпаде. Ми прийдемо до однієї системи простолінійних творящих, себто до поверхні розгортання, як огинальної родини площ залежних від одного змінника. Для виконання цього твердження ми доведемо зворотно теорему й покажемо, що кожну довільну поверхню можна розглядати як огинальну родини площ від ∞^1 змінників.

Спричуємо, хай рівняння якої будь довільної поверхні є:

$$z = f(x,y) \quad \ldots \quad (\alpha)$$

Візьмімо на ній точку, що має значення $[\alpha, \beta, f(\alpha,\beta)]$ і поведемо через неї площу дотичну до цієї поверхні. Рівняння такої площі, як

нам відомо, буде:

$$z - f(\alpha,\beta) = p(x-\alpha) + q(y-\beta) \ldots (\beta)$$

Даючи значенням точки α і β різні довільні вартості, ми одержимо цілу систему дотичних площ і ці площі складуть родину, що визначається рівнянням (β). Це рівняння показує, що загалом площі дотичні до якої будь поверхні складають родину площ, залежну від 2^x довільних змінних. Дана поверхня буде доторкальною всіх площ даної системи, а тому буде їх огорткальною.

Хай рівняння (α) буде рівнянням якої лінійної поверхні. Візьмімо якусь точку поверхні, що лежить на творячій одній системи й буде перехрестям з творячою із другої системи. Дотична площа поведена до поверхні через цю точку буде дотичною й до тій площі з родини, що відповідає певним вартостям змінних α_0 і β_0, які визначатимуть і прилеглу точку, як перехрестя даних творячих. Очевидно, що ця дотична площа зіллється зі згаданою площею з родини.

Коли ж ми візьмемо другу точку на тій же творячій першої системи, то й відповідатиме вже інша творяча з другої системи (що відповідає якійсь вартості змінної β_1). А тому відповідна дотична площа до поверхні зіллється вже з другою площею родини, що відповідатиме новій змінній, а саме α_0 і β_1 і т. д.

Отже ці міркування показують, що для косої лінійної поверхні дотичні площі в кожній точці площі одної й тої ж твірної є різні.

Можемо також сказати, що <u>обласного того, що дана поверхня буде поверхнею розгортання є те, що дотичні до цієї поверхні творять родину площ залежних від одного змінного.</u>

Коли б до системи (123) додати ще й рівняння створене прирівнянням до нуля другої похідної через змінне від лівої частини рівняння самої родини, то матимемо систему:

$$\left.\begin{aligned} \alpha x + \varphi(\alpha) y + \psi(\alpha) &= z \\ x + \varphi''(\alpha) y + \psi'(\alpha) &= 0 \\ \varphi''(\alpha) y + \psi''(\alpha) &= 0 \end{aligned}\right\} \cdots\cdots (126)$$

що визначає, як уже нам відомо, руб повороту. З цієї системи можемо виключити змінні x, y і z через α й ми одержимо рівняння руба повороту в такому вигляді:

$$x = f(\alpha) \; ; \quad y = f_1(\alpha) \; \text{і} \; z = f_2(\alpha)$$

Як було доведено, руб повороту має властивість, що дотичні до нього в кожній точці є спільні з дотичними до прилеглих кривих які через цю точку переходять. Але в даному разі ці прилеглі криві є простолінійними твірними, а тому:

<u>Всі твірні поверхні розгортання є дотичними до руба повороту її</u>, себто <u>поверхня</u>

розгортання є геометричний осередок всіх дотичних до ребра повороту.

§73. Основна властивість поверхонь розгортання.

Площі родини — однопараметричної множини кривих ребра повороту їм огортальної поверхні (розгортання).

Для доведення цієї теореми припустимо, що коли через деяку точку на кривій повести площу кривих й сівпрямлюючу, то остання буде прямою до першої. Ми знаємо, що ребро повороту є геометричним осередком прикметних точок, що лежать на площах родини. Тангенс кривої через кожну точку ребра повороту неодмінно переходить якраз із площі родини. Коли ж в кожній із таких точок ми збудуємо відповідно сівпрямлюючу до ребра повороту й зуміємо довести, що вона є прямою до певної площі родини, що через цю точку переходить, то наша теорема буде доведена

Ми одержали рівняння ребра повороту:

$$x = f(\alpha) \; ; \quad y = f_1(\alpha) \quad i \quad z = f_2(\alpha) \; \cdots \cdots (1)$$

за допомогою системи рівнянь (126):

$$\left.\begin{aligned} dx + \varphi y + \psi &= z \\ x + \varphi' y + \psi' &= 0 \\ \varphi'' y + \psi'' &= 0 \end{aligned}\right\} \cdots (2)$$

де φ і ψ скорочене означення $\varphi(\alpha)$ і $\psi(\alpha)$. Кожній новій вартості α відповідає на ребрі повороту певна точка, що має знаходження $(f(\alpha), f_1(\alpha), f_2(\alpha))$

а в той час цій точці відповідає й певна площа родини, що переходить через неї й визначається рівнянням $\alpha x + \varphi y + \psi = z$, де α має ту саму дану окрему вартість що й точка.

Як знаємо рівняння спінорядової до рубу в даній точці при даній вартості α, матиме вигляд:

$$\frac{x - f(\alpha)}{f_1' f_2'' - f_2' f_1''} = \frac{y - f_1(\alpha)}{f_2' f'' - f' f_2''} = \frac{z - f_2(\alpha)}{f' f_1'' - f_1' f''} \quad \cdots (3)$$

Коли вона є прямою до відповідної площі родини: $\alpha x + \varphi y + \psi = z$, що через цю точку переходить, то має задовольнятися умова прямовості, а саме пропорційність коефіцієнтів рівняння площі й кутових коефіцієнтів спінорядової, себто:

$$\alpha : \varphi : -1 = (f_1' f_2'' - f_2' f_1'') : (f_2' f'' - f' f_2'') : (f' f_1'' - f_1' f'') \quad \cdots (4)$$

Щоб довести це, зладимо що f, f_1, f_2 одержані через вставлення x, y, z з рівняння (2); тому, коли ці вартості f вставити в похідні рівняння системи (2), то одержимо тотожності:

$$\left.\begin{aligned} \alpha f + \varphi f_1 + \psi &= f_2 \quad (1) \\ f' + \varphi' f_1 + \psi' &= 0 \quad (2) \\ \varphi'' f_1 + \psi'' &= 0 \quad (3) \end{aligned}\right\} \cdots (5)$$

для даної вартості α. Коли ж ми будемо брати довільну точку на рубі повороту, то вартість α буде змінного й тому рівняння (5) дають нам функціональну залежність між коефіцієнтами рівняння площі тому і вартостями значників тої точки на рубі. Продиференціювавши рівняння (1)

системи (5) через α, тоді матимемо:

$$\alpha f' + \varphi f_1' - f_2' + \underline{f + \varphi' f_1 + \psi'} = 0 \quad .$$

Але сума членів ——— зліва рівняння (2) є рівна нулеві, а тому:

$$\alpha f' + \varphi f_1' - f_2' = 0 \quad \ldots\ldots (6)$$

Диференціюючи тотожне рівняння (2) тієї ж системи (5) маємо:

$$f' + \varphi' f_1' + \underline{\varphi'' f_1 + \psi''} = 0$$

Знова зліва рівняння (3) маємо:

$$f' + \varphi' f_1' = 0 \quad \ldots\ldots (7)$$

і нарешті, диференціюючи, одержимо члени рівняння (6), маємо:

$$\alpha f'' + \varphi f_1'' - f_2'' + \underline{f' + \varphi' f_1'} = 0$$

Але зліва рівняння (7) маємо:

$$\alpha f'' + \varphi f_1'' - f_2'' = 0 \quad \ldots\ldots (8)$$

Тепер ми розв'язуємо рівняння (3) і (8) яко систему щодо α і $\varphi(x)$. Для цього:

1) 1-ше й 2-ге рівняння системи:

$$\left.\begin{aligned} \alpha f' + \varphi f_1' - f_2' &= 0 \\ \alpha f'' + \varphi f_1'' - f_2'' &= 0 \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots (9)$$

множимо: перше на f_1'', а друге на f' і віднімаємо перше з другого, тоді маємо:

$$\alpha (f_1' f'' - f' f_1'') = f_1' f_2'' - f_2' f_1''$$

або:

$$\alpha = \frac{f_1' f_2'' - f_2' f_1''}{f_1' f'' - f' f_1''}$$

2) Множачи 1-ше рівняння на f_1'' а 2-ге на f' і віднімаючи 2-ге рівняння з 1-го маємо з виключного рівняння вартість:

$$\varphi_{(x)} = \frac{f_2' f'' - f' f_2''}{f_1' f'' - f' f_1''}$$

Сполучимо нас третьою змінною z рівняння: $\alpha x + \varphi y + \psi = z$ площі родини, як видно з самого рівняння є: -1. Слід. даючи відношення цих сполучників, маємо:

$$\alpha : \varphi : (-1) = \frac{f_1' f_2'' - f_2' f_1''}{f_1' f'' - f' f_1''} : \frac{f_2' f'' - f' f_2''}{f_1' f'' - f' f_1''} : (-1)$$

або:

$$\alpha : \varphi : (-1) = (f_1' f_2'' - f_2' f_1'') : (f_2' f'' - f' f_2'') : (f' f_1'' - f_1' f'')$$

Що й є умовою (4). Маємо умову теорема є доведеного.

Приклад 1. Дано родину площ, рівнобіжних до даної простої. Знайти їх огортаючу.

Хай дана проста є вісь z-ів (рис. 141) Тоді рівняння будь-якої площі рівнобіжної до вісі z-ів маємо [див (122)]:

$$\alpha x + \varphi(x) y + \chi(x) = 0 \quad \cdots (\alpha)$$

Диференціюємо рівняння виразу $f_x' = 0$ буде:

$$x + \varphi'(x) y + \psi'(x) = 0 \quad \cdots (\beta)$$




Рис. 141

Рівняння (α) і (β) виражають просту (бо рівняння 1-го ступеня) й притому рівнобіжну до осі z-ів, бо обидва рівняння не містять змінної z. Отже творці огортаючої поверхні є рівнобіжні до осі z-ів

Маємо циліндричну поверхню з напрямною (a) і (β) змінним (d) або одержимо рівняння виглядом $f(x,y)=0$, що є рівнянням напрямного контуру, а разом і рівнянням самої циліндричної поверхні.

§73. Родина кривих.

Хай нам дано дві родини поверхонь:

$$\left.\begin{aligned} f(x,y,z,\alpha)&=0\\ \varphi(x,y,z,\alpha)&=0\end{aligned}\right\}\quad\ldots(1)$$

залежних від спільного змінника α. Коли ми рівняння цих родин розглядатимемо як систему, то кожній окремій величині $\alpha=\alpha_0$ буде відповідати дві поверхні, одна з першої родини, а друга з другої. Перетин цих поверхонь дасть нам певну криву, положення якої також залежатиме від даної величини $\alpha=\alpha_0$. Справді, даючи змінному α нову величину $\alpha=\alpha_1$, ми одержимо нову пару поверхонь і нову криву перетину їх. Нарешті, даючи α всі можливі величини ми одержимо ціллий зв'язаний виглядом кривих, положення яких залежить від зміни величини α. <u>Отже система рівнянь (1) виражає родину кривих, залежну від даного змінника α.</u> Коли з системи (1) виключимо цього змінника α, то одержимо якусь поверхню $F(x,y,z)=0$, що є геометричним осередком всіх кривих розглядуваної родини. Такі поверхні звуться <u>творячими поверхнями.</u>

Уявімо це:

Хай нам дано родину кривих від n змінних, себто:

$$\left.\begin{aligned} f(x, y, z, a_1, a_2, a_3 \dots a_n) &= 0 \\ \varphi(x, y, z, a_1, a_2, a_3 \dots a_n) &= 0 \end{aligned}\right\} \dots (3)$$

Очевидно, щоб задача була означеною, нам треба мати між цими змінними ще $n-1$ залежність вигляду:

$$\psi_1(a_1, a_2, a_3 \dots a_n) = 0,\ \psi_2(a_1, a_2, a_3 \dots a_n) = 0 \dots \psi_{n-1}(a_1, a_2, a_3 \dots a_n) = 0 \dots (4)$$

Коли сполучити рівняння (3) і (4) в систему, то матимемо $n+1$ рівняння, що дадуть можливість вилучити n змінних $a_1, a_2 \dots a_n$ і одержати рівняння $\Phi(x, y, z) = 0$ шуканої поверхні. Рівняння (4) очевидно є довільно-заданими умовами, що установлюють залежність між даними змінними. Отже зміна цих умов для одних і тих же рівнянь (3) родини кривих дасть все нові й нові шукані поверхні. Тому рівняння (4) називають напрямними.

Уявімо тепер геометрично, що вимагатимуть з себе ці напрямні рівняння коли зокрема. Візьмім $n-1$ яких будь поперед заданих кривих у просторі й поставимо собі умовою, щоб кожна з кривих родини (3) перетинала ці $n-1$ задану криву.

Візьмім одну з цих кривих L_k і хай вона вимагається рівняннями:

$$\left.\begin{aligned} F_k(x, y, z) &= 0 \\ \text{і}\quad f_k(x, y, z) &= 0 \end{aligned}\right\} \dots (5)$$

Щоб одержати точку перетину кривих родини (3) з кривою (5) ми лишень розв'язати їх рівняння як систему. Ці рівняння (3) і (5) дають нам можливість виключити змінні x, y і z і ми одержимо рівність:

$$\psi_k(d_1, d_2, d_3 \ldots d_n) = 0 \quad \ldots \quad (6)$$

Отже навпаки, існування залежності між змінними (6) є очевидною або умовою того, що криві цієї родини (3) перетинатимуть криву L_k. Очевидно, що коли ми зафіксуємо $n-1$ кривих $L_1, L_2 \ldots L_k \ldots L_{n-1}$, що їх перетинають криві цієї родини, то існуватиме й $n-1$ умова виду (6). Всі ці умови складуть шукану залежність між змінними заданими рівняннями (4). Ці $(n-1)$ наперед заданих кривих $L_1 L_2 \ldots L_{n-1}$ звуться напрямними кривими або напрямними контурами.

Таким чином, коли ми маємо родину кривих (3) залежну від довільних змінних, то задавши собі $n-1$ напрямну криву, ми одержимо $n-1$ умову (4) перетину кривих з цими напрямними кривими, а виключення з рівнянь (3) $(n-1)$-ої умови (4) і змінних, нам дасть рівняння творної поверхні

§74. Лінійні поверхні.

Перейдім тепер до розгляду лінійних поверхонь. Нехай для цього нам дано всі можливі прямі простору визначені рівняннями:

$$\left.\begin{aligned} x &= mz + n \\ y &= qz + r \end{aligned}\right\} \ldots (\alpha)$$

де m, n, q і r – довільно задані величини, що характеризують ці прямі, яко родину.

На підставі попереднього § ми можемо одержання цільової виконаної творящої поверхні, коли введемо в розгляд з залежності між заданими m, n, q і r. Тому запишемо собі також при напрямній кривій, що умови перетину родини даних прямих з нею будуть:

$$\left.\begin{aligned} \varphi_1(m, n, q, r) &= 0 \\ \varphi_2(m, n, q, r) &= 0 \\ \varphi_3(m, n, q, r) &= 0 \end{aligned}\right\} \ldots (\beta)$$

Із рівнянь (α) і (β) виключимо залежність m, n, q і r і тоді матимемо якусь творящу поверхню $\Phi(x, y, z) = 0$. Ця творяча поверхня буде геометричним осередком простих родини (α), а тому буде <u>лінійною.</u>

<u>Приклад 1.</u> Знайдемо творящу поверхню рівнобіжних між собою просторових простих, напрямна крива яких лежить в координатній площині xOy і виписується рівнянням

$$f(x, y) = 0 \; ; \quad z = 0 \ldots (\alpha)$$

Очевидно, що рівняння родини матимуть вигляд:

$$\left.\begin{aligned} x &= mz + \alpha \\ y &= nz + \beta \end{aligned}\right\} \ldots (\delta)$$

де $m = \text{const}$ і $n = \text{const}$, α і β є довільні змінні. Виключаючи з рівнянь (а) і (б) змінні x, y, z, а саме:

1) вставляючи $z = 0$ в рівняння (б) і маємо $x = \alpha$; $y = \beta$;

2) знайдені вартості x і y вставляючи в перше рівняння (а) й одержуємо:

$$f(\alpha, \beta) = 0 \quad \cdots \quad (c)$$

Це є умова перетину простої прямої з напрямною кривою.

Коли тепер виключимо α і β з рівнянь прямих (б) і умови (с), то одержимо рівняння творної поверхні, а саме:

$$f(x - mz, y - nz) = 0$$

Це є відоме з аналітичної геометрії рівняння циліндричної поверхні з напрямною контурою на координатній площі xOy (див. рів. (74) §35 курсу аналіт. геометрії в просторі).

Приклад 2. Знайти творну поверхню, утворену рухомою простою, що переходить через закладену точку $M(a, b, c)$ і перетинається з даною напрямною кривою:

$$F(x, y, z) = 0 \quad \cdots \quad (1)$$

Рівняння такої прямої будуть:

$$\left.\begin{aligned} x - a &= \alpha(z - c) \\ y - b &= \beta(z - c) \end{aligned}\right\} \quad \cdots \quad (2)$$

себто пряма проста залежить від двох

змінних α і β.

Коли з рівнянь (1) і (2) виключимо змінні x, y, z то одержимо умову:

$$\varphi(\alpha, \beta) = 0 \quad \cdots \quad (3)$$

(Очевидно, що це є умова перетину кривими родини даної напрямної). Виразивши з рівнянь (2) змінних α і β, а саме:

$$\alpha = \frac{x-a}{z-c} \quad ; \quad \beta = \frac{y-b}{z-c}$$

і вставляючи ці вартості в рівняння (3) одержимо рівняння творної поверхні, а саме:

$$\varphi\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$$

Це є відоме рівняння конічної поверхні. (Аналітична геом. в просторі §§ 36,37)

§75. Оборотові поверхні.

Візьмімо осі координат xyz і на площі xz якусь криву рівняння: $\varphi(x,z)$; $y=0 \cdots (a)$ і будемо її обертати навколо осі z, то ми одержимо певну оборотову поверхню. Всі перерізи цієї поверхні площинами, що переходять через вісь оборотового тіла (вісь z-ів) носять назву полудеників або меридіянів тіла, а перерізи прямові до осі (що є кругами) мають назву рівнобіжників (широта оборотового тіла).

Очевидно, що згадану оборотову поверхню можна розглядати, як творну родини кругів, що мають свої центри на осі тіла (осі z-ів) і переходять через відповідні точки даної

кривої (a), дає циліндр.

Коли ми за вісь циліндра візьмемо вісь z-ів, то коло нашої цілі буде родити циліндр рівнобічний до координатної площі xoy. Тому рівняння, родячи циліндр матиме вигляд:

$$x^2 + y^2 = r^2; \quad z = d \quad \cdots (\delta)$$

Виключивши з рівнянь (a) і (δ) змінні x, y і z ми одержимо умову перетину кола, родячи з циліндра кривою (a), а саме:

1) З рівняння (a) маємо $y = 0$

2) З першого рівняння системи (δ) вставивши вартості $y = 0$, одержимо $x = \pm r$ і нарешті

3) $z = d$

Вставляючи ці вартості в перше рівняння системи (a), маємо:

$$\varphi(r, d) = 0 \quad \cdots (\beta)$$

Коли ми тепер з рівнянь (δ) і (β) виключимо змінні r і d, ми одержимо рівняння шуканої поверхні:

$$\varphi\left(z, \sqrt{x^2+y^2}\right) = 0 \quad \cdots \quad (127)$$

Це й є загальний вигляд обертової поверхні. Тому можна дати ще менший вигляд, а саме:

$$\left.\begin{aligned} f(x^2+y^2,\ z) &= 0 \\ z &= \psi(x^2+y^2) \end{aligned}\right\} \quad \cdots \quad (128)$$

або:

§76. Дотикальна, випростальна й бінормальна поверхні просторової кривої.

Ми маємо, що дотична, головна пряма й

співпрямлювальна, повсюдно до кривої в даній точці M спрямована головний трисекційний кут.

Припустимо, що рівняння кривої буде:

$$x = f(s);\ y = \varphi(s)\ \text{і}\ z = \psi(s)$$

і візьмемо за початок осей точку M, для якої $s=0$. Тоді:

1) беручи $z=0$ ми одержимо площу кривини

2) беручи $y=0$ " " випрямляючу площу

і 3) беручи $x=0$ " " нормальну площу




Рис. 142

Очевидно, що і взаємний тригранник даної кривої ми завжди зможемо збудувати головний трисекційний кут, а разом з ним і три основні площі. Всі ці площі будуть відрізнятися від однойменних другого трисекційного кута вартістю знаменника s, а тому ми для даної кривої одержимо три родини площ, залежних від одного змінника s. Ми вже довели, що огинаючі такого роду родини площ є поверненими розгортання. Так:

1) Огинаюча родина площ кривини, що зверсія доторкального повернутого кривої буде геометричним осередком дотичних до даної кривої (а отже крива є рубом повороту цієї поверхні)

2) Огинаюча родина нормальних площ являється бінормаллю повернутого кривої і

3) Огинаюча родина випрямляючих площ

звемо <u>виростаючого поверхнею</u> кривої.

I. Ми вже познайомились з дотичною поверхнею в §72,73, а тому перейдемо до розгляду нормальної, себто бінормальної поверхні кривої.

Рівняння прямої нормалі (69) буде:

$$x'(X-x) + y'(Y-y) + z'(Z-z) = 0 \quad \text{або:}$$

$$\frac{dx}{ds}(X-x) + \frac{dy}{ds}(Y-y) + \frac{dz}{ds}(Z-z) = 0$$

А звідси:

$$\lambda(X-x) + \mu(Y-y) + \nu(Z-z) = 0 \quad \cdots \quad (\alpha)$$

Щоб знайти огинаючу поверхню як за §72 (взір 123) складаємо допоміжне рівняння, диференціюючи дане рівняння (α) через змінну s. Маємо послідовно:

$$\frac{d\lambda}{ds}(X-x) - \lambda\frac{dx}{ds} + \frac{d\mu}{ds}(Y-y) - \mu^2 + \frac{d\nu}{ds}(Z-z) - \nu^2 = 0$$

або:

$$\frac{d\lambda}{ds}(X-x) + \frac{d\mu}{ds}(Y-y) + \frac{d\nu}{ds}(Z-z) = \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$$

Скористувавшись 1-ми типом взорів Френе [554(93)], а саме:

$$\frac{d\lambda}{ds} = \frac{\lambda_n}{\rho}\ ;\quad \frac{d\mu}{ds} = \frac{\mu_n}{\rho}\ ;\quad \frac{d\nu}{ds} = \frac{\nu_n}{\rho}$$

ми зможемо кожну рівняння дати ще другий вигляд:

$$\frac{1}{\rho}\left[\lambda_n(X-x) + \mu_n(Y-y) + \nu_n(Z-z) = 1.\right.$$

або:

$$\lambda_n(X-x) + \mu_n(Y-y) + \nu_n(Z-z) = \rho \quad \cdots \quad (\beta)$$

Ми знаємо, що рівняння (α) і (β), що системи, визначають твірну (прилеглу пряму) огинаючої поверхні. Ця твірна має назву бінормальної.

Щоб визначити її положення ми розглянемо рівняння (β). Це рівняння визначає нашу рівнобіжну до вихідної. Бо справді: рівняння вихідної площі (86) буде:

$$\frac{d^2x}{ds^2}(X-x) + \frac{d^2y}{ds^2}(Y-y) + \frac{d^2z}{ds^2}(Z-z) = 0$$

але беручи під увагу що $\frac{dx}{ds} = \lambda$; $\frac{dy}{ds} = \mu$ і $\frac{dz}{ds} = \nu$ та взявши сюди натомість:

$$\frac{d^2x}{ds^2} = \frac{d\lambda}{ds} = \frac{\lambda_n}{\rho}\ ;\ \frac{d^2y}{ds^2} = \frac{\mu_n}{\rho}\ ;\ \frac{d^2z}{ds^2} = \frac{\nu_n}{\rho}$$

А тому рівняння вихідної площі можна дати таким виглядом:

$$\lambda_n(X-x) + \mu_n(Y-y) + \nu_n(Z-z) = 0 \quad \cdots \quad (\gamma)$$

Отже, одержане рівняння вихідної площі відрізняється від рівняння площі (β) на величину ρ, тому ці площі є рівнобіжні. Через те й бінормаль проста що є перетином площ (α)і(β) буде рівнобіжна до перетину площ (α) і (γ), себто площ прямової й вихідної. Звідси маємо <u>бінормаль проста є рівнобіжною до спів-прямової.</u>

Очевидно, що вона не дотикає кривої, а лише перетинає її головну прямову. На рис. 143 бінормаля є проста PK.




Рис 143

Візьмімо тепер точки центру кривини кривої:

$$a = x + \lambda_n\rho\ ;\ b = y + \mu_n\rho\ ;\ c = z + \nu_n\rho \quad \cdots (\delta)$$

і вставимо їх в рівняння (α)і(β)

1/ Очевидно, що рівняння прямової площі дістанемо задовольн

нормаль вартостями (δ) бо центр кривини належить на головній нормалі, а тому й на дотичній площині [Маючи і безпосередньо вставивши ці вартостей у рівняння (α) дасть тотожний вислід, а саме: $\rho(\lambda\lambda_n + \mu\mu_n + \nu\nu_n) = 0$] Вставивши вартостей (δ) в рівняння (β) дає вислідну:

$$\rho(\lambda_n^2 + \mu_n^2 + \nu_n^2) = \rho \text{ ; себто } \rho = \rho$$

Отже ці вислідну свідчить, що бінормальна проекція зливається з відповідного місця кривини. А тому бінормальна поверхня є геометричним осередком осей кривини даної кривої.

Висновок. З самого визначення поверхні, очевидно, що бінормальна поверхня не лежить в соприкасальній кривій. Звідси ще, що випуклість злітника з з рівнянь (α) і (β) чи одержимо рівняння самої бінормальної поверхні.

II. Розглянемо, нарешті, рівняння випрямляльної поверхні.

Вона, як ми визначили є огортковою родини випрямляльних площ. Тому беремо рівняння цієї площі себто рівняння (γ) й складаємо для полового рівняння: диференціюємо (γ) через s і користуючись взорами Френе. А саме:

$$\frac{d\lambda_n}{ds}(X-x) - \lambda_n\frac{dx}{ds} + \frac{d\mu_n}{ds}(Y-y) - \mu_n\frac{dy}{ds} + \frac{d\nu_n}{ds}(Z-z) - \nu_n\frac{dz}{ds} = 0$$

або:

$$\frac{d\lambda_n}{ds}(X-x) + \frac{d\mu_n}{ds}(Y-y) + \frac{d\nu_n}{ds}(Z-z) = \lambda_n\lambda + \mu_n\mu + \nu_n\nu = 0$$

А за 3-ою множою взорів Френе (96), маємо:

$$-\left(\frac{\lambda}{\rho}+\frac{\lambda_2}{r}\right)(X-x)-\left(\frac{\mu}{\rho}+\frac{\mu_2}{r}\right)(Y-y)-\left(\frac{\nu}{\rho}+\frac{\nu_2}{r}\right)(Z-z)=0\text{, або:}$$

$$\frac{1}{\rho}\left[\lambda(X-x)+\mu(Y-y)+\nu(Z-z)\right]+\frac{1}{r}\left[\lambda_2(X-x)+\mu_2(Y-y)+\nu_2(Z-z)\right]=0\ldots(\xi)$$

Беручи рівняння (γ) і (ξ) як систему, ми знаходимо рівняння твірної вигнутої поверхні.

Щоб виключити положення цієї твірної, розглянемо рівняння (ξ). Його можна дати вигляд:

$$\overbrace{\left[\lambda(X-x)+\mu(Y-y)+\nu(Z-z)\right]}^{(1)}-\kappa\overbrace{\left[\lambda_2(X-x)+\mu_2(Y-y)+\nu_2(Z-z)\right]}^{(2)}=0$$

де $\kappa=-\frac{\rho}{r}$. Вираз (1) є рівнянням прямої, а вираз (2) – є рівнянням прямої, що співпрямлює. Тому рівняння (ξ) при змінних x, y, z є рівнянням площини, що проходить через головну пряму і перетинає площину (1) і (2). Для даної ж точки, коли ρ і r мають певні величини, це рівняння одної з цих площин (рис. 144). Система же рівнянь (γ) і (ξ) виражає просту MK, перетину площі P з вигнутої площею BT. Очевидно, що твірна MK переходить через точку M кривої, а тому й огинальна поверхня утворена цією твірною матиме на собі всі точки кривої. Іншими словами дана крива лежить на вигнутій поверхні. Очевидно також, що твірна (напр. MK) вигнутої поверхні є пряма-




Рис. 144

ми до відповідних головних нормалей кривої. Разом з цими, випрямними площі, дотичні до випрямної поверхні, ці площі даної родини будуть тепер завжди прямовими до головної нормалі. А тому головні прямові кривої є одночасно прямовими лінії випрямної поверхні.

Такі криві, що лежать на даній поверхні і мають за свої головні прямові, прямові самої поверхні звуться геодезичними. Тому кожна крива є геодезичною для своєї випрямної поверхні.

Розгорнемо нашу випрямну поверхню на площі, тоді її прямові стануть між собою рівнобіжні, а разом з цим будуть рівнобіжні й головні прямові даної кривої, себто крива випрямиться у пряму. Тому ці розгорнені площа й поверхня мають назву випрямних.

§77. Еволюта просторової кривої.

Еволютою даної будь кривої будемо звати таку криву, що її дотичні є прямовими до даної кривої.

Хай дана крива L (рис. 145) має одну з прямових MN_1 в точці $M(x,y,z)$ і хай еволюта її L' дотикається цієї прямової MN_1 в точці $\Theta(X,Y,Z)$. Означимо відтинок ΘM через ν




Рис. 145

тоді очевидно, що мають на осі координат будуть:

$X - x = \text{пр}_{(u,X)} = \text{пр}\varphi$; $Y - y = \text{пр}_{(u,Y)} = \text{пр}\psi$; $Z - z = \text{пр}_{(u,Z)} = \text{пр}\chi$ . . . (а)

Обчислимо залежності cos кутів даної прямової з осями й для цього, взявши за осі координат MT, MN і MB. Скористуємося відомим з аналіт. геометрії взором: $\cos\varphi = \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1 + \gamma\gamma_1$, де α, β і γ – cos. кутів одного з рамен даного кута з координатними осями, а $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ – cos. кутів другого рамена з тими ж осями. Очевидно, що:

а) косинуси осі X-ів з новими осями будуть:

1) з дотичної MT ——— λ

2) з головної прямової MN – λ_n

і 3) з співпрямової MB – ——— λ_β

б) косинуси ос прямової MN_1 з тими ж осями будуть:

1) з дотичної MT – 0 (бо MN_1 лежить в площині NMB прямовій до MT)

2) з головної прямової MN – $\cos\tau$ (де через τ означимо кут між даною прямовою до кривої й її головною прямовою)

і 3) із співпрямової MB – $\sin\tau$ ($\text{бо } \angle N_1MB = \frac{\pi}{2} - \tau$)

Отже косинуси φ, ψ і χ кутів прямової з дотичними осями координат x, y, z будуть:

$$\left.\begin{aligned} &1)\ \cos\varphi = \lambda_n\cos\tau + \lambda_\beta\sin\tau \\ &\text{й аналогічно:} \\ &2)\ \cos\psi = \mu_n\cos\tau + \mu_\beta\sin\tau \\ &\text{і}\quad 3)\ \cos\chi = \nu_n\cos\tau + \nu_\beta\sin\tau \end{aligned}\right\} \quad \ldots (б)$$

Тепер умови рівності (a) матимуть вигляд:

$$X = x + u\lambda_n \cos\tau + u\lambda_\varepsilon \sin\tau$$
$$Y = y + u\mu_n \cos\tau + u\mu_\varepsilon \sin\tau$$
$$Z = z + u\nu_n \cos\tau + u\nu_\varepsilon \sin\tau$$

Спустимо тепер з точки Q пряму на MN і MB й одержимо дві відтинки u прямової: 1) $p = u\cos\tau$ – на головну прямову і 2) $q = u\sin\tau$ – на співпрямову. Тоді попередні рівняння перетворяться в:

$$\left.\begin{aligned} X &= x + p\lambda_n + q\lambda_\varepsilon \\ Y &= y + p\mu_n + q\mu_\varepsilon \\ Z &= z + p\nu_n + q\nu_\varepsilon \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots (b)$$

Це є знелінійні точки евольюти, а полудрівняння (b) можемо бути й рівняннями самої евольюти, коли б ми вилучили вартості p і q так, щоб вони задовольняли тій умові, що прямові даної кривої є дотичними до шуканої кривої (B).

Продиференціюємо через s рівняння (b) й матимемо:

$$\frac{dX}{ds} = \frac{d\lambda}{ds} + p\frac{d\lambda_n}{ds} + \lambda_n\frac{dp}{ds} + q\frac{d\lambda_\varepsilon}{ds} + \lambda_\varepsilon\frac{dq}{ds}$$

$$\frac{dY}{ds} = \mu + p\frac{d\mu_n}{ds} + \mu_n\frac{dp}{ds} + q\frac{d\mu_\varepsilon}{ds} + \mu_\varepsilon\frac{dq}{ds}$$

$$\frac{dZ}{ds} = \nu + p\frac{d\nu_n}{ds} + \nu_n\frac{dp}{ds} + q\frac{d\nu_\varepsilon}{ds} + \nu_\varepsilon\frac{dq}{ds}$$

Але самі вартості $\frac{d\lambda_n}{ds}$, $\frac{d\mu_n}{ds}$ і $\frac{d\nu_n}{ds}$; $\frac{d\lambda_\varepsilon}{ds}$, $\frac{d\mu_\varepsilon}{ds}$ і $\frac{d\nu_\varepsilon}{ds}$ за допомогою $3^{ої}$ пари (96) і $2^{ої}$ пари (95) взорів Френе, матимемо:

$$\frac{d\lambda}{ds} = \lambda - \frac{p\lambda}{\rho} - \frac{r\lambda_\theta}{r} + \lambda_n \frac{dp}{ds} + \frac{q\lambda_n}{r} + \lambda_\theta \frac{dq}{ds}$$

$$\frac{d\mu}{ds} = \mu - \frac{p\mu}{\rho} - \frac{r\mu_\theta}{r} + \mu_n \frac{dp}{ds} + \frac{q\mu_n}{r} + \mu_\theta \frac{dq}{ds}$$

$$\frac{d\nu}{ds} = \nu - \frac{p\nu}{\rho} - \frac{r\nu_\theta}{r} + \nu_n \frac{dp}{ds} + \frac{q\nu_n}{r} + \nu_\theta \frac{dq}{ds}$$

А звідси:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dx}{ds} &= \lambda\left(1-\frac{r}{\rho}\right) + \lambda_n\left(\frac{dp}{ds} + \frac{q}{r}\right) + \lambda_\theta\left(\frac{dq}{ds} - \frac{r}{r_\theta}\right) \\ \frac{dy}{ds} &= \mu\left(1-\frac{r}{\rho}\right) + \mu_n\left(\frac{dp}{ds} + \frac{q}{r}\right) + \mu_\theta\left(\frac{dq}{ds} - \frac{r}{r_\theta}\right) \\ \frac{dz}{ds} &= \nu\left(1-\frac{r}{\rho}\right) + \nu_n\left(\frac{dp}{ds} + \frac{q}{r}\right) + \nu_\theta\left(\frac{dq}{ds} - \frac{r}{r_\theta}\right) \end{aligned}\right\} \cdots (2)$$

Величини $\frac{dx}{ds}$, $\frac{dy}{ds}$ і $\frac{dz}{ds}$ як нам відомо (§48 вип67) є кутові зміщення дотичної до рухомої евольвенти. І тому $Q(x, y, z)$. Але після визначення евольвенти, як дотичної є прямовою MN, що через точку Q переходить, а тому дані кутові зміщення мусять бути пропорційні напрямним зміщенням заданої прямової MN_1, а саме:

$$\frac{dx}{ds} = m\cos\varphi\,; \quad \frac{dy}{ds} = m\cos\psi\,; \quad \frac{dz}{ds} = m\cos\chi.$$

де m є сталим пропорційності. Беруги $m = k.u$ за взором (6) маємо:

$$\frac{dx}{ds} = ku\cos\varphi = k(u\lambda_n\cos\tau + u\lambda_\theta\sin\tau) = k(p\lambda_n + q\lambda_\theta)$$

і аналогічно:

$$\frac{dy}{ds} = k(p\mu_n + q\mu_\theta)$$

$$\text{і} \quad \frac{dz}{ds} = k(p\nu_n + q\nu_\theta)$$

Таким чином з рівностей (2) маємо:

$$\lambda\left(1-\frac{k}{\rho}\right)+\lambda_n\left(\frac{dp}{ds}+\frac{q}{r}\right)+\lambda_\theta\left(\frac{dq}{ds}-\frac{p}{r}\right)=\kappa\left(\lambda_n p+\lambda_\theta q\right)$$

$$\mu\left(1-\frac{k}{\rho}\right)+\mu_n\left(\frac{dp}{ds}+\frac{q}{r}\right)+\mu_\theta\left(\frac{dp}{ds}-\frac{p}{r}\right)=\kappa\left(\mu_n p+\mu_\theta q\right)$$

$$\text{i}\quad \nu\left(1-\frac{k}{\rho}\right)+\nu_n\left(\frac{dp}{ds}+\frac{q}{r}\right)+\nu_\theta\left(\frac{dp}{ds}-\frac{p}{r}\right)=\kappa\left(\nu_n p+\nu_\theta q\right)$$

Очевидно, що ці рівності можливі:

1) коли в лівій частині їх співпадає при λ, μ і ν є нулі, себто:

$$1-\frac{k}{\rho}=0 \qquad \text{а звідси:} \quad k=\rho$$

2) коли:

$$\frac{dp}{ds}+\frac{q}{r}=\kappa p \quad \text{і} \quad \frac{dq}{ds}-\frac{p}{r}=\kappa q$$

Себто коли:

$$\frac{\frac{dp}{ds}+\frac{q}{r}}{p}=\frac{\frac{dq}{ds}-\frac{p}{r}}{q}$$

Звідси:

$$\frac{1}{p}\cdot\frac{dp}{ds}-\frac{1}{q}\frac{dq}{ds}+\frac{1}{r}\left(\frac{q}{p}+\frac{p}{q}\right)=0$$

Ми знаємо, що $p=n\cos\tau$, а $q=n\sin\tau$, а тому $\frac{q}{p}=\operatorname{tg}\tau$. Отже беручи під увагу, що $\frac{d}{ds}(\lg p)=\frac{1}{p}\frac{dp}{ds}$ і $\frac{d}{ds}(\lg q)=\frac{1}{q}\frac{dq}{ds}$, а тому:

$$\frac{1}{p}\cdot\frac{dp}{ds}-\frac{1}{q}\frac{dq}{ds}=\frac{d(\lg p)}{ds}-\frac{d(\lg q)}{ds}=\frac{d}{ds}\left[\lg p-\lg q\right)=\frac{d}{ds}\left(\lg\frac{p}{q}\right)$$

можемо написати:

$$\frac{d}{ds}\left[\lg\operatorname{ctg}\tau\right]+\frac{1}{r}\left(\operatorname{tg}\tau+\operatorname{ctg}\tau\right)=0$$

А звідси переводячи диференціювання, одержимо:

$$-\operatorname{tg}\tau\cdot\frac{1}{\sin^2\tau}\cdot\frac{d\tau}{ds}+\frac{1}{r}\left(\frac{\sec^2\tau}{\operatorname{tg}\tau}\right)=0 \quad \text{або:}$$

$$-\frac{1}{\sin\tau\cdot\cos\tau}\cdot\frac{d\tau}{ds}+\frac{1}{r}\frac{1}{\sin\tau\cdot\cos\tau}=0$$

Отже:

$$\frac{d\tau}{ds} = \frac{1}{r} \quad \text{або:} \quad d\tau = \frac{ds}{r}$$

Маємо також:

$$\tau = \int \frac{ds}{r} + c \quad \ldots \ldots \quad (3)$$

і нарешті:

$$\varphi = \mu \operatorname{tg} \tau = \rho \operatorname{tg}\left[\int \frac{ds}{r} + c\right]$$

Тому рівняння евольвенти матиме вигляд:

$$\left.\begin{aligned} X &= x + \rho\left[\lambda_n + \lambda_\beta \operatorname{tg}\left(\int \frac{ds}{r} + c\right)\right] \\ Y &= y + \rho\left[\mu_n + \mu_\beta \operatorname{tg}\left(\int \frac{ds}{r} + c\right)\right] \\ Z &= z + \rho\left[\nu_n + \nu_\beta \operatorname{tg}\left(\int \frac{ds}{r} + c\right)\right] \end{aligned}\right\} \quad \ldots \quad (129)$$

Як бачимо рівняння евольвенти залежить від довільного значення, а тому кожна крива має цілу родину евольвент.

Вставляючи ці вартості (129) в рівняння (α) і (β) §76 ми переконуємося, що рівняння бінормалі поверхні також задовольняється, а тому можемо твердити, що вся родина евольвент кривої лежить на бінормалі поверхні.

Для обчислення кутів прямової до даної кривої, що є дотичною до її евольвенти користуємося рівностями:

$$\cos\varphi = \lambda_n \cos\tau + \lambda_\beta \sin\tau$$

$$\cos\psi = \mu_n \cos\tau + \mu_\beta \sin\tau$$

$$\cos\chi = \nu_n \cos\tau + \nu_\beta \sin\tau$$

Вставляючи в них знайдену вартість τ, ми одержимо остаточно:

$$\left.\begin{aligned}\cos\varphi &= \lambda_n \cos\left(\int\frac{ds}{R}+C\right)+\lambda_b\sin\left(\int\frac{ds}{r}+C\right)\\ \cos\psi &= \mu_n\cos\left(\int\frac{ds}{R}+C\right)+\mu_b\sin\left(\int\frac{ds}{r}+C\right)\\ \cos\chi &= \nu_n\cos\left(\int\frac{ds}{R}+C\right)+\nu_b\sin\left(\int\frac{ds}{r}+C\right)\end{aligned}\right\}\quad\ldots(130)$$

Із виразу (3), що визначає кут між прямовою дотичною до евольвенти й головною прямовою до кривої випливає:

1) Що коли нам дано одну з евольвент, то ми легко одержимо решту їх через поворот всіх прямових, що дотикаються до евольвенти на певний сталий кут.

2) Що геометричний осередок центрів кривини даної кривої загалом не є її евольвентою.

§78. Евольвента просторової кривої.

Евольвентою даної просторової кривої звуть криву, що її прямові є дотичними до даної кривої.




Рис. 146

Нехай дана крива буде L (рис. 146). Візьмімо на ній точку M і поведемо дотичну MT. Припустимо, що дана евольвента L_1 кривої перехо-дить через точку $\Theta(x,y,z)$ дотичної, так що MΘ є її прямовою. Означимо відрізок дотичної MΘ через u. Координати u на осях координат будуть:

$$X-x=u\lambda;\quad Y-y=u\mu\ \text{і}\ Z-z=u\nu\quad\ldots(d)$$

де λ,μ і ν є косинуси кутів дотичної MT з коор-

дичними осями. А звідси:

$$\left.\begin{aligned} X &= x + u\lambda \\ Y &= y + u\mu \\ Z &= z + u\nu \end{aligned}\right\} \cdots (\beta)$$

Коли вважатимемо X, Y і Z змінними, то очевидно, що рівності (β) можуть бути рівняннями евольвенти, коли ми вибиратимемо u таке, щоб задовольнялася умова, що дотична T є прямовою кривої b_1. Для цього продиференціюємо ці рівняння (β) через s і користуючися 1-ою низки взорів Френе, матимемо:

$$\frac{dX}{ds} = \frac{d\lambda}{ds} + u\frac{d\lambda}{ds} + \lambda\frac{du}{ds} = \lambda\left(1 + \frac{du}{ds}\right) + u\frac{\lambda_n}{\rho}$$

аналогічно:

$$\frac{dY}{ds} = \mu\left(1 + \frac{du}{ds}\right) + u\frac{\mu_n}{\rho}$$

і $$\frac{dZ}{ds} = \nu\left(1 + \frac{du}{ds}\right) + u\frac{\nu_n}{\rho}$$

Ми одержали кутові змінні дотичної до кривої (β). Коли ж ця крива (β) є евольвентою даної кривої, то дотична останньої мусить бути прямовою до згаданої кривої (β), себто мусить бути прямою до її дотичної. Отже треба, щоб виконувалася умова прямовості:

$$\frac{dx}{ds}\cdot\lambda + \frac{dy}{ds}\cdot\mu + \frac{dz}{ds}\cdot\nu = 0$$

Вставляючи сюди вартості $\frac{dx}{ds}$, $\frac{dy}{ds}$ і $\frac{dz}{ds}$ ми матимемо:

$$\lambda\left[\lambda\left(1 + \frac{du}{ds}\right) + u\frac{\lambda_n}{\rho}\right] + \mu\left[\mu\left(1 + \frac{du}{ds}\right) + u\frac{\mu_n}{\rho}\right] + \nu\left[\nu\left(1 + \frac{du}{ds}\right) + u\frac{\nu_n}{\rho}\right] = 0$$

або:

$$\left(1+\frac{du}{ds}\right)\left(\cancel{\lambda^2+\mu^2+\nu^2}^{1}\right)+\frac{u}{\rho}\left(\cancel{\lambda\lambda_n+\mu\mu_n+\nu\nu_n}^{0}\right)=0$$

Отже:

$$1+\frac{du}{ds}=0 \quad \text{або:} \quad du=-ds$$

А інтегруючи цю рівність одержимо:

$$u=C-s \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots (\gamma)$$

Таким чином рівняння евольвенти матимуть вигляд:

$$\left.\begin{aligned} X &= x+\lambda(C-s)\\ Y &= y+\mu(C-s)\\ Z &= z+\nu(C-s)\end{aligned}\right\} \ldots (131)$$

З огляду на те, геометричний осередок дотичних до кривої є доторкальна поверхня, то евольвента даної кривої лежить в цій поверхні й перетинають під прямим кутом її твірні.

Очевидно з рівняння (131), що евольвент є також не одна, а ціла родина, що залежить від вартостей змінника C. Вартість відсічення від точки перехрещення дотичної з евольвентою від даної точки кривої M, а саме:

$$u=C-s$$

показує, що маючи одну з евольвент, ми одержимо ренту, збільшуючи чи зменшуючи відрізок (відтинок дотичної) на довільну сталу величину.

§79. Геодезична або тангенціальна кривина.

Хай на даній поверхні маємо криву L

(рис.147), що переходить через точку $M(x,y,z)$. Хай T - дотична, N_0 - головна нормаль її, $MN(L,M,N)$ - нормаль поверхні; K центр кривини кривої L, а ρ рад кривини. Означимо через Θ нормальний кут, через T_1 - дотичну до поверхні, нормаль до N і T




Рис.147.

Зметнемо криву L одночасно на дотичну площу TMT_1 і площу нормального перерізу. Кривину першого лету в точці M звуть геодезичною, або тангенціальною кривиною, кривину другого лету - кривиною нормального перерізу (нормальною кривиною. Центр кривини кривої K також досить лети L - центр геодезичної кривини і P - центр нормальної кривини. Всі три центри лежатимуть на осі кривини LP.

З ΔLKM маємо:

$$MK = \frac{MK}{\sin\Theta} \quad \text{або} \quad S_g = \frac{\rho}{\sin\Theta}$$

А звідси геодезична кривина буде:

$$\frac{1}{S_g} = \frac{\sin\Theta}{\rho} \quad \ldots\ldots\ldots (132)$$

А з ΔMKP маємо:

$$MP = \frac{MK}{\cos\Theta} \quad \text{або} \quad R = \frac{\rho}{\cos\Theta}$$

А звідси:

Нормальна кривина: $\frac{1}{R} = \frac{\cos\Theta}{\rho} \ldots\ldots (107)$

[Теорема Менье §59].

§80. Обчислення лука геодезичної кривини кручення.

Поведемо площу NMT через прямову поверхні N і дотичну T даної кривої. Це як нам відомо буде площею прямового перерізу. Рівняння цієї площі буде:

$$(Mz' - Ny')(X-x) + (Nx' - Lz')(Y-y) + (Ly' - Mx')(Z-z) = 0$$

де L, M і N є напрямні зчинники прямової до поверхні.

[Примітка. Це рівняння (Аналіт. геометрія в просторі §31) можна скласти дивлячись, що проходить через дві просторові перехресні прості T і N]

Дотичні T до поверхні, ми взяли прямово до заданої площі, а тому напрямні зчинники її будуть:

$$\lambda = Mz' - Ny' \;;\; \beta = Nx' - Lz' \text{ і } \gamma = Ly' - Mx' \quad \cdots (1)$$

де x', y', z' є кутові зчинники дотичної T, а тому рівні:

$$x' = \frac{dx}{ds} \;;\; y' = \frac{dy}{ds} \text{ і } z = \frac{dz}{ds}$$

З другого боку головна прямова N_0 має напрямні зчинники (ми криву беремо в функції дуги):

$$\lambda_n = \frac{\frac{d^2x}{ds^2}}{\sqrt{\sum\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2}} \;;\; \mu = \frac{\frac{d^2y}{ds^2}}{\sqrt{\sum\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2}} \text{ і } \nu_n = \frac{\frac{d^2z}{ds^2}}{\sqrt{\sum\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2}} \quad \cdots (81, §50)$$

або беручи на увагу, що $\rho = \frac{1}{\sqrt{\sum\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2}}$ (90) матимемо:

$$\lambda_n = \rho\frac{d^2x}{ds^2} \qquad \mu_n = \rho\frac{d^2y}{ds^2} \text{ і } \nu_n = \rho\frac{d^2z}{ds^2} \quad \cdots (2)$$

За правилом аналітичної геометрії косинус кута між двома прямими є рівний сумі здобутків відповідних напрямних множників цього ж самого кута, а тому:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta = \alpha\lambda_n + \beta\mu_n + \gamma\nu_n$$

Вставляючи ще знайдені вартості $\alpha, \beta, \gamma, \lambda_n, \mu_n$ і ν_n маємо:

$$\sin\theta = \rho\left[M\frac{dx}{ds}\cdot\frac{d^2x}{ds^2} - N\frac{dy}{ds}\cdot\frac{d^2x}{ds^2} + N\frac{dx}{ds}\cdot\frac{d^2y}{ds^2} - L\frac{dz}{ds}\cdot\frac{d^2y}{ds^2} + L\frac{dy}{ds}\cdot\frac{d^2z}{ds^2} - M\frac{dx}{ds}\cdot\frac{d^2z}{ds^2}\right]$$

або:

$$\sin\theta = \frac{\rho}{ds^3}\left[L\,dy\,d^2z + M\,dz\,d^2x + N\,dx\,d^2y - N\,dy\,d^2x - M\,dx\,d^2z - L\,dz\,d^2y\right]$$

Отже:

$$\sin\theta = \frac{\rho}{ds^3}\begin{vmatrix} L & dx & d^2x \\ M & dy & d^2y \\ N & dz & d^2z \end{vmatrix}$$

А звідси за взором (132) маємо:

$$\frac{1}{\rho_g} = \frac{\sin\theta}{\rho} = \frac{1}{ds^3}\begin{vmatrix} L & dx & d^2x \\ M & dy & d^2y \\ N & dz & d^2z \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots (133)$$

або:

$$\rho_g = \frac{ds^3}{\Delta} \quad \text{де } \Delta = \begin{vmatrix} L & dx & d^2x \\ M & dy & d^2y \\ N & dz & d^2z \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots (134)$$

Візьмімо тепер M_1, досить близьку M і збудуймо до даної поверхні прямовуж M_1N_1, що мають напрямними множниками:

$$L + dL\,;\quad M + dM \quad \text{і} \quad N + dN$$

Означимо кут відхилення її від нормалі MTN через ϑ. Тоді маємо:

$$\vartheta = \left(\widehat{M T_1, M_1 N_1}\right) - \frac{\pi}{2}$$

З аналітичної геометрії маємо:

$$\sin\vartheta = -\cos\left(\widehat{M T_1, M_1 N_1}\right) = -\left[\alpha(L+dL) + \beta(M+dM) + \gamma(N+dN)\right]$$ або:

$$\sin\vartheta = (Ny' - Mz')(L+dL) + (Lz' - Nx')(M+dM) + (Mx' - Ly')(N+dN)$$ або:

$$\sin\vartheta = \cancel{NLy'} - MLz' + LMz' - \cancel{MNx'} + \cancel{NMx'} - \cancel{LNy'} - M\,dL\,z' + N\,dL\,y' - N\,dM\,x' + L\,dM\,z' - L\,dN\,y' + M\,dN\,x'.$$

Отже внаслідок за формулою $\frac{1}{ds}$, маємо:

$$\sin\vartheta = \frac{1}{ds}\left[L\,dM\,dz + M\,dN\,dx + N\,dL\,dy - N\,dM\,dx - M\,dL\,dz - L\,dN\,dy\right]$$

або:

$$\sin\vartheta = \frac{1}{ds}\begin{vmatrix} L & dL & dx \\ M & dM & dy \\ N & dN & dz \end{vmatrix} = \frac{\Delta_1}{ds} \quad \ldots \quad (4)$$

Ми знаємо, що кривизною кривої є: $\lim_{\Delta\ldots 0}\frac{\vartheta}{\Delta S}$, оскільки $\lim_{\vartheta\ldots 0}\frac{\sin\vartheta}{\vartheta} = 1$, а тому геодезичне кручення матиме вираження:

$$\frac{1}{r_g} = \lim_{\Delta s\ldots 0}\frac{\vartheta}{\Delta S} = \lim_{ds\to 0}\frac{\sin\vartheta}{ds} = \frac{\Delta_1}{ds^2}$$

або:

$$\frac{1}{r_g} = \frac{1}{ds^2}\begin{vmatrix} L & dL & dx \\ M & dM & dy \\ N & dN & dz \end{vmatrix} \quad \ldots \quad (135)$$

А звідси:

$$r_g = \frac{ds^2}{\Delta_1} \text{ де } \Delta_1 = \begin{vmatrix} L & dL & dx \\ M & dM & dy \\ N & dN & dz \end{vmatrix} \quad \ldots \quad (136)$$

Очевидно, що коли крива дотикається одній з головних дотичних ($\vartheta = 0$, або $\vartheta = \frac{\pi}{2}$), то геодезичне кручення є рівне з нулем.

Кінець.

Зміст

§§		Стор.
	Частина I. Розділ I	3
1	Диференціювання функцій від кількох незалежних.	3
2	Повний диференціал	4
3	Окремі диференціали	9
4	Окремі похідні вищих порядків від кількох незалежних	9
5	Незалежність результату від порядку диференціювання	10
6	Похідні вищих порядків від кількох незалежних.	14
7	" " "	18
8	" " "	20
9	Невизначені функції	20
10	Одновимірні функції.	24
11	Ряди Тейлора	27
12	Розвинення $f(x)$ sin x в ряд.	29
13	" в ряд $f(x) = \cos x$	31
14	" " $f(x) = e^x$	32
15	" " логарифмічної функції	34
16	" " степеневих функцій	38
17	Взори Ейлера для тригонометричних функцій	42
18	Розвинення невизначеностей за допомогою розвинення функцій в степеневі ряди незалежних	43
19	Ряди Тейлора для функцій кількох незал.	44
20	Максимум і мінімум невизначених функцій	47
21	" " визначених функцій від двох незалежних.	49
22	" "	
23	Умовні maximum і minimum	64
	Розділ II. Диференціяльна геометрія	70
1	Аналітичне рівняння плоскої кривої	70
2	" " простої, кола, еліпса й гіперболи.	73

§3	Дотична до плоскої кривої	76
4	Кут спаду дотичної до кривої на осі координати.	78
5	Нормаль (пряма)	82
6	Кути прямої з осями	83
7	Обчислення величини дотичної кривої	85
8	Крива в бінульових координатах	91
9	Величини дотичностей кривої у бінульових координатах.	93
10	Циссоїда Діокля	95
11	Архімедова спіраль.	97
12	Гіперболічна і логарифмічна спіраль	100
13	Форма кривої (випуклість або вгнутість)	101
14	Дослідження точок перегину, коли рівняння кривої має неявну форму.	109
15	Дослідження форми кривої в бін. координат.	113
16	Загальне розуміння про кривину (луки) кривих	116
17	Кривина плоскої кривої	119
18	Основні прикмети обчислення кривини	123
19	Коло кривини й центр кривини	127
20	Вимірювання луки кривини в бінульових коорд.	129
21	Вимірювання луки кривини через відрізання відповідної дотичної від бінуля	131
22	Евольвента й евольвентна (інволюта)	132
23	Властивості евольвенти	138
24	Огортальні кривих	142
25	Основна властивість огортальних родин кривих	146
26	Інші трактування еволюти	149
27.	Родина кривих від кількох незалежних	150
28	Доторкання кривих	156
29	Геометричне трактування питання про доторканість кривих	158

30	Допарні криві.	165
31	Допарне коло	168
32	Асимптоти кривої	171
33	" " "	177
34	" " "	179
35	" " "	183
36	Асимптоти в бінарних координатах	186
37	Особливі точки	190
38	Вивчення дотичної до алгебричної кривої в даній особливій точці й дослідження останніх.	192
39	Спрощений спосіб аналізи особливих точок	199
40	Дослідження окремих випадків особлив. точок	209
41	Особливі точки трансцендентних кривих	212
42	Про точки перегину	216
43	Дослідження рівняння кривих	223
	Частина II. Розділ I	236
	Просторові криві	"
44	Вивчення кривої в просторі	"
45	Дотична до просторової кривої	237
46	Напрями зіткнення дотичної до просторової кривої (кривої подвійної кривини)	241
47	Прямова (нормальна) площа	243
48	Площа кривини (допарна площа)	244
49	Властивості площі кривини	251
50	Головна прямова (нормаль)	253
51	Спів прямова (бінормаль)	257
52	Кривина просторової кривої	259
53	Кручення кривої	264
54	Взори Френе (Серре)	268
	Розділ II. Поверхні	279
55	Загальні їх рівняння	"

56	Дотична пряма й площа до поверхні	281
57	Пряслова до поверхні	284
58	Напрями зліпшки дотичної площі	285
59	Кривина лінії притайшої до поверхні або тих звітних поверхневих кривих	288
60	Побудування кругів кривини для поверхневих кривих, що переходять через точку M поверхні й мають спільну дотичну	295
61	Кривина прямових перерізів	296
62	Індикатриса Дюпена	300
63	Обчислення головних кутів кривини	306
64	Обчислення головних кривин поверхні: Гаусса й Ейлера	311
65	Кривина лінія	"
66	Огортальні поверхні	315
67	Основна властивість огортальних поверхень	319
68	Огортальна поверхня 2го роду	320
69	Основна властивість огортальної поверхні 2го р.	324
70	Руб повороту	325
71	Основна властивість рубу повороту	328
72	Поверхні рекортання	331
73	Основна властивість поверхень рекортання	339
73a	Родина кривих	343
74	Лінійні поверхні	345
75	Оборотові поверхні	348
76	Дотирсальна, випростальна й бінормова поверхні просторової кривої	349
77	Евольота просторової кривої	355
78	Евольвента " "	361
79	Геодезична або тангенціяльна кривина	363
80	Обчислення кута геодезичної кривини кривини	365
	Зміст	368

Українське Видавниче Товариство

СІЯЧ

1. Проф. др. Я. Ярема. **Вступ до філософії.**
2. Лєкт. др. Гончарів-Гончаренко. **Загальна гігієна.**
3. Проф. С. Русова. **Теорія педаґоґіки на основі психолоґії.**
4. Проф Л. Білецький. **Українська народня поезія.**
5. Лєкт. Ф Гула. **Теорія векторів.**
6. Проф. Є. Іваненко. **Пропедевтика вищого рахунку.**
7. Проф. Є. Іваненко. **Аналітична ґеометрія у просторі.**
8. Лєкт. Д. Чижевський. **Логіка.**
9. Проф. др А. Старков. **Загальна біолоґія.**
10. Лєкт. В. Січинський. **Історія всесвітнього мистецтва.**
11. Лєкт. І. Кабачків. **Політична економія.**
12. Проф. Є. Іваненко. **Алґебрична аналіза.**
13. Проф Є. Іваненко. **Диференціяльне числення.**
14. Лєкт. Д. Чижевський. **Вибір із творів найвизначніщих філософів.**
15. Проф др. Сімович. **Староболгарська граматика.**
16. Проф др. Сімович. **Хрестоматія староболгарського й українського письменства.**
17. Лєкт. Гр. Омельченко. **Вступ до славянознавства.**
18. Проф. С Русова. **Дидактика.**
19. Проф М Лорченко. **Експериментальна фізика.**
20. Лєкт. А. Животко. **Дошкільне виховання.**
21. Лєкт. П Герасименко. **Основи термодинаміки.**
22. Лєкт. др. В Кушнір. **Підручник німецької мови.**
23. Проф. др. Я. Ярема. **Психографія в школі** (Зразок психографічної схеми з коментарем).

Адреса видавництва:
PRAHA-SMÍCHOV, MALATOVA ULICE ČIS. 19. / III.